


## Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2019

**Rökning bland spädbarnsföräldrar fortsätter att minska. Under de senaste 20 åren har andelen nyfödda barn med mödrar som röker minskat från 9 procent 1999 till 3 procent 2019, medan andelen med rökande fäder minskat från knappt 14 procent till 9 procent under samma period.**

### Färre mödrar röker

Omkring 9 procent av barnen som föddes år 2019 bodde tillsammans med rökare, vid 0–4 veckors ålder och vid 8 månaders ålder. Det är en halvering jämfört med barn födda 1999 (se diagram 1.1).

**Diagram 1.1 Andel barn med rökande föräldrar samt som sam-anbor med rökare under spädbarnstiden, barn födda 1999–2019**



\*Skattat riksvärde för 2013–2019

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Speciellt mödrarnas rökning har minskat sedan 1999 då 9 procent av spädbarnen i åldern 0–4 veckor hade mödrar som rökte dagligen och omkring 11 procent vid 8 månaders ålder. För barn födda 2019 har andelen med rökande mödrar minskat till 3 procent vid 0–4 veckors ålder och 3,5 procent vid 8 månaders ålder.

Fäders rökning under spädbarnstiden har också minskat under perioden från knappt 14 procent år 1999 till mindre än 10 procent bland barn födda år 2019. Andelen barn vars fäder rökte dagligen var omkring 9 procent vid 0–4 veckors ålder och 8 procent vid 8 månaders ålder.


Med *rökare* menas person som röker minst en gång dagligen, dvs. drar i sig rök från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus. Användning av e-cigarett eller snus ingår inte.

Med *sammanbor med rökare* avses att barnet stadigvarande bor tillsammans med någon person som röker enligt definitionen. Det kan vara vårdnadshavare, vårdnadshavares sambo, äldre syskon, far- eller morföräldrar eller någon annan person. Med stadigvarande avses att personen bor på samma adress som barnet minst 14 dagar per månad.

## Regionala skillnader i rökvanor

Spädbarnsföräldrars rökvanor varierar mellan länen. I Västerbottens län var andelen med rökande mödrar mindre än 1,5 procent bland barn födda 2019, både vid 0–4 veckors ålder och vid 8 månaders ålder.

**Diagram 1.2 Andel barn med mödrar som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2019**



\*Uppgifter saknas för Uppsala län. Värden för Jämtlands län, 0-4 veckor, visas ej på grund av högt bortfall. Värdet för Örebro län samt riksvärdet är skattat på grund av höga bortfall.


Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Högst andel med mödrar som röker dagligen hade Skåne med 4,6 procent av barnen vid 0–4 veckors ålder och Södermanlands län med 5,4 procent för 8 månader gamla barn (figur 1.2).

Knappt 4 procent av barnen i Värmlands län hade fäder som rökte dagligen under barnets första veckor vilket var lägst i landet. Västerbottens län hade lägst andel vid 8 månader, drygt 4 procent.

Rökning bland fäder till barn födda 2019 var vanligast i Södermanlands län med 13 procent vid 0–4 veckors ålder. Vid 8 månaders ålder var andelen barn med fäder som rökte dagligen högst i Skåne län med 12 procent (figur 1.3).

**Diagram 1.3 Andel barn med fäder som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2019**



\*Uppgifter saknas för Uppsala län. Värden för Jämtlands län, barn 0-4 veckor, visas ej på grund av högt bortfall. Värden för Örebro län och riksvärdet är skattat på grund av höga bortfall.

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

**Mer information**

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här (välj visa bilagor): <https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/rokvanor/>

**Kontakt:**

Maria Öman, statistikfrågor

Telefon: 075-247 30 00

E-post: [maria.oman@socialstyrelsen.se](mailto:maria.oman@socialstyrelsen.se)

Carl-Erik Flodmark, sakfrågor

Telefon: 075-247 30 00

E-post: [carl-erik.flodmark@socialstyrelsen.se](mailto:carl-erik.flodmark@socialstyrelsen.se)