

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2014


För 15 år sedan levde 19 procent av alla åtta månader gamla barn i familjer där någon rökte. År 2014 har andelen nästan halverats och sjunkit till 11 procent. Bland papporna rökte 10 procent och bland mammorna rökte 5 procent.

Andelen barn som utsätts för tobaksrök under spädbarnstiden fortsätter minska

Andelen som röker under barnets spädbarnsperiod minskade som mest fram till 2005. Under 1999 levde cirka 19 procent av dessa barn i en hemmiljö där någon rökte. År 2014 hade den andelen sjunkit till 11 procent.

År 1999 rökte 9 procent av mammorna då barnet var 0–4 veckor, vilket kan jämföras med 4 procent 2014. Bland papporna hade andelen minskat från 13 till 10 procent. Då barnen är åtta månader röker en något större andel av mödrarna jämfört med då barnet är 0–4 veckor. För papporna är det ingen skillnad (se figur 1).

Figur 1. Andel rökande föräldrar samt total exponering för tobaksrökning i barnets hemmiljö, barn födda 1999–2014



Exponering för passiv rökning under spädbarnstiden


Det finns ett samband mellan tobaksrök i miljön och utveckling av luftvägssjukdomar hos barn. Barn som utsätts för tobaksrök i hemmet drabbas oftare av luftvägsinfektioner (bland annat lunginflammation och bronkit) samt öroninflammationer. Dessutom löper de ökad risk att utveckla småbarnsastma, allergi mot pollen, pälsdjur och födoämnen.

Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om modern röker under graviditeten eller efter barnets födelse (1).

Stora regionala skillnader

Rökning under spädbarnperioden varierar mycket mellan de olika länen. Bland mammor är rökning under spädbarnstiden vanligast i Blekinge och Södermanland. Lägst andel rökande mödrar har förutom Uppsala län de tre norrlandslänen Jämtland, Västerbotten och Norrbotten (se figur 2).


Figur 2. Andel mödrar som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2014



*Skattat riksvärde för 2014 då uppgifter saknas för Värmland
Källa: statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Störst andel rökande pappor under spädbarnstiden finns i Södermanlands län. Även Skåne ligger högt och förutom norrlandslänen så rökte Stockholms- och Uppsalapapporna i minst utsträckning (se figur 3).

Figur 3. Andel fäder som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2014



*Skattat riksvärde för 2014 då uppgifter saknas för Värmland

Källa: statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Om Socialstyrelsens statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor

Socialstyrelsen har publicerat statistik om rökvanor bland spädbarnsföräldrar sedan 1999 och omfattar rökning då barnet är 0–4 veckor samt 8 månader. Statistiken redovisas på läns- och kommunnivå.

Med *rökare* menas rökning minst en gång dagligen, dvs. drar i sig rök från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus.

Med *rökare i barnets hemmiljö* avses sambo, äldre syskon, far- eller morföräldrar eller någon annan person som stadigvarande bor tillsammans med barnet och som röker enligt definitionen.

Kvalitetsanmärkning: år 2013–2014 har landstinget Värmland inte inkommit med några data till Socialstyrelsen. Stockholm skickade bristfälliga data 2013. Riksvärdena för dessa år är därför skattade.

Referenser

1. Socialstyrelsen. Miljöhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen; 2009.

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen.
www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-9-3

Kontakt:

Ellen Lundqvist (statistikfrågor)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: ellen.lundqvist@socialstyrelsen.se

Karin Gottvall (sakkunnig)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: karin.gottvall@socialstyrelsen.se