

Olämpliga läkemedel för äldre

Denna lista omfattar läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska vidare finnas en välgrundad och aktuell orsak (indikation) för att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör också följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller. Kontakta förskrivande läkare för mer information.

Listan speglar indikatorn ”Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger” som ingår i rapporten *Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre* (Socialstyrelsen 2010-6-29). Följande läkemedel ingår (juni 2016):

Långverkande bensodiazepiner		Läkemedel med antikolinerga effekter (forts)
Är lugnande och sömngivande läkemedel		
Diazepam		Egazil
Stesolid		Emselex
Apodorm		Hydroxyzine
Mogadon		Kentera
Nitrazepam		Ketogan
Flunitrazepam		Klomipramin
Tramadol		Leponex
Mot smärta		Lergigan
Dolatramyl		Levomepromazine
Gemadol		Ludiomil
Nobligan		Maprotilin
Tiparol		Metylskopolamin
Tradolan		Morfin-Skopolamin
Tramadol		Nozinan
Propiomazin		Oxikodon-hyoscin
Används vid sömnbesvär		Oxybutynin
Propavan		Pargitan
Läkemedel med antikolinerga effekter		Proklorperazin
Används t.ex. vid urininkontinens, som lugnande medel och i vissa preparat mot smärta		Robinul
Akineton	Buscopan	Saroten
Alimemazin	Calma	Scopoderm
Amitriptylin	Clozapine	Sensaval
Anafranil	Desentol	Spasmofen
Atarax	Detrusitol	Theralen
Atropin	Ditropan	Tolterodin
Atyxine	Durbis	TOVIAZ
		Truxal
		Vesicare