

Olämpliga läkemedel för äldre

Denna lista omfattar läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska vidare finnas en välgrundad och aktuell orsak (indikation) för att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör också följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller. Kontakta förskrivande läkare för mer information.

Listan speglar indikatorn ”Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger” som ingår i rapporten Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen 2017-6-7). Följande läkemedel ingår (augusti 2018)

<p>Långverkande bensodiazepiner Är lugnande och sömngivande läkemedel</p> <hr/> <p>Apodorm Diazepam Flunitrazepam Mogadon Nitrazepam Stesolid</p>	<p>Glibenklamid Ett diabetesmedel</p> <hr/> <p>Daonil Glibenklamid</p>	<p>Läkemedel med antikolinerga effekter (forts.)</p> <hr/> <p>Leponex Lergigan Levomepromazine Ludiomil Metylskopolamin Morfin-Skopolamin Norflex Norgesic Nozinan Oxikodon-hyoscin Oxybutynin Pargitan Postafen Proklorperazin Prometazin Robinul Saroten Scopoderm Sensaval Sialanar Spasmofen Tavegyl Theralen Tolterodin Tolterodine TOVIAZ Truxal Vesicare</p>
<p>Tramadol Mot smärta</p> <hr/> <p>Dolatramyl Gemadol Nobligan Tiparol Tradolan Tramadol</p>	<p>Läkemedel med antikolinerga effekter Används t.ex. vid urininkontinens, som lugnande medel och i vissa preparat mot smärta</p> <hr/> <p>Akineton Alimemazin Amitriptylin Anafranil Atarax Atropin Buscopan Calma Clozapine Detrusitol Ditropan Durbis Egazil Emselex Glykopyrroniumbromid Hydroxizin Hydroxyzine Kentera Ketogan Klomipramin</p>	
<p>Propiomazin Används vid sömnbesvär</p> <hr/> <p>Propavan</p>		
<p>Kodein Mot smärta</p> <hr/> <p>Altermol Citodon Kodein Panocod Paracetamol/Kodein Treo</p>		