

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården 2014

Fem indikatorer om läkemedelsuttag, återinskrivning i vården samt dödlighet bland personer med missbruks- och beroendediagnos

2014-11-17



Beskrivning av de fem indikatorerna

För varje indikator redovisas två diagram, dels jämförelser mellan år på riksnivå, dels årets resultat med jämförelser på lanstings-/regionnivå.

För samtliga indikatorer redovisas även andelar kvinnor respektive män (utom diagram 4).

1. Andel personer som har diagnostiserats med psykiska- och beteendestörningar orsakade av alkohol (F10) och gjort uttag av läkemedel (akamprosat, disulfiram, naltrexon)

Syftet är att se i vilken utsträckning patienter som har fått alkoholdiagnos tagit ut rekommenderade läkemedel, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2007 (och preliminära 2014).

2. Andel personer som har diagnostiserats med psykiska- och beteendestörningar orsakade av opiater (F11) som gjort uttag av läkemedel (metadon, buprenorfin)

Syftet är att se i vilken utsträckning patienter som har fått opiatdiagnos tagit ut rekommenderade läkemedel, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2007 (och de preliminära 2014).

3. Andel personer vårdade för alkoholrelaterad diagnos i slutenvård som återinskrivs samma år med en eller flera alkoholdiagnoser

Indikatorn belyser behandlingen och uppföljning samt det fortsatta omhändertagandet efter patienternas utskrivning.

4. Andel personer vårdade för narkotikarelaterad diagnos i slutenvård som återinskrivits samma år med en eller flera narkotikarelaterade diagnoser

Indikatorn belyser behandlingen och uppföljning samt det fortsatta omhändertagandet efter patienternas utskrivning.

5. Andel döda personer, oberoende av dödsorsak, som inom slutenvård fått alkohol- och/eller narkotikarelaterade diagnoser, under samma år

En hög dödlighet kan tyda på samsjuklighet och bristande omhändertagande inom såväl psykiatrisk som somatisk vård.

Indikator 1 och 2 visar utvecklingen under 2006-2013, indikatorerna 3-5 utvecklingen 2000-2013. Observera att procentskalorna skiljer sig i diagrammen.

Diagram 1. Indikator: Läkemedelsuttag för personer med alkoholdiagnos, andel kvinnor, män och totalt i riket åren 2006-2013




Diagram 2. Indikator: Läkemedelsuttag för personer med alkoholdiagnos, andel kvinnor, män och totalt per län och riket år 2013

Hög andel eftersträvas




Diagram 3. Indikator: Läkemedelsuttag för personer med opiatdiagnos, andel kvinnor, män och totalt i riket åren 2006-2013




Diagram 4. Indikator: Läkemedelsuttag för personer med opiatdiagnos, totalt per län och riket år 2013




Diagram 5. Indikator: Återinskrivning i slutenvård för missbruksorsak bland personer vårdade för alkoholdiagnos, andel kvinnor, män och totalt i riket åren 2000-2013

Låg andel eftersträvas




Diagram 6. Indikator: Återinskrivning i slutenvård för missbruksorsak bland personer vårdade för alkoholdiagnos, andel kvinnor, män och totalt per län och riket år 2013




Diagram 7. Indikator: Återinskrivning i slutenvård för missbruksorsak bland personer vårdade för narkotikadiagnos, andel kvinnor, män och totalt i riket åren 2000-2013




Diagram 8. Indikator: Återinskrivning i slutenvård för missbruksorsak bland personer vårdade för narkotikadiagnos, andel kvinnor, män och totalt per län och riket år 2013




Diagram 9. Indikator: Dödlighet bland personer med missbruks- och beroende-diagnos, andel kvinnor, män och totalt i riket åren 2000-2013

Låg andel eftersträvas




Diagram 10. Indikator: Dödlighet bland personer med missbruks- och beroendediagnos, andel kvinnor, män och totalt per län och riket år 2013

Låg andel eftersträvas

