


Vakcinišite se protiv novog gripa

Bosniska/Kroatiska/Serbiska



Zaštitite sebe

Vakcinacijom smanjujete rizik da obolite od novog gripa A(H1N1). Većina onih koji obole imaju uobičajene simptome i nije im neophodno lečenje. Ali, neki teško obole i umru od gripa ili pratećih bolesti. Ne možete sa sigurnošću znati da li rizikujete da budete puno ili malo bolesni od gripa.



Zaštitite druge

Gotovo svi imaju kontakta sa nekim za koga postoji rizik da teško oboli od novog gripa, primera radi, trudnice ili astmatičari. Deo ljudi neće moći da se vakciniše, mala deca ili osobe koje su jako alergične na jaja. Kada se vakcinišete smanjujete rizik da se neko od njih zarazi.



Sprečite širenje zaraze

Kada se vakcinišete pomažete i da se zašтите osobe u vašoj blizini i doprinosite da društvo funkcioniše kao i obično uprkos pandemiji gripa. Grip A(H1N1) je zarazniji od običnog i više ljudi je podložno zarazi. Zbog toga je moguće da znatno više ljudi oboli istovremeno.

**Pročitajte više na www.krisinformation.se ili www.1177.se.
Možete takođe pozvati 1177 ili 020- 20 20 00.**

Hronične bolesti

Ukoliko imate neku hroničnu bolest zbog koje često idete kod lekara jako je važno da se vakcinišete jer možete oboleti teže od drugih ako dobijete grip ili neku od pratećih bolesti posle gripa.

Trudnoća

Ukoliko ste trudni izuzetno je važno da se vakcinišete. Imuni sistem je oslabljen tokom trudnoće, te je veći rizik da teško obolite od gripa. Trudnicama je naročito povećan rizik da obole u poslednja tri meseca trudnoće jer je tada smanjen kapacitet pluća.

Oslabljen imuni sistem

Vakcina se može dati i osobama sa oslabljenim imunim sistemom jer ne sadrži živi virus.

Dojenje

Možete se vakcinisati i ako dojite.

Alergije

Vakcina sadrži tragove proteina jaja. Ukoliko ste preosetljivi na jaja trebali bi da se posavetujete sa svojim lekarom da li da se vakcinišete. Mada, jake reakcije su vrlo retke. Takođe bi trebali da se posavetujete sa lekarom ukoliko ste ranije imali reakcije na vakcinu protiv gripa ili neku drugu vrstu vakcinacije.

Neželjena dejstva vakcine

Posle vakcinacije je moguće da dobijete lokalnu reakciju sa crvenilom, otokom i bolom oko mesta uboda. Možete takođe dobiti groznicu, glavobolju, mučninu i simptome nalik gripu. Ne morate ići kod lekara zbog ovih simptoma ukoliko ne potraju više dana. Neželjena dejstva su ista kao i pri vakcinaciji protiv sezonskog gripa.

Cijepljenje

Djeca mlađa od 6 meseci:
Cijepljenje se ne preporučava.

Djeca od 6 meseci do 12 godina:

Preporučava se cijepljenje s pola doze. Cijepljenje se vrši u dva navrata u intervalu od najmanje 2 tjedna.

Od 13 godina i starija:

Preporučava se cijepljenje s cijelom dozom. Cijepljenje se vrši odjedanput.

Ko ne bi trebao da se vakciniše?

Osobe sa ozbiljnim alergijama na sastav vakcine bi trebale da se posavetuju sa svojim lekarom pre vakcinacije.