

Vaccin mot den nya influensan

Du har nu fått vaccin mot den nya influensan A(H1N1).
Här kan du läsa vad det innebär och vart du kan vända dig
om du har fler frågor.

Om influensa A(H1N1)

Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över hela världen. Ingen har haft just den här influensan tidigare och troligtvis är nästan ingen immun mot den. Därför riskerar betydligt fler att bli sjuka än vid den vanliga säsongsinfluensan.

Symtom är till exempel feber, hosta, snuva, halsont samt huvud- och muskelvärk. Du blir oftast trött och kan ibland kräkas och få diarré. Symtomen går över på någon vecka. Vissa personer, till exempel gravida och de som har kroniska hjärt- och lungsjukdomar, riskerar att bli mer allvarligt sjuka och få följsjukdomar som lunginflammation.

Vad händer i kroppen när man vaccinerar?

När man vaccinerar tillför man en inaktiv del av ett influensavirus som kroppen kan använda för att bygga upp ett skydd mot influensan. Det är inte tillräckligt för att man ska bli sjuk, men det räcker för att bygga upp ett skydd mot sjukdomen (immunitet). Om man senare utsätts för smitta är kroppens immunförsvar i förväg aktiverat för att möta influensaviruset och kan oskadliggöra smittämnet snabbt, utan att sjukdomen bryter ut.

Vilket skydd ger vaccinet mot influensa A(H1N1)?

Vaccinet Pandemrix, som ges mot den influensan A(H1N1), ger ett 90-procentigt skydd mot att smittas av influensan. Alla som vaccineras får alltså inte ett fullständigt skydd,

men om många vaccineras kan man ändå undvika att det lilla fåtal som inte har fått ett fullgott skydd av vaccinet utsätts för influensan.

Kan man få biverkningar?

Precis som alla läkemedel kan Pandemrix orsaka biverkningar, men alla som vaccineras behöver inte få dem. Eventuella biverkningar försvinner oftast inom 1–2 dagar utan behandling. Kontakta sjukvården om biverkningarna kvarstår eller om du får biverkningar som inte nämns här.

- Mycket vanliga (kan inträffa vid fler än 1 av 10 vaccineringar): smärta, rodnad, svullnad eller lokal förhårdnad vid injektionsstället, huvudvärk, trötthet, feber, muskelvärk, ledvärk.
- Vanliga (kan inträffa vid mellan 1 av 100 och 1 av 10 vaccineringar): värmekänsla, klåda eller blåmärke vid injektionsstället, ökad svettning, frossa, influensaliknande symtom, svullna körtlar i halsen, armhålan eller ljumsken.
- Mindre vanliga (kan inträffa vid mellan 1 av 1000 och 1 av 100 vaccineringar): stickningar eller domningar i händer eller fötter, sömnlighet, yrsel, diarré, kräkningar, magont, sjukdomskänsla, klåda, utslag, allmän sjukdomskänsla, sömnlöshet.

Vill du veta mer?

Prata med den enhet där du har vaccinerats eller vänd dig till 1177 Sjukvårdsrådgivningen eller ditt landstings sjukvårdsrådgivning. 1177 Sjukvårdsrådgivningen nås via telefonnumret 1177 eller webbplatsen www.1177.se.

