

السيلان/Gonorré

هل تبحث عن معلومات بلغات أخرى؟ انظر: www.hivportalen.se

ما يجب عليك التفكير به عند الإصابة بالسيلان

يمكن أن تصاب بالسيلان مرات عديدة. ويمكن أن تصاب بمضاعفات في حال عدم معالجة المرض. ينخفض خطر المضاعفات إذا بدأت العلاج بالسرعة اللازمة. يمكن أن تصاب النساء بالتهاب في أبقاق الرحم. وقد يصاب الرجال بالتهاب في البربخ. عدم علاج السيلان يمكن أن يؤثر على قدرتك على إنجاب الأطفال إذ يمكن أن تصاب بالعقم. يمكن أن تنتسرب البكتيريا إلى الدم وتسبب الأنتان (تسمم الدم).

السيلان تسببه البكتيريا التي توجد غالباً في مجرى البول. يمكن أن توجد البكتيريا أيضاً في الحلق أو المستقيم لدى الرجال والنساء على حد سواء، ويمكن أن توجد البكتيريا في الغشاء المخاطي المهبل لدى المرأة.

ينتشر مرض السيلان عن طريق ممارسة الجماع المهبل غير المحمي وكذلك الجماع الشرجي غير المحمي. ويمكن للبكتيريا أيضاً أن تنتقل أثناء ممارسة الجنس غير المحمي عن طريق الفم. ويمكن أن ينتقل السيلان عند ممارسة الاستمناء المتبادل عن طريق الملامسة المباشرة للأغشية المخاطية، وإن لم يكن هذا شائعاً جداً. يكفي فقط ملامسة الأصابع للأغشية المخاطية المحتوية على بكتيريا لكي تنتقل العدوى إلى الأغشية المخاطية السليمة. يمكن أن ينتقل السيلان أيضاً عن طريق مشاركة أدوات الجنس المساعدة مع شخص آخر.

أعراض السيلان

ينتقل مرض السيلان بسهولة وقد لا تظهر أي أعراض للمرض. ويمكن بدون أعراض تنقل أنت المرض إلى شريكك الجنسي، أو أن تصاب بالعدوى منه دون أن تلاحظ ذلك. إذا ظهرت لديك آلام فإن ظهور الأعراض قد يستغرق من يومين إلى سبعة أيام من تاريخ إصابتك بالمرض. تظهر الأعراض غالباً على شكل إفرازات من المجاري البولية، ويمكن أن تسبب حرقة عند التبول. في حال وجود الانتهاب في الحلق أو المستقيم فإن الأعراض تكون أخف أو لا يمكن ملاحظتها على الإطلاق.

افحص نفسك من السيلان

إجراء الاختبار للكشف عن السيلان مجاني. وللكشف عن المرض يتم أخذ عينة من المجاري البولية بقصد التحليل. أما بالنسبة للنساء فيمكن استكمال تحليل البول بتحليل عينة من عنق الرحم. إذا كنت قد مارست الجنس غير المحمي عن طريق الفم أو الشرج فينبغي عليك أن تجري تحليلاً مخبرياً من الحلق أو المستقيم.

افحص نفسك إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمرض السيلان. لكن قد يستغرق الأمر عدة أيام وحتى أسبوع واحد من تاريخ إصابتك بالعدوى حتى يبين الفحص إصابتك بالسيلان. لذلك قد تحتاج إلى الانتظار عدة أيام بعد ممارسة الجنس غير المحمي قبل أن تجري الفحص.

العلاج

علاج مرض السيلان مجاني ويعالج المرض بالمضادات الحيوية. ومن المهم أن لا تمارس الجنس مع شخص آخر خلال فترة العلاج. وكذلك يجب أن تجري فحصاً آخر بعد انتهاء فترة العلاج للتحقق من اختفاء البكتيريا بشكل كامل قبل أن تعود لممارسة الجنس. وفي الحقيقة فإن مقاومة البكتيريا تكون أحياناً قوية ومعالجتها متعبة. وحينها تكون بحاجة إلى مضادات حيوية من نوع آخر. يجب على شريكك الجنسي أيضاً فحص نفسه. إذا كان لديك العديد من شركاء الجنس فيجب على الجميع إجراء الفحص وأخذ العلاج عند تأكيد إصابتهم بالمرض.

تم إعداد هذه النصوص عام 2009 من قبل مجلس الخدمات الاجتماعية وتمت مراجعتها من قبل هانس كارلباري (Hans Carlberg)، طبيب استشاري في سوسام (Sösam)، قسم الصحة الجنسية في عيادة طب الأمراض الجلدية والأمراض التناسلية في مستشفى سودر شوكهوسيت. هانس فريدلوند (Hans Fredlund)، أستاذ وأخصائي في الوقاية من الأمراض المعدية في التنظيم النيابي لمحافظة أوريبرو، المستشفى الجامعي في أوريبرو. لينا ماريونس (Lena Marions)، أستاذة وطبيبة استشارية في عيادة أمراض النساء في مستشفى كارولينسكا الجامعية.

يمكن حجز الكتيب نصائح وحقائق عن الأمراض التناسلية المعدية Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner (رقم التصنيف 125-126-2009) باللغة السويدية من: Socialstyrelsens beställningsservice

Stockholm 88 120

المتجر على شبكة الإنترنت

www.socialstyrelsen.se

يمكن أيضاً تنزيل الكتيب من موقع مجلس الخدمات الاجتماعية

www.socialstyrelsen.se

التصميم الجرافيكي والرسوم: Infab AB

