


Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2016

Rökning bland mödrar till spädbarn fortsätter att minska. Under de senaste 15 åren har andelen barn med rökande mödrar mer än halverats, till cirka 4 procent år 2016, både när det gäller barnets första veckor och vid 8 månaders ålder. Även rökning bland spädbarnens fäder har minskat över tid, men inte lika mycket.

Färre mödrar röker

För cirka 11 procent av barnen som föddes år 2016 var någon i hemmiljö rökare under spädbarnstiden, vilket är samma nivå som år 2015. Det är däremot en minskning jämfört med 1999 då cirka 18 procent av de yngsta spädbarnen bodde med någon som rökte och drygt 19 procent vid 8 månaders ålder (se figur 1).

Figur 1. Andel barn med rökande föräldrar samt som sammanbor med rökare under spädbarnstiden, barn födda 1999–2016



*Skattat riksvärde för 2013–2016

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Speciellt mödrarnas rökning har minskat sedan 1999 då 9 procent av spädbarnen i åldern 0–4 veckor hade mödrar som rökte dagligen. För barn födda 2016 har andelen med rökande mödrar minskat till mindre än 4 procent vid 0–4 veckor ålder och drygt 4 procent vid 8 månaders ålder. Fäders rökning under spädbarnstiden har också minskat under perioden från knappt 14 procent år 1999 till runt 10 procent de senaste åren. En något högre andel av barnen födda 2016 hade rökande fäder under de första veckorna jämfört med år 2015. Det är för tidigt att säga om det är en tillfällig ökning eller ett trendbrott.


Med *rökare* menas person som röker minst en gång dagligen, dvs. drar i sig rök från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus.

Med *sammanbor med rökare* avses att barnet stadigvarande bor tillsammans med någon person som röker enligt definitionen. Det kan vara vårdnadshavare, vårdnadshavares sambo, äldre syskon, far- eller morföräldrar eller någon annan person. Med stadigvarande avses att personen bor på samma adress som barnet minst 14 dagar per månad.

Regionala skillnader i rökvanor

Spädbarnsföräldrars rökvanor varierar mellan länen. För barn födda 2016 var andelen med rökande föräldrar lägst i Jämtlands och Västerbottens län. Där var andelen barn med rökande mödrar runt 1 procent vid 0–4 veckors ålder och mindre än 2 procent vid 8 månaders ålder.

Diagram 1.2 Andel barn med mödrar som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2016




*Uppgifter om Uppsala och Kalmar saknas år 2016, skattat riksvärde.

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Knappt 6 procent av barnen i Västerbottens län hade fäder som rökte dagligen under barnets första veckor och i Jämtlands län var motsvarande andel drygt 7 procent.

Diagram 1.3 Andel barn med fäder som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2016



*Uppgifter om Uppsala och Kalmar saknas år 2016, skattat riksvärde.

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Rökning bland spädbarnsföräldrar var vanligast i Södermanlands län. Knappt 6 procent av barnen födda 2016 hade rökande mödrar vid 0-4 veckors ålder och drygt 7 procent runt 8 månaders ålder. Andelen vars fäder rökte dagligen var runt 15 procent både vid mätningen då barnen var 0-4 veckor och då de var 8 månader gamla.

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen: www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-10-23

Kontakt:

Maria Öman, statistikfrågor

Telefon: 075-247 30 00

E-post: maria.oman@socialstyrelsen.se

Carl-Erik Flodmark, sakfrågor

Telefon: 075-247 30 00

E-post: carl-erik.flodmark@socialstyrelsen.se