

Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni

Bilaga 2 Indikatorbeskrivningar

Innehåll

<i>Innehåll</i>	3
<i>Indikatorbeskrivningar</i>	5
Själv mord och dödsfall med oklart uppsåt (D1)	5
Dödlighet bland personer som behandlats för depression och ångest (D2)	6
Dödlighet bland personer som behandlats för bipolär sjukdom (D3)	6
Dödlighet bland personer som behandlats för ångestsyndrom (D4)	7
Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen för personer behandlade för depression (D5)	8
Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen för personer som behandlats för bipolär sjukdom (D6)	9
Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen för personer som behandlats för ångestssyndrom (D7)	11
Läkarkontakt i psykiatrisk öppenvård efter utskrivning vid depression (D8)	12
Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för depression (D9)	13
Återinskrivning inom tre respektive sex månader efter vård för depression (D10)	13
Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för bipolär diagnos (D11)	14
Återinskrivning inom tre respektive sex månader efter vård för bipolär sjukdom (D12)	15
Läkarkontakt i öppenvården efter utskrivning för bipolär sjukdom (D13)	15
Följsamhet till antidepressiv läkemedelsbehandling (D14)	16
Föreskrivning av antidepressiva läkemedel i primärvården (D15)	16
Följsamhet till litiumbehandling vid bipolär sjukdom (D16)	17
Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling med litium för patienter som uppnått remission efter manisk eller depressiv episod vid bipolär sjukdom (D17)	18
Läkemedelbehandling med litium respektive antipsykotika för patienter med manisk episod vid bipolär sjukdom (D18)	18
Tillgång till familjeinterventioner (P1)	19
Tillgång till stöd i föräldraskapet (P2)	19
Tillgång till social färdighetsträning (P3)	20
Tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (P4)	20
Tillgång till ett varierat utbud av sysselsättningsinsatser (P5)	21
Hjälp till bostad vid hemlöshet (bostad först-modellen) (P6)	22
Tillgång till samordnade vård- och stödåtgärder enligt ACT-modellen (P7)	22
Gemensam inventering av behovet av åtgärder hos personer med psykisk funktionsnedsättning (P8)	23
Överenskommelse om samarbete mellan kommun och landsting (P9)	23
Dödlighet bland vårdade för schizofreni (S1)	24
Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen för personer som vårdats inom den specialiserade psykiatrin för schizofreni (S2)	24
Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för schizofreni (S3)	26
Återinskrivningar efter sluten psykiatrisk vård för schizofreni inom tre respektive sex månader (S4)	26
Läkarkontakt i psykiatrisk öppenvård efter utskrivning vid schizofreni (S5)	27
Följsamhet till antipsykotiska läkemedel efter psykiatrisk slutenvård för personer med schizofreni (S6)	28
Själv mord och psykisk sjukdom (Ö1)	28

Sjukhusvårdade efter självmordsförsök eller annan självtillfogad skada (Ö2)	28
Dödlighet bland personer som vårdats inom psykiatrisk vård (Ö3)	29
Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet (Ö4)	30
Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (Ö5)	31
Blodfettssänkande läkemedelsbehandling vid diabetes (Ö6)	32
Dödlighet efter hjärtinfarkt (Ö7)	33
Dödlighet efter förstagångsstroke (Ö8)	34
Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen (Ö9)	35

Indikatorbeskrivningar

I denna bilaga presenteras tekniska beskrivningar av de indikatorer som presenteras i kapitel:

- depression och ångestsyndrom – vårdens processer och resultat
- psykosociala åtgärder för personer med schizofreni eller schizofreni liknande tillstånd
- psykiatrins processer och resultat för personer med schizofreni samt personer med psykisk ohälsa – vårdens processer och resultat.

Indikatorerna presenteras i den ordning som finns i rapporten *Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Indikatorer och underlag för bedömningar.*

Själv mord och dödsfall med oklart uppsåt (D1)

Mått	Antal per 100 000 invånare.						
Syfte	Indikatorn visar antalet självmord och dödsfall med oklart uppsåt. Avser alla åldrar.						
Målvärde	Nationell målnivå saknas.						
Indikatorns status	Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.						
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare:</i> Antal säkra respektive osäkra dödsfall med oklart uppsåt under 1 år.</p> <p><i>Nämnare:</i> Totalt antal personer i befolkningen under motsvarande år.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Dödsorsak</th><th>Diagnoskod - ICD 10</th></tr></thead><tbody><tr><td>Själv mord</td><td>X60–X84</td></tr><tr><td>Oklar avsikt</td><td>Y10–Y34</td></tr></tbody></table>	Dödsorsak	Diagnoskod - ICD 10	Själv mord	X60–X84	Oklar avsikt	Y10–Y34
Dödsorsak	Diagnoskod - ICD 10						
Själv mord	X60–X84						
Oklar avsikt	Y10–Y34						
Datakällor	Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.						
Tolkningssvårigheter							

Dödlighet bland personer som behandlats för depression och ångest (D2)

Mått	Antal per 10 000 invånare.
Syfte	Indikatoren visar dödligheten för de personer i åldern 20–59 år som någon gång de senaste fem åren har behandlats med antidepressiva läkemedel för ångest eller depressions-sjukdomar.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal avlidna 20-59 år som någon gång de senaste fem åren behandlats med antidepressiva läkemedel. <i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren behandlats med antidepressiva läkemedel. För befolkningen: <i>Täljare:</i> Samtliga avlidna i åldersgruppen 20-59 år. <i>Nämnare:</i> Sveriges medelbefolkning 20-59 år.

Läkemedel	ATC-kod
Antidepressiva	N06A

Värdena är åldersstandardiserade.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Datakällor	Läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	I läkemedelsregistret går det inte att särskilja depression och ångestdiagnoser. Patienter som har antingen depression eller ångestsyndrom och inte behandlas med läkemedel för dessa tillstånd förbises genom denna indikator.

Dödlighet bland personer som behandlats för bipolär sjukdom (D3)

Mått	Antal per 10 000 invånare.
Syfte	Indikatoren visar dödligheten för de personer med bipolär sjukdom i åldern 20–59 år som någon gång de senaste fem åren har behandlats med stämningsstabiliserande läkemedel.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal avlidna 20-59 år som någon gång de senaste fem åren behandlats med antidepressiva läkemedel. <i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren behandlats med antidepressiva läkemedel.

För befolkningen:

Täljare: Samtliga avlidna i åldersgruppen 20-59 år.

Nämnare: Sveriges medelbefolkning 20-59 år.

Läkemedel	ATC-kod
Litium	N05AN01

Värdena är åldersstandardiserade.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Datakällor

Läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Dödlighet bland personer som behandlats för ångestsyndrom (D4)

Mått Antal per 10 000 invånare.

Syfte Indikatoren visar dödligheten för de personer i åldern 20–59 år som någon gång de senaste fem åren har behandlats för ångestsyndrom.

Målvärde Nationell målnivå saknas.

Indikatorns status Nationell datakälla finns.

Teknisk beskrivning *Täljare:* Antal avlidna 20-59 år som någon gång de senaste fem åren behandlats för ångestsyndrom.

Nämnare: Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren för ångestsyndrom.

För befolkningen:

Täljare: Samtliga avlidna i åldersgruppen 20-59 år.

Nämnare: Sveriges medelbefolkning 20-59 år.

Huvuddiagnos	ICD 10
Ångestsjukdomar	F40-F45

Värdena är åldersstandardiserade.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Datakällor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Diagnostäckningen i patientregistret är inte fullständig.

Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen för personer behandlade för depression (D5)

Mått	Antal per 100 000 invånare.
Syfte	Indikatoren visar antalet personer i åldern 20–59 år med minst ett undvikbart somatiska slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare, bland personer som behandlats inom psykiatri för depression och i den totala befolkningen.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen 20-59 år som någon gång de senaste fem åren behandlats för depression. <i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren behandlats för depression.

För befolkningen:

Täljare: Samtliga personer med undvikbara slutenvårdstillfällen i åldersgruppen 20-59 år.

Nämnare: Sveriges medelbefolkning 20-59 år.

Den geografiska fördelningen har gjorts på patienternas hemort.

Huvuddiagnos	ICD 10
Depression	F321, F322, F323, F332, F333

Följande sjukdomstillstånd och koder enligt ICD-10 ingår i måttet undvikbar slutenvård:

Huvuddiagnos	ICD-10
Kroniska tillstånd	
Anemi	D501, D508, D509
Astma	J45, J46
Diabetes	E101–E108 (huvud- eller bidiagnos) E110–E118 (huvud- eller bidiagnos) E130–E138 (huvud- eller bidiagnos) E140–E148 (huvud- eller bidiagnos)
Hjärtsvikt	I50, I110, J81
Högt blodtryck	I10, I119
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom	J41, J42, J43, J44, J47 J20 tillsammans med J41, J42, J43, J44, J47 som bidiagnos
Kärlkramp	I20, I240, I248, I249

Akuta tillstånd	
Blödande magsår	K250, K251, K252, K254, K255, K256, K260, K261, K262, K264, K265, K266, K270, K271, K272, K274, K275, K276, K280, K281, K282, K284, K285, K286
Diarré	E86, K522, K528, K529
Epileptiska krampanfall	O15, G40, G41, R56
Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	N70, N73, N74
Njurbäckeninflammation	N390, N10, N11, N12, N136
Öra-näsa-halsinfektion	H66, H67, J02, J03, J06, J312
	Vårdtillfällen med samtidig hjärtkirurgi (åtgärds-koder som börjar på FN och FP) ingår inte

Korrigeringar har gjorts för skillnader i befolkningens åldersstruktur mellan olika landsting. Ålderstandardisering har gjorts med vårdade för depression som standardpopulation.

Datakällor

Patientregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningsvårigheter

Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen för personer som behandlats för bipolär sjukdom (D6)

Mått	Antal per 100 000 invånare.
Syfte	Indikatoren visar antalet personer i åldern 20–59 som vårdats inom psykiatri för bipolär sjukdom senaste fem åren, och minst ett undvikbart somatiskt slutenvårdstillfälle, per 100 000 invånare.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare:</i> Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för bipolär sjukdom.</p> <p><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för bipolär sjukdom.</p> <p>För befolkningen: <i>Täljare:</i> Samtliga personer med undvikbara slutenvårdstillfällen i åldersgruppen 20-59 år. <i>Nämnare:</i> Sveriges medelbefolkning 20-59 år.</p> <p>Den geografiska fördelningen har gjorts på patienternas hemort.</p>

Huvuddiagnos	ICD 10
Bipolär sjukdom	F30–F31

Följande sjukdomstillstånd och koder enligt ICD-10 ingår i mättet undvikbar slutenvård:

Huvuddiagnos	ICD-10
Kroniska tillstånd	
Anemi	D501, D508, D509
Astma	J45, J46
Diabetes	E101–E108 (huvud- eller bidiagnos) E110–E118 (huvud- eller bidiagnos) E130–E138 (huvud- eller bidiagnos) E140–E148 (huvud- eller bidiagnos)
Hjärtsvikt	I50, I110, J81
Högt blodtryck	I10, I119
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom	J41, J42, J43, J44, J47 J20 tillsammans med J41, J42, J43, J44, J47 som bidiagnos
Kärlkramp	I20, I240, I248, I249
Akuta tillstånd	
Blödande magsår	K250, K251, K252, K254, K255, K256, K260, K261, K262, K264, K265, K266, K270, K271, K272, K274, K275, K276, K280, K281, K282, K284, K285, K286
Diarré	E86, K522, K528, K529
Epileptiska krampanfall	O15, G40, G41, R56
Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	N70, N73, N74
Njurbäckeninflammation	N390, N10, N11, N12, N136
Öra-näsa-halsinfektion	H66, H67, J02, J03, J06, J312
	Vårdtillfällen med samtidig hjärtkirurgi (åtgärds-koder som börjar på FN och FP) ingår inte

Korrigeringar har gjorts för skillnader i befolkningens åldersstruktur mellan olika landsting. Ålderstandardisering har gjorts med vårdade för bipolär sjukdom som standard-

	population.
Datakällor	Patientregistret, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	

Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen för personer som behandlats för ångestssyndrom (D7)

Mått	Antal per 100 000 invånare.
Syfte	Indikatoren visar antalet personer i åldern 20–59 som vårdats inom psykiatrin för ångestsjukdom senaste fem åren och som under 2010 hade minst ett undvikbart somatiskt slutenvårdstillfälle, per 100 000 invånare.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för ångestssyndrom.

Nämnare: Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för ångestssyndrom.

För befolkningen:

Täljare: Samtliga personer med undvikbara slutenvårdstillfällen i åldersgruppen 20-59 år.

Nämnare: Sveriges medelbefolkning 20-59 år.

Den geografiska fördelningen har gjorts på patienternas hemort.

Huvuddiagnos	ICD 10
Ångestsjukdomar	F40-F45

Följande sjukdomstillstånd och koder enligt ICD-10 ingår i måttet undvikbar slutenvård:

Huvuddiagnos	ICD-10
Kroniska tillstånd	
Anemi	D501, D508, D509
Astma	J45, J46
Diabetes	E101–E108 (huvud- eller bidiagnos) E110–E118 (huvud- eller bidiagnos) E130–E138 (huvud- eller bidiagnos) E140–E148 (huvud- eller bidiagnos)
Hjärtsvikt	I50, I110, J81

Högt blodtryck	I10, I119
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom	J41, J42, J43, J44, J47 J20 tillsammans med J41, J42, J43, J44, J47 som bidiagnos
Kärlkramp	I20, I240, I248, I249
Akuta tillstånd	
Blödande magsår	K250, K251, K252, K254, K255, K256, K260, K261, K262, K264, K265, K266, K270, K271, K272, K274, K275, K276, K280, K281, K282, K284, K285, K286
Diarré	E86, K522, K528, K529
Epileptiska krampanfall	O15, G40, G41, R56
Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	N70, N73, N74
Njurbäckeninflammation	N390, N10, N11, N12, N136
Öra-näsa-halsinfektion	H66, H67, J02, J03, J06, J312
	Vårdtillfällen med samtidig hjärtkirurgi (åtgärds-koder som börjar på FN och FP) ingår inte

Korrigeringar har gjorts för skillnader i befolkningens ålderstruktur mellan olika landsting. Ålderstandardisering har gjorts med vårdade för ångestsyndrom som standardpopulation.

Datakällor

Patientregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Läkarkontakt i psykiatrisk öppenvård efter utskrivning vid depression (D8)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatorn visar andelen patienter som varit på ett läkarbesök i psykiatrisk öppenvård inom fyra respektive åtta veckor efter utskrivningen från den psykiatriska slutenvården. Indikatorn omfattar patienter med depressionssjukdom, i ålder 20–59 år, som vårdats någon gång under 2007–2010.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal vårdade för depression 20–59 år med läkar-kontakt i psykiatrisk öppenvård inom 4 respektive 8 veckor. <i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som vårdats för depression.

Huvuddiagnos	ICD 10
Depression	F321, F322, F323, F332, F333

Läkarkontakt räknas från första vårdtillfället under varje år.

Åldersstandardiserat med patienter med depression som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Datakällor

Patientregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för depression (D9)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatorn visar hur stor andel patienter i åldern 20–59 år som återinskrivs i den psykiatriska slutenvården med diagnosen depression under åren 2007–2009.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal patienter 20–29 år som återinskrivits inom 14 respektive 28 dagar på psykiatrisk klinik. <i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som vårdats för depression.

Huvuddiagnos	ICD 10
Depression	F321, F322, F323, F332, F333

Åldersstandardiserat med patienter med depression som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Datakällor

Patientregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig.

Återinskrivning inom tre respektive sex månader efter vård för depression (D10)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatorn visar andelen patienter 20–59 år som återinskrivs i psykiatrisk slutenvård med diagnosen depression under åren 2007–2010.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.

Indikatorns status	Nationell datakälla finns.				
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare:</i> Antal patienter 20-59 år som återinskrivits inom 3 respektive 6 månader psykiatrisk klinik.</p> <p><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som vårdats för depression.</p>				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Huvuddiagnos</th> <th>ICD 10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Depression</td> <td>F321, F322, F323, F332, F333</td> </tr> </tbody> </table>	Huvuddiagnos	ICD 10	Depression	F321, F322, F323, F332, F333
Huvuddiagnos	ICD 10				
Depression	F321, F322, F323, F332, F333				
	<p>Åldersstandardiserat med patienter med depression som standardbefolkning.</p> <p>Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.</p>				
Datakällor	Patientregistret, Socialstyrelsen				
Tolkningssvårigheter	Diagnostäckningen i patientregistret är inte fullständig.				

Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för bipolär diagnos (D11)

Mått	Andel, procent.				
Syfte	Indikatorn visar andelen patienter i åldern 20–59 år som återinskrivs med diagnosen bipolär sjukdom under åren 2007–2009.				
Målvärde	Nationell målnivå saknas.				
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.				
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare:</i> Antal patienter 20-29 år som återinskrivits inom 14 respektive 28 dagar på psykiatrisk klinik.</p> <p><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som vårdats för bipolär sjukdom.</p>				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Huvuddiagnos</th> <th>ICD 10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bipolär sjukdom</td> <td>F30–F31</td> </tr> </tbody> </table>	Huvuddiagnos	ICD 10	Bipolär sjukdom	F30–F31
Huvuddiagnos	ICD 10				
Bipolär sjukdom	F30–F31				
	<p>Åldersstandardiserat med patienter med bipolär sjukdom som standardbefolkning.</p> <p>Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.</p>				
Datakällor	Patientregistret, Socialstyrelsen.				
Tolkningssvårigheter	Diagnostäckningen i patientregistret är inte fullständig.				

Återinskrivning inom tre respektive sex månader efter vård för bipolär sjukdom (D12)

Mått	Andel, procent.				
Syfte	Indikatorn visar andelen patienter i åldern 20–59 år som återinskrivs med diagnosen bipolär sjukdom under åren 2007–2009.				
Målvärde	Nationell målnivå saknas.				
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.				
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal patienter 20-59 år som återinskrivits inom 3 respektive 6 månader psykiatrisk klinik. <i>Nämnnare:</i> Antal patienter 20–59 år som vårdats för bipolär sjukdom.				
	<table border="1"><thead><tr><th>Huvuddiagnos</th><th>ICD 10</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bipolär sjukdom</td><td>F30–F31</td></tr></tbody></table>	Huvuddiagnos	ICD 10	Bipolär sjukdom	F30–F31
Huvuddiagnos	ICD 10				
Bipolär sjukdom	F30–F31				
	Återinskrivning räknas från första vårdtillfället under varje år.				
	Åldersstandardiserat med patienter med bipolär sjukdom som standardbefolkning.				
	Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.				
Datakällor	Patientregistret, Socialstyrelsen.				
Tolkningssvårigheter	Diagnostäckningen i patientregistret är inte fullständig.				

Läkarkontakt i öppenvården efter utskrivning för bipolär sjukdom (D13)

Mått	Andel, procent.				
Syfte	Indikatorn visar andelen patienter med bipolär sjukdom som varit på ett läkarbesök i psykiatrisk öppenvård inom fyra respektive åtta veckor efter utskrivningen från psykiatrisk slutenvård. Indikatorn avser patienter i åldern 20–59 år som vårdats någon gång under år 2007–2010.				
Målvärde	Nationell målnivå saknas.				
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.				
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal vårdade för bipolär sjukdom 20-59 år med läkarkontakt i öppenvården inom 4 respektive 8 veckor. <i>Nämnnare:</i> Antal patienter 20–59 år som vårdats för bipolär sjukdom.				
	<table border="1"><thead><tr><th>Huvuddiagnos</th><th>ICD 10</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bipolär sjukdom</td><td>F30–F31</td></tr></tbody></table>	Huvuddiagnos	ICD 10	Bipolär sjukdom	F30–F31
Huvuddiagnos	ICD 10				
Bipolär sjukdom	F30–F31				
	Läkarkontakt räknas från första vårdtillfället under varje år.				

	Åldersstandardiserat med patienter med depression som standardbefolkning.
	Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.
Datakällor	Patientregistret, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	Diagnostäckningen i patientregistret är inte fullständig.

Följsamhet till antidepressiv läkemedelsbehandling (D14)

Mått	Andel, procent.				
Syfte	Indikatorn visar andelen av de patienter som får antidepressiv medicinering som fortsätter med denna behandling i minst ett halvår. I indikatorn ingår personer i åldern 20–59 år som behandlats med antidepressiva läkemedel under första halvåret 2011, och som hämtat ut minst ett antidepressivt läkemedel 2–5 månader senare.				
Målvärde	Nationell målnivå saknas.				
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.				
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 18 år och äldre på antidepressiv medicinering som hämtat ut ytterligare ett recept på antidepressiva 60 till 150 dagar efter det första uttaget. <i>Nämnnare:</i> Antal personer 18 år och äldre som hämtat ut minst ett recept på antidepressiv medicinering och som inte haft något uthämtat recept föregående 6 månader.				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Läkemedel</th> <th>ATC-kod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antidepressiva</td> <td>N06A</td> </tr> </tbody> </table>	Läkemedel	ATC-kod	Antidepressiva	N06A
Läkemedel	ATC-kod				
Antidepressiva	N06A				
Datakällor	Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.				
Tolkningssvårigheter	Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel ordinerade i slutna vård och dispenserade från läkemedelsförråd. Läkemedelsregistret saknar också uppgifter om förskrivningsorsak.				

Förskrivning av antidepressiva läkemedel i primärvården (D15)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatorn visar andelen personer i åldern 18–74 år som fick antidepressiva läkemedel förskrivet från primärvården, av alla dem som under 2010 fick något antidepressivt läkemedel förskrivet.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 18–74 år på antidepressiv medicinering som hämtat ut ett recept på antidepressiva läkemedel och förskrivets av läkare i primärvård. <i>Nämnnare:</i> Antal personer 18–74 år som hämtat ut minst ett

recept på antidepressiv medicinering.

Läkemedel	ATC-kod
Antidepressiva	N06A

Medicinska verksamhetsområdeskoder i läkemedelsregistret har använts för att identifiera att förskrivning har gjorts inom primärvården.

Datakällor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård och dispenserade från läkemedelsförråd. Läkemedelsregistret saknar också uppgifter om förskrivningsorsak.

Följsamhet till litiumbehandling vid bipolär sjukdom (D16)

Mått

Andel, procent.

Syfte

Indikatorn visar andelen personer med bipolär sjukdom i åldern 20-59 år som hade regelbunden litiumbehandling under 2010 och som fortsatt sin behandling under år 2011.

Målvärde

Nationell målnivå saknas.

Indikatorns status

Nationell datakälla finns.

Teknisk beskrivning

Täljare: Antal personer med fortsatt regelbunden litiumbehandling under nuvarande mätperiod.

Nämnare: Antal personer 18 år och äldre med regelbunden litiumbehandling under föregående mätperiod.

Läkemedel	ATC-kod
Litium	N05AN01

Med regelbunden medicinering menas uttag av litium under månad 1–4 samt under månad 9–12 under mätperioden.

Åldersstandardiserat med patienter som hämtat ut litium som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Datakällor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling med litium för patienter som uppnått remission efter manisk eller depressiv episod vid bipolär sjukdom (D17)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatoren visar andelen personer med bipolär sjukdom i åldern 20–59 år som fått återfallsförebyggande läkemedelsbehandling med litium efter en manisk eller depressiv episod under 2010.
Målvärde	Nationell målnivå saknas
Indikatorns status	Nationell datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer i åldern 20–59 år med litiumbehandling under nuvarande mätperiod. <i>Nämnare:</i> Antal personer i åldern 20–59 år med bipolär sjukdom.

Läkemedel	ATC-kod
Litium	N05AN01

Huvuddiagnos	ICD 10
Bipolär sjukdom	F30–F31

Datakällor	Läkemedelsregistret och patientregistret, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	

Läkemedelsbehandling med litium respektive antipsykotika för patienter med manisk episod vid bipolär sjukdom (D18)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatoren visar andelen personer med bipolär sjukdom i åldern 20–59 år som vårdats för manisk episod inom psykiatrisk slutenvård under åren 2008–2010 och som fått återfallsförebyggande läkemedelsbehandling under det senaste halvåret efter utskrivningen.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer som vårdats för manisk episod vid bipolär sjukdom (F30.0–F30.2) och som behandlats med litium (dvs. hämtat ut ett recept på litium inom 6 månader efter utskrivning) respektive antipsykotiska läkemedel. <i>Nämnare:</i> Totalt antal personer med pågående manisk episod vid bipolär sjukdom (F30.0–F32.3) med pågående kontakt på psykiatrisk klinik under motsvarande tidsperiod.

Läkemedel	ATC-kod
Litium	N05AN01

Huvuddiagnos	ICD 10
Bipolär sjukdom	F30.0–F32.3

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Tillgång till familjeinterventioner (P1)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatorn visar andelen landsting och kommuner/stadsdelar som kan erbjuda familjeinterventioner. Dessa erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning, som har kontakt med familj eller närstående.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare:</i></p> <p>Antal psykiatriska verksamheter (öppenvård) som vid svarstillfället anger att de i samarbete med kommunen har kommit överens om att ha tillgång till familjeinterventioner inom den egna verksamheten och/eller kommunens verksamhet för personer med schizofreni/liknande tillstånd, som har kontakt med familj/närstående.</p> <p><i>Nämndare:</i></p> <p>Antal psykiatriska verksamheter i riket.</p>
Datakällor	Landstings- och kommunenkät, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	Svarsfrekvens i enkätundersökningen och att insatser ges enligt nationella riktlinjerna.

Tillgång till stöd i föräldraskapet (P2)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatorn visar andelen landsting och kommuner/stadsdelar som kan erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning ett stöd i föräldraskapet.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare 1:</i></p> <p>Antal kommuner/stadsdelar som vid svarstillfället anger att de i samarbete med landstinget (psykiatri) har kommit överens om att för personer med schizofreni/liknande tillstånd som har minderåriga barn (0-18 år) har tillgång till stöd i sitt föräldraskap inom den kommunens och/eller psykiatrins verksamhet.</p> <p><i>Nämndare 1:</i></p> <p>Antal kommuner/stadsdelar i riket.</p> <p><i>Täljare 2:</i></p> <p>Antal psykiatriska verksamheter (öppen vård) som vid svarstillfället anger att de i samarbete med kommunen har kommit överens om att personer med schizofreni/liknande</p>

	tillstånd med minderåriga barn har tillgång till ett stöd i sitt föräldraskap inom den psykiatriska och/eller kommunens verksamhet.
	<i>Nämnare 2:</i> Antal psykiatriska verksamheter i riket.
Datakällor	Landstings- och kommunenkät, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	Svarsfrekvens i enkätundersökningen och att insatser ges enligt nationella riktlinjerna.

Tillgång till social färdighetsträning (P3)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatorn visar andelen kommuner och stadsdelar som i samarbete med landstinget (psykiatrin) kan erbjuda social färdighetsträning till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare 1:</i> Antal kommuner/stadsdelar som vid svarstillfället anger att de i samarbete med landstinget kommit överens om att ha tillgång till social färdighetsträning inom kommunens och/eller psykiatris verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning p.g.a. långvarig psykisk sjukdom. <i>Nämnare 1:</i> Antal kommuner/stadsdelar i riket. <i>Täljare 2:</i> Antal psykiatriska verksamheter som vid svarstillfället anger att de i samarbete med kommunen/stadsdelen har kommit överens om att ha tillgång till social färdighetsträning inom den psykiatriska och/eller kommunens verksamhet för personer med schizofreni/liknande tillstånd. <i>Nämnare 2:</i> Antal psykiatriska verksamheter i riket.
Datakällor	Landstings- och kommunenkät, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	Svarsfrekvens i enkätundersökningen och att insatser ges enligt nationella riktlinjerna.

Tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (P4)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatorn visar andelen landsting och kommuner /stadsdelar som kan erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen i samarbete med psykiatrin, kommun, Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan (FK).

Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare 1:</i> Antal kommuner/stadsdelar som vid svarstillfället kan erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning p.g.a. lång-varig psykisk sjukdom en arbetslivsinriktad enligt IPS-modellen i samverkan med psykiatrin, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.</p> <p><i>Nämndare 1:</i> Antal kommuner/stadsdelar i riket.</p> <p><i>Täljare 2:</i> Antal psykiatriska verksamheter (öppenvård) som vid svarstillfället anger att de kan erbjuda personer med schizofreni/liknande tillstånd en arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen i samverkan med kommunen/stadsdelen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.</p> <p><i>Nämndare 2:</i> Antal psykiatriska verksamheter i riket.</p>
Datakällor	Landstings- och kommunenkät, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	Svarsfrekvens i enkätundersökningen och att insatser ges enligt nationella riktlinjerna.

Tillgång till ett varierat utbud av sysselsättningsinsatser (P5)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Andelen kommuner/stadsdelar som kan erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning p.g.a. långvarig psykisk sjukdom ett varierat utbud av sysselsättningsinsatser inom den egna eller annan kommun, som kan anpassas efter individens behov och målsättning.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare:</i> Antal kommuner/stadsdelar som vid svarstillfället anger att de kan erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning p.g.a. långvarig psykisk sjukdom ett varierat utbud av sysselsättningsinsatser inom den egna eller annan kommun, som kan anpassas efter individens behov och målsättning.</p> <p><i>Nämndare:</i> Antal kommuner/stadsdelar i riket.</p>
Datakällor	Kommunenkat, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	

Hjälp till bostad vid hemlöshet (bostad först-modellen) (P6)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Andelen kommuner/stadsdelar som kan erbjuda hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning p.g.a. långvarig psykisk sjukdom en bostad. a) utan krav på behandlingsföljsamhet eller annan meritering. b) enligt en trappstegs-modell där målsättningen på sikt är eget boende.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal kommuner/stadsdelar som vid svarstillfället kan erbjuda hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning p.g.a. långvarig psykisk sjukdom en bostad. a) utan krav på behandlingsföljsamhet eller annan meritering. b) enligt en vårdkedjemodell där permanent bostad är målet. <i>Nämnare:</i> Antal kommuner/stadsdelar i riket
Datakällor	Kommunenkat, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	

Tillgång till samordnade vård- och stödåtgärder enligt ACT-modellen (P7)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatorn visar andelen landsting och kommuner som i samarbete kan erbjuda samordnade vård- och stödåtgärder enligt ACT-modellen till personer med psykisk funktionsnedsättning som är högkonsumenter av vård.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare 1:</i> Antal kommuner/stadsdelar som vid svarstillfället anger att de i samarbete med landstinget (psykiatri) kommit överens om att ha tillgång till samordnade vård- och stödinsatser enligt ACT-modellen inom kommunens och/eller psykiatrins verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning p.g.a. långvarig psykisk sjukdom som är högkonsumenter av vård. <i>Nämnare 1:</i> Antal kommuner/stadsdelar i riket. <i>Täljare 2:</i> Antal psykiatriska verksamheter som vid svarstillfället anger att de i samarbete med kommunen/stadsdelen kommit överens om att ha tillgång till samordnade vård- och stödinsatser enligt ACT-modellen inom den psykiatriska och/eller

	kommunens verksamhet för personer med schizofreni/liknande tillstånd som är högkonsumenter av vård. <i>Nämnare 2:</i> Antal psykiatriska verksamheter i riket.
Datakällor	Landstings- och kommunenkät, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	Svarsfrekvens i enkätundersökningen och att insatser ges enligt nationella riktlinjerna.

Gemensam inventering av behovet av åtgärder hos personer med psykisk funktionsnedsättning (P8)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatorn visar andelen kommuner och stadsdelar som tillsammans med den psykiatriska verksamheten regelbundet inventerar behovet av åtgärder för personer med psykisk funktionsnedsättning under perioden 1 januari 2009–21 november 2012.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal kommuner/stadsdelar som under den senaste fyraårsperioden tillsammans med den psykiatriska verksamheten har genomfört en inventering av behovet av insatser hos personer med psykisk funktionsnedsättning. <i>Nämnare:</i> Antal kommuner/stadsdelar i riket.
Datakällor	Kommunenkat, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	Svarsfrekvens i enkätundersökningen, kriterier för acceptabelt antal inventeringar och uppgifter.

Överenskommelse om samarbete mellan kommun och landsting (P9)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Andel kommuner/stadsdelar som har en aktuell överenskommelse om samarbete med landstinget (psykiatri) enligt lagstiftningen.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal kommuner/stadsdelar som har en aktuell överenskommelse om samarbete med landstinget (psykiatri) som innehåller gemensamma mål, resurs- och ansvarsfördelning mellan kommun och landsting, rutiner för samarbete mellan kommun och landsting kring enskilda personer med psykisk funktionsnedsättning samt gemensam uppföljning och utvärdering av överenskommelsen. <i>Nämnare:</i> Antal kommuner/stadsdelar i riket.
Datakällor	Kommunenkat, Socialstyrelsen.

Dödlighet bland vårdade för schizofreni (S1)

Mått	Antal per 10 000 invånare.				
Syfte	Indikatorn mäter dödligheten bland personer med schizofreni i åldern 20-59 år, som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatri.				
Målvärde	Nationell målnivå saknas.				
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.				
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare:</i> Antal avlidna 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för schizofreni.</p> <p><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för schizofreni.</p> <p>För befolkningen:</p> <p><i>Täljare:</i> Samtliga avlidna i åldersgruppen 20-59 år.</p> <p><i>Nämnare:</i> Sveriges medelbefolkning 20-59 år.</p>				
	<table border="1"><thead><tr><th>Huvuddiagnos</th><th>ICD 10</th></tr></thead><tbody><tr><td>Schizofreni</td><td>F20-F29</td></tr></tbody></table>	Huvuddiagnos	ICD 10	Schizofreni	F20-F29
Huvuddiagnos	ICD 10				
Schizofreni	F20-F29				
	Dödligheten mäts med Dödsorsaksregistret där alla avlidna beaktas oavsett dödsorsak.				
	Åldersstandardiserat med patienter med schizofreni som standardbefolkning.				
Datakällor	Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.				
Tolkningssvårigheter	Diagnostäckningen i patientregistret är inte fullständig.				

Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen för personer som vårdats inom den specialiserade psykiatri för schizofreni (S2)

Mått	Antal per 100 000 invånare.
Syfte	Indikatorn mäter antalet personer med schizofreni i åldern 20-59 år, som vårdats inom psykiatri någon gång mellan 2005-2009 och med undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare:</i> Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för schizofreni.</p> <p><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för schizofreni.</p> <p>För befolkningen:</p> <p><i>Täljare:</i> Samtliga personer med undvikbara slutenvårdstillfällen i åldersgruppen 20-59 år.</p> <p><i>Nämnare:</i> Sveriges medelbefolkning 20-59 år.</p>

Den geografiska fördelningen har gjorts på patienternas hemort.

Huvuddiagnos	ICD 10
Schizofreni	F20–F29

Följande sjukdomstillstånd och koder enligt ICD-10 ingår i måttet undvikbar slutenvård:

Huvuddiagnos	ICD-10
Kroniska tillstånd	
Anemi	D501, D508, D509
Astma	J45, J46
Diabetes	E101–E108 (huvud- eller bida- gnos) E110–E118 (huvud- eller bida- gnos) E130–E138 (huvud- eller bida- gnos) E140–E148 (huvud- eller bida- gnos)
Hjärtsvikt	I50, I110, J81
Högt blodtryck	I10, I119
Kroniskt obstruktiv lung- sjukdom	J41, J42, J43, J44, J47 J20 tillsammans med J41, J42, J43, J44, J47 som bidaagnos
Kärlkramp	I20, I240, I248, I249
Akuta tillstånd	
Blödande magsår	K250, K251, K252, K254, K255, K256, K260, K261, K262, K264, K265, K266, K270, K271, K272, K274, K275, K276, K280, K281, K282, K284, K285, K286
Diarré	E86, K522, K528, K529
Epileptiska krampanfall	O15, G40, G41, R56
Inflammatoriska sjukdo- mar i de kvinnliga bäck- enorganen	N70, N73, N74
Njurbäckeninflammation	N390, N10, N11, N12, N136
Öra-näsa-halsinfektion	H66, H67, J02, J03, J06, J312
	Vårdtillfällen med samtidig hjärtkirurgi (åtgärds-koder som börjar på FN och FP) ingår inte

Datakällor

Korrigeringar har gjorts för skillnader i befolkningens åldersstruktur mellan olika landsting. Ålderstandardisering har gjorts med vårdade för schizofreni som standard population. Patientregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för schizofreni (S3)

Mått

Andel, procent.

Syfte

Indikatorn visar andelen patienter i åldern 20–59 år som återinskrivs i den psykiatriska slutenvården med diagnosen schizofrenisjukdom under åren 2007–2009.

Målvärde

Nationell målnivå saknas.

Indikatorns status

Nationell datakälla finns.

Teknisk beskrivning

Täljare: Antal patienter 20–59 år som återinskrivits inom 14 respektive 28 dagar på psykiatrisk klinik.

Nämnare: Antal patienter 20–59 år som vårdats för schizofreni.

Huvuddiagnos	ICD 10
Schizofreni	F20–F29

Återinskrivning räknas från första vårdtillfället under varje år.

Ålderstandardiserat med patienter med schizofreni som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Datakällor

Patientregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Återinskrivningar efter sluten psykiatrisk vård för schizofreni inom tre respektive sex månader (S4)

Mått

Andel, procent.

Syfte

Indikatorn visar andelen patienter i åldern 20–59 år som återinskrivs i den psykiatriska slutenvården med diagnosen schizofrenisjukdom under åren 2007–2009.

Målvärde

Nationell målnivå saknas.

Indikatorns status

Nationell datakälla finns.

Teknisk beskrivning

Täljare: Antal patienter 20–59 år som återinskrivits inom 3 respektive 6 månader på psykiatrisk klinik.

Nämnare: Antal patienter 20–59 år som vårdats för schizofreni.

Huvuddiagnos	ICD 10
Schizofreni	F20–F29

Återinskrivning räknas från första vårdtillfället under varje år.

Åldersstandardiserat med patienter med bipolär sjukdom som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Datakällor

Patientregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Diagnostäckningen i patientregistret är inte fullständig. Det är svårt att bedöma i vilken mån återinskrivning kan och bör undvikas.

Läkarkontakt i psykiatrisk öppenvård efter utskrivning vid schizofreni (S5)

Mått

Andel, procent.

Syfte

Indikatoren visar andelen patienter som varit på ett läkarbesök i psykiatrisk öppenvård inom 4 respektive 8 veckor efter utskrivning från psykiatrisk slutenvård, och avser patienter 20–59 år med schizofrenisjukdom som vårdats inom psykiatrisk slutenvård någon gång under år 2007–2010.

Målvärde

Nationell målnivå saknas.

Indikatorns status

Nationell datakälla finns.

Teknisk beskrivning

Täljare: Antal vårdade för schizofreni 20-59 år med läkarkontakt i psykiatrisk öppenvård inom 4 respektive 8 veckor.
Nämnare: Antal patienter 20–59 år som vårdats för schizofreni.

Huvuddiagnos	ICD 10
Schizofreni	F20–F29

Läkarkontakt räknas från första vårdtillfället under varje år.

Åldersstandardiserat med patienter med schizofreni som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Datakällor

Patientregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Diagnostäckningen i patientregistret är inte fullständig.

Följsamhet till antipsykotiska läkemedel efter psykiatrisk slutenvård för personer med schizofreni (S6)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatoren visar andelen personer i åldern 20–59 år med diagnosen schizofreni som är utskrivna från psykiatrisk slutenvård och som hämtat ut antipsykotiska läkemedel vid minst ett tillfälle inom sex månader efter utskrivning.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Typ av indikator	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer som vårdats för schizofreni (F20–F29) och som behandlats med antipsykotiska läkemedel (dvs. hämtat ut ett recept på antipsykotiska läkemedel inom 6 månader efter utskrivning). <i>Nämnare:</i> Totalt antal personer med schizofreni (F20–F29) som vårdats för schizofreni (F20–F29) på psykiatrisk klinik under motsvarande tidsperiod.
Datakällor	Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel ordinerade i psykiatrisk slutenvård eller dispenserade från läkemedelsförråd.

Själv mord och psykisk sjukdom (Ö1)

Mått	Antal självmord.				
Syfte	Indikatoren visar andelen personer i alla åldrar med psykiatrisk diagnos som har haft kontakt med psykiatri (öppen-vård eller slutenvård) 12 månader innan fullbordat självmord.				
Målvärde	Nationell målnivå saknas.				
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.				
Teknisk beskrivning	<table border="1"><thead><tr><th>Dödsorsak</th><th>Diagnoskod - ICD 10</th></tr></thead><tbody><tr><td>Själv mord</td><td>X60–X84</td></tr></tbody></table>	Dödsorsak	Diagnoskod - ICD 10	Själv mord	X60–X84
Dödsorsak	Diagnoskod - ICD 10				
Själv mord	X60–X84				
Datakällor	Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.				
Tolkningssvårigheter					

Sjukhusvårdade efter självmordsförsök eller annan självtillfogad skada (Ö2)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatoren visar andelen personer i alla åldrar som varit sjukhusvårdade inom psykiatrisk slutenvård till följd av självmordsförsök eller annan självtillfogad skada.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.

Teknisk beskrivning	Huvuddiagnos	ICD 10
	Avsiktlig självdestruktiv handling	X60–X84
Datakällor	Patientregistret, Socialstyrelsen.	
Tolkningssvårigheter	Indikatorn visar enbart personer som varit sjukhusvårdade inom psykiatrisk slutenvård till följd av självmordsförsök eller annan självtillfogad skada. Bortfall i diagnostisering kan vara en felkälla.	

Dödlighet bland personer som vårdats inom psykiatrisk vård (Ö3)

Mått	Antal per 10 000 invånare				
Syfte	Indikatorn visar dödligheten bland personer i åldern 20–59 år som någon gång under åren 2007–2010 vårdats inom den specialiserade psykiatrin.				
Målvärde	Nationell målnivå saknas.				
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.				
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare:</i> Antal avlidna 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.</p> <p><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.</p> <p>För befolkningen: <i>Täljare:</i> Samtliga avlidna i åldersgruppen 20-59 år. <i>Nämnare:</i> Sveriges medelbefolkning 20-59 år.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Huvuddiagnos</th> <th>ICD 10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Psykisk sjukdom</td> <td>F00–F99 (exkl. F00–F03)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dödligheten mäts med dödsorsaksregistret där alla avlidna beaktas oavsett dödsorsak.</p> <p>Åldersstandardiserat med patienter med en psykiatrisk diagnos som standardbefolkning. Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort. Uppgift om underliggande dödsorsak hämtas från dödsorsaksregistret.</p>	Huvuddiagnos	ICD 10	Psykisk sjukdom	F00–F99 (exkl. F00–F03)
Huvuddiagnos	ICD 10				
Psykisk sjukdom	F00–F99 (exkl. F00–F03)				
Datakällor	Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.				
Tolkningssvårigheter	Diagnostäckningen i patientregistret är inte fullständig.				

Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet (Ö4)

Mått	Antal per 100 000 invånare.
Syfte	Indikatorn hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet beskriver effekterna av förebyggande insatser. I begreppet åtgärdbar dödlighet ingår dödlighet i ett antal utvalda diagnoser och dödsorsaker. Indikatorn visar antalet dödsfall per 100 000 invånare, i åldern 25–79 år, som någon gång de senaste fem åren vårdats inlaggande med en psykiatrisk huvuddiagnos, jämfört med personer som inte vårdats inom psykiatrin.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal avlidna 25-79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin. <i>Nämnare:</i> Antal patienter 25–79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.

För befolkningen:

Täljare: Samtliga avlidna i åldersgruppen 25-79 år.

Nämnare: Sveriges medelbefolkning 25-79 år.

Uppgifterna om antalet dödsfall under perioden har hämtats från dödsorsaksregistret genom följande koder:

Dödsorsak	ICD-9	ICD-10	Ålder
Lungcancer	162	C34	25–79 år
Cancer i matstrupe	150	C15	”
Levercirros	571	K70, K73–K74	”
Motortrafikolyckor	E810–823	V-koder under kap XX som avser motorfordonsolyckor i trafik	”

Huvuddiagnos	ICD 10
Psykisk sjukdom	F00–F99 (exkl. F00–F03)

Åldersstandardiserat med patienter med en psykiatrisk diagnos som standardbefolkning. Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Antalet dödsfall redovisas sammantaget för flera år för att öka den statistiska säkerheten.

Datakällor	Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	

Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (Ö5)

Mått	Antal per 100 000 invånare.
Syfte	Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet beskriver hur effektiv sjukvården är när det gäller att minska dödligheten i diagnoser som bedöms vara möjliga att påverka av hälso- och sjukvården med olika medicinska insatser samt genom tidig upptäckt och behandling.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare:</i> Antal avlidna 25-79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.</p> <p><i>Nämnare:</i> Antal patienter 25–79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.</p> <p>För befolkningen:</p> <p><i>Täljare:</i> Samtliga avlidna i åldersgruppen 25-79 år.</p> <p><i>Nämnare:</i> Sveriges medelbefolkning 25-79 år.</p>

Huvuddiagnos	ICD 10
Psykisk sjukdom	F00–F99 (exkl. F00–F03)

Uppgifterna om antalet dödsfall under perioden har hämtats från dödsorsaksregistret genom följande koder:

Dödsorsak	ICD-9	ICD-10	Ålder
Tuberkulos	010–018, 137	A15–A19, B90	25–79 år
Cervixcancer	180	C53	”
Hodgkins sjukdom	201	C81	”
Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393–398	I05–I09	”
Diabetes	250	E10–E14	”
Astma	493	J45–J46	”
Blindtarmsinflammation	540–543	K35–K38	”
Bukbräck	550–553	K40–K46	”
Gallsten samt kolecystit och utan uppgift om gallsten	574–575.1, 576.1	K80–K81, K83.0	”
Hypertonisjukdomar	401–405	I10–I15	”
Stroke	430–438	I60–I69	”
Komplikationer vid graviditet och förlossning samt i puerperiet	630–676	O00–O99	”
Tyfoidfieber	002.0	A01.0	”

Tetanus	037	A35	”
Osteomyelit	730	M86– M87	”

Åldersstandardiserat med patienter med en psykiatrisk diagnos som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Antalet dödsfall redovisas sammantaget för flera år för att öka den statistiska säkerheten.

Datakällor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningssvårigheter

Blodfettssänkande läkemedelsbehandling vid diabetes (Ö6)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatoren visar andelen läkemedelsbehandlade diabetespatienter som behandlas med blodfettssänkande läkemedel, uppdelat på de som någon gång under de senaste åren behandlats för depression, bipolär sjukdom, ångestsyndrom eller schizofreni i psykiatrisk öppen- eller slutenvård. Avser patienter i åldern 40–79 år.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Läkemedelsbehandlade diabetiker 40–79 år som hämtat ut minst ett recept på blodfettssänkande läkemedel. <i>Nämnare:</i> Totalt antal läkemedelsbehandlade diabetiker 40–79 år i läkemedelsregistret. Befolkningen: <i>Täljare:</i> Läkemedelsbehandlade diabetiker 40–79 år som hämtat ut minst ett recept på blodfettssänkande läkemedel. <i>Nämnare:</i> Totalt antal läkemedelsbehandlade diabetiker 40–79 år i läkemedelsregistret.

Läkemedel	ATC-kod
Diabetesläkemedel	A10
Blodfettssänkande	C10

Huvuddiagnos	Diagnoskod ICD 10
Psykisk sjukdom	F00–F99 (exkl. F00–F03)
Bipolär sjukdom	F30–F31
Depression	F321, F322, F323, F332, F333
Schizofreni	F20–F29

Datakällor	Läkemedelsbehandlade diabetiker har hämtats från Läkemedelsregistret, definierat som att man någon gång under året hämtat ut minst ett recept på något diabetesläkemedel. Av dessa har andelen som hämtat ut blodfettssänkande läkemedel studerats.
Tolkningssvårigheter	Personer med psykiatrisk sjukdom definieras som vårdad någon gång de senaste fem åren med psykiatrisk sjukdom Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Dödlighet efter hjärtinfarkt (Ö7)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatorn mäter andelen döda inom 28 dagar efter hjärtinfarkt bland personer i åldern 40–79 år vårdade för psykiatrisk sjukdom inom 5 år före hjärtinfarkten.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	Personer med psykiatrisk sjukdom definieras som vårdad någon gång de senaste fem åren med psykiatrisk sjukdom. <i>Täljare:</i> Antalet fall under mätperioden som avled inom 28 dagar (dag 0 till 27) efter hjärtinfarkt. <i>Nämnare:</i> Samtliga fall av hjärtinfarkt under mätperioden.
	Befolkningen: <i>Täljare:</i> Antalet fall under mätperioden som avled inom 28 dagar (dag 0 till 27) efter hjärtinfarkt. <i>Nämnare:</i> Samtliga fall av hjärtinfarkt under mätperioden.

Diagnos	Diagnoskod - ICD 10
Hjärtinfarkt	I21, I22

Huvuddiagnos	Diagnoskod ICD 10
Psykisk sjukdom	F00–F99 (exkl. F00–F03)
Bipolär sjukdom	F30–F31
Depression	F321, F322, F323, F332, F333
Schizofreni	F20–F29

Datakällor	Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	

Dödlighet efter förstagångsstroke (Ö8)

Mått	Andel, procent.
Syfte	Indikatoren mäter andelen personer i åldern 40–79 år som dött inom 28 respektive 90 dagar efter en förstagångsstroke. Jämförelsen utgår från personer som vårdats för psykisk ohälsa inom fem år före insjuknandet i en förstagångsstroke.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal avlidna 20-79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatri. <i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatri.

För befolkningen:

Täljare: Samtliga avlidna i åldersgruppen 20-79 år.

Nämnare: Sveriges medelbefolkning 20-79 år.

Diagnos	Diagnoskod - ICD 10
Stroke	I61, I63, I64

Huvuddiagnos	Diagnoskod ICD 10
Psykisk sjukdom	F00–F99 (exkl. F00-F03)
Bipolär sjukdom	F30–F31
Depression	F321, F322, F323, F332, F333
Schizofreni	F20–F29

Dödligheten mäts med Dödsorsaksregistret där alla avlidna beaktas oavsett dödsorsak.

Åldersstandardiserat med patienter med en psykiatrisk diagnos som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Uppgift om underliggande dödsorsak hämtas från Dödsorsaksregistret.

Datakällor	Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.
Tolkningssvårigheter	Diagnostäckningen i patientregistret är inte fullständig.

Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen (Ö9)

Mått	Antal per 100 000 invånare.
Syfte	Indikatoren mäter antalet personer i åldern 20-59 år som vid kroppslig sjukdom har fått slutenvård som hade kunnat undvikas. Resultatet redovisas som antal per 100 000 invånare fördelat på personer som vårdats inom psykiatri och den totala befolkningen.
Målvärde	Nationell målnivå saknas.
Indikatorns status	Nationell datakälla finns.
Teknisk beskrivning	<p><i>Täljare:</i> Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatri.</p> <p><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatri.</p>

För befolkningen:

Täljare: Samtliga personer med undvikbara slutenvårdstillfällen i åldersgruppen 20-59 år.

Nämnare: Sveriges medelbefolkning 20-59 år.

Huvuddiagnos	ICD 10
Psykisk sjukdom	F00-F99 (exkl. F00-F03)

Huvuddiagnos	ICD-10
Kroniska tillstånd	
Anemi	D501, D508, D509
Astma	J45, J46
Diabetes	E101-E108 (huvud- eller bidiagnos) E110-E118 (huvud- eller bidiagnos) E130-E138 (huvud- eller bidiagnos) E140-E148 (huvud- eller bidiagnos)
Hjärtsvikt	I50, I110, J81
Högt blodtryck	I10, I119
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom	J41, J42, J43, J44, J47 J20 tillsammans med J41, J42, J43, J44, J47 som bidiagnos
Kärlkramp	I20, I240, I248, I249
Akuta tillstånd	
Blödande magsår	K250, K251, K252, K254, K255, K256, K260, K261, K262, K264, K265, K266,

	K270, K271, K272, K274, K275, K276, K280, K281, K282, K284, K285, K286
Diarré	E86, K522, K528, K529
Epileptiska krampanfall	O15, G40, G41, R56
Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	N70, N73, N74
Njurbäckeninflammation	N390, N10, N11, N12, N136
Öra-näsa-halsinfektion	H66, H67, J02, J03, J06, J312
	Vårdtillfällen med samtidig hjärtkirurgi (åtgärds-koder som börjar på FN och FP) ingår inte

Korrigeringar har gjorts för skillnader i befolkningens åldersstruktur mellan olika landsting. Ålderstandardisering har gjorts med vårdade med psykiatrisk diagnos som standardpopulation.

Den geografiska fördelningen har gjorts på patienternas hemort.

Datakällor

Patientregistret, Socialstyrelsen.

Tolkningsvårigheter