

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 1998–2002

Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden
1998–2002



EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM

Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika [dokumenttyper](#). Detta är **Statistik**. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen samlat in, registrerat, bearbetat, sammanställt, analyserat och/eller kommenterat. Uppgifterna beskriver läge, tillstånd och/eller utveckling. Viss statistik ingår i Sveriges Officiella Statistik (SOS) och är då indelad i tre serier: Socialtjänst, Hälsa och sjukdomar och Hälso- och sjukvård.

Statistics-Health and Diseases
Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 1998–2002
The National Board of Health and Welfare
CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY



Information: Anders Karlsson, Epidemiologiskt Centrum,
Socialstyrelsen, tfn 08-5555 3220

Publicering på Internet <http://www.sos.se>: June 2004

Tidigare publicering:

Publikation i denna serie: Skador och förgiftningar i slutenvård 1987–1996, Sveriges officiella statistik, Hälsa och sjukdomar 1999:6.

Under 1960- och 1970-talen publiceras data i serien Socialstyrelsen redovisar, patientstatistik. Senare under 1970- och 1980-talen publiceras data i serien Statistiska meddelanden, serie HS.

Uppgifter från patientregistret publiceras också som Excel-tabeller och i det interaktiva tabellprogrammet Folkhälsan i siffror som finns på Epidemiologiskt Centrums hemsida: <http://www.sos.se/epc>.

Previous publication:

Publication in this series: Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 1987–1996, Official Statistics of Sweden, Health and diseases 1999:6.

More statistics from the Hospital Discharge Register is presented on the home pages of the Centre for Epidemiology: <http://www.sos.se/epc>.

Denna rapport bygger på uppgifter från patientregistret:
<http://www.sos.se/epc/par>

ISBN 91-7201-868-2
Artikelnr 2004-42-2

Förord

Denna publikation presenterar statistik över skador och förgiftningar behandlade i offentlig sluten sjukvård i Sverige för åren 1998–2002. Detta är en del av statistiken som finns i patientregistret. En motsvarande publikation över sjukdomar i sluten vård utkom i oktober 2003. Liknande publikationer avseende 1987–1996 publicerades 1999.

I ett internationellt perspektiv är den heltäckande statistik över personer vårdade i sluten sjukvård som presenteras här unik. Förutom i Danmark och Finland som har tillgång till likvärdiga register finns få exempel på motsvarande statistik i världen.

Statistik över sjukdomar och deras behandlingar har en lång tradition i Sverige. Redan på 1800-talet utgav Socialstyrelsens föregångare Sundhetscollegiet årligen sina 'Undernådiga berättelser' som ingick i Sveriges officiella statistik. Publiceringen fortsatte in på 1970-talet i Medicinalstyrelsens serie 'Allmän hälso- och sjukvård'.

Medicinalstyrelsen började på 1960-talet ersätta den summariska statistik som tidigare samlats in från sjukhusen med datoriserade patientregister. Dessa register gjorde det möjligt att framställa statistik med betydligt mer detaljerad information än tidigare. Rapporteringen till Socialstyrelsen var från början frivillig för den somatiska vården och det dröjde fram till 1987 innan den blev rikstäckande för offentlig, sluten sjukvård. I den senaste ändringen av den regeringsförordning som numera reglerar verksamheten vid patientregistret har anmälningssplikten utökats till att omfatta även den privata sjukvården och vissa delar av den öppna vården.

I slutet av 1960-talet började Socialstyrelsen presentera statistik från de nya registren i serien 'Socialstyrelsen redovisar, patientstatistik'. Så småningom fördes presentationen över till serien 'Statistiska meddelanden' i Sveriges officiella statistik. På grund av resursbrist inom Socialstyrelsen upphörde publiceringen vid mitten av 1980-talet. Sedan 1995 har vissa uppgifter publicerats i 'Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok'. Information om skador och förgiftningar har i första hand gjorts tillgänglig efter förfrågan och på senare år via EpC:s hemsida på Internet (www.sos.se/epc). Data har endast publicerats sporadiskt i officiella statistikserier.

Rapporten har sammanställts av Hanna Karlsson, med hjälp av Anders Karlsson.

Stockholm i juni 2004

Måns Rosén
Chef EpC

Innehåll

Förord	2
Preface	
Sammanfattning	10
Summary in Swedish	
Sammanfattning på engelska	12
Summary in English	
Ordlista	14
List of terms	
Patientregistrets historik	16
History of the Hospital Discharge Register	
Definitioner och begrepp	18
Definitions and concepts	
Material och metoder	19
Material and methods	
Datainsamling	19
Data collection	
Registerinnehåll	19
Register contents	
Innehållet i denna publikation	19
Contents of this publication	
Kvalitet i patientregistret	21
Quality of the Hospital Discharge Register	
Resultat	23
Results	
Yttre orsak	23
External cause	
Huvuddiagnos	25
Principle diagnosis	
Diagram	27
Diagrams	
Tabeller	35
Tables	
Bilaga 1	142
Appendix 1	
Gruppering av diagnoser	
Groups of diagnosis	

<i>Bilaga 2</i>	<i>Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död,</i>	
	<i>1998–2002</i>	<i>143</i>
Appendix 2	Groups of external causes of injury 1998–2002	
<i>Bilaga 3</i>	<i>Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död,</i>	
	<i>1987–2002</i>	<i>145</i>
Appendix 3	Groups of external causes of injury 1987–2002	
<i>Bilaga 4</i>	<i>Diagnosförteckning</i>	<i>146</i>
Appendix 4	Diagnosis codes, 3-digit level	
<i>Bilaga 5</i>	<i>Koder för yttre orsak till sjukdom och död</i>	<i>156</i>
Appendix 5	Codes for external causes of death, 3-digit level	

Diagramförteckning

Diagram 1.	Antal personer utskrivna från slutenvård med yttre orsak till sjukdom och död, per år 1998–2002	27
Diagram 2.	Antal personer utskrivna från slutenvård med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, per år 1998–2002	27
Diagram 3.	Andel personer vårdade per avsnitt i yttre orsak till sjukdom och död, 1998–2002	28
Diagram 4.	Antal personer per 100 000 invånare vårdade till följd av fallolycka, per år 1998–2002	29
Diagram 5.	Antal personer per 100 000 invånare vårdade till följd av intrakraniell skada respektive höftfraktur, per år 1998–2002	29
Diagram 6.	Antal kvinnor per 100 000 invånare vårdade till följd av transportolycka, per år 1998–2002	30
Diagram 7.	Antal män per 100 000 invånare vårdade till följd av transportolycka, per år 1998–2002	30
Diagram 8.	Antal kvinnor per 100 000 invånare vårdade till följd av avsiktligt självdestruktiv handling, per år 1998–2002	31
Diagram 9.	Antal män per 100 000 invånare vårdade till följd av avsiktligt självdestruktiv handling, per år 1998–2002	31
Diagram 10.	Andel personer vårdade per utvalda diagnosavsnitt, 1998–2002	32
Diagram 11.	Antal kvinnor per 100 000 invånare vårdade till följd av några typer av frakturer, per år 1998–2002	33
Diagram 12.	Antal män per 100 000 invånare vårdade till följd av några typer av frakturer, per år 1998–2002	33
Diagram 13.	Antal personer per 100 000 kvinnor respektive 100 000 män i åldersgrupperna 65-74 år, 75-84 år och 85+ år, vårdade till följd av höftfraktur, per år 1998–2002	34

List of diagrams

Diagram 1.	Number of persons discharged with an external cause of injury and death, by year 1998–2002	27
Diagram 2.	Number of persons discharged with an injury or poisoning , by year 1998–2002	27
Diagram 3.	Number of persons treated per section of external cause of injury and death, 1998–2002	28
Diagram 4.	Number of persons treated due to falls, per year 1998–2002	29
Diagram 5.	Number of persons per 100 000 inhabitants treated due to intracranial injury respective fracture of the hip, per year 1998–2002	29
Diagram 6.	Number of women per 100 000 inhabitants treated due to transport accidents, per year 1998–2002	30
Diagram 7.	Number of men per 100 000 inhabitants treated due to transport accidents, per year 1998–2002	30
Diagram 8.	Number of women per 100 000 inhabitants treated due to suicide and self-inflicted injuries, per year 1998–2002	31
Diagram 9.	Number of men per 100 000 inhabitants treated due to suicide and self-inflicted injuries, per year 1998–2002	31
Diagram 10.	Percentage of persons treated by chosen ICD-sections, 1998–2002	32
Diagram 11.	Number of women per 100 000 inhabitants treated due to different kinds of fractures, per year 1998–2002	33
Diagram 12.	Number of men per 100 000 inhabitants treated due to different kinds of fractures, per year 1998–2002	33
Diagram 13.	Number per 100 000 women respectively 100 000 men aged 65-74, 75-84 and 85+, treated due to fracture of the hip, per year 1998–2002	34

Tabellförteckning

Tabell 1. Bortfall i yttre orsak till sjukdom och död. Procent personer med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, med avsaknad av yttre orsak till sjukdom och död	22
Tabell 2. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per kön, åldersgrupp och år	35
Tabell 3. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per län, kön och år	36
Tabell 4. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per kön, åldersgrupp och år	37
Tabell 5. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per län, kön och år	38
Tabell 6. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tids-perioden	39
Tabell 7. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden	49
Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år	59
Tabell 8b. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år	70
Tabell 9. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per kön, åldersgrupp och år	74
Tabell 10. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per län, kön och år	75
Tabell 11. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per kön, ålder och år	76
Tabell 12. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per län, kön och år	77
Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden	78
Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden	98
Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgroup, kön, ålder och år	118
Tabell 16. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per kön och år, 1987–2002	131
Tabell 17. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per kön och år, 1987–2002	136

List of tables

Table 1.	Missing observations in external cause of injury and death. Percent patients with an injury or poisoning missing external cause of injury and death	22
Table 2.	Number of patients with an injury or poisoning by sex, age and year	35
Table 3.	Number of patients with an injury or poisoning by county, sex and year	36
Table 4.	Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by sex, age and year	37
Table 5.	Number of patients with an injury or poisoning by county, sex and year	38
Table 6.	Number of patients with an injury or poisoning by ICD-diagnosis, sex and age	39
Table 7.	Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-diagnosis, sex and age	49
Table 8a.	Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year	59
Table 8b.	Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year	70
Table 9.	Number of patients with external cause of injury and death by sex, age and year	74
Table 10.	Number of patients with external cause of injury and death by county, sex and year	75
Table 11.	Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by sex, age and year	76
Table 12.	Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by county, sex and year	77
Table 13.	Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period	78
Table 14.	Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period	98
Table 15.	Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year	118
Table 16.	Number of patients with external cause of injury and death by sex and year, 1987–2002	131
Table 17.	Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by sex and year, 1987–2002	136

Sammanfattning

Socialstyrelsens patientregister har funnits i olika former och med olika benämningar sedan 1960-talet. Heltäckande, d v s omfattande all sluten offentlig sjukvård, har registret varit sedan 1987. Under perioden 1998–2002 har diagnosuppgifter och uppgifter om yttre orsak till sjukdom och död rapporterats enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, en svensk version av Världshälsoorganisationens International Classification of Diseases, 10:e revisionen (ICD10).

I denna publikation redovisas statistik över antalet personer som vårdats med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker eller har registrerats med uppgift om yttre orsak till sjukdom och död under perioden 1998–2002. Det är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), diagnoser (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän. Bortfallet för huvuddiagnos ligger omkring en procent per år. För kön och ålder rör sig bortfallet om bråkdelar av promille medan det för hemortslän uppgår till ett par promille. Kvalitetsmässigt är yttre orsak till sjukdom och död problematiskt. Bortfallet i denna variabel uppgår till mellan 2,6 och 11,8 procent per år men är dock koncentrerat till ett fåtal landsting. En minskning ses under de senare åren. Då utvecklingen tolkas, måste det minskade bortfallet uppmärksammas, då det kan vara en orsak till en eventuell trendökning.

Totalt har antalet utskrivna personer med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker minskat under femårsperioden från 117 000 till 114 000 per år. På motsvarande sätt har antalet personer med angiven yttre orsak till sjukdom och död ökat från 123 000 till 132 000. En förklaring till att fler personer vårdats med yttre orsak till sjukdom och död än med skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som huvuddiagnos är att denna kod även kan anges när skadan eller förgiftningen behandlats som bidiagnos. En viss del av ökningen kan förklaras av ett minskat bortfall under perioden.

Förändringar i vårdutnyttjande över tiden kan ha flera orsaker. Antalet skadade eller förgiftade i befolkningen kan öka eller minska, behandlingsideologi, ny teknik för diagnostik och behandling kan utvecklas och organisationen kan ändras. Under den aktuella perioden har många nya medicinska åtgärder och behandlingsprinciper införts och fått fotfäste i sjukvården. Sjukvårdsorganisationen har genomgått stora strukturomvandlingar, sjukhus har lagts ner eller slagits samman och tillgången till slutenvårdsplatser har minskat på många håll. Förändringar av det senare slaget förklarar sannolikt en del av de upp- och nedgångar som här redovisas för vissa typer av skador, förgiftningar och yttre orsaker. En annan orsak kan vara demografiska förändringar.

Bland yttre orsaker som i olika utsträckning ökat i omfattning inom den slutna vården finns bland annat transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik, kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället, sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död, avsiktligt självdestruktiv handling samt exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer.

De yttre orsaker som minskat i omfattning är bland annat fallolyckor samt förgiftningsolyckor och exponering för farliga ämnen.

Bland huvuddiagnoserna skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som ökat i omfattning finns bland annat fraktur på övre extremitet, annan intrakraniell skada utan fraktur samt skallfrakturer.

Motsvarande minskning kan ses bland hjärnskakningar, fraktur på nedre extremitet samt fraktur på halsens och bålens ben.

Summary in English

The Swedish Hospital Discharge Register started in 1964. Since 1987 the register covers all public in-patient care. During 1998–2002 the Swedish version of WHO's International Classification of Diseases, 10th revision has been used.

This report presents statistics on the number of in-patients discharged from hospitals due to injuries and poisoning during the period 1998–2002. The statistical tables shows the number of patients each year by principal diagnosis, external cause of disease and death, sex, age and place of residence (county).

The number of missing observations in the reporting to the register is estimated to between one and two per cent.

- For almost every discharge information on sex and age is available.
- Information on place of residence is missing for 0,2 per cent of the discharges.
- The personal identification number, that makes it possible to calculate the number of patients (individual persons) in the register, is missing for one per cent.
- Principal diagnosis is missing for one per cent and studies of validity shows that the diagnoses might be wrong in about 10 per cent of the cases (on the three-digit level) with a large variance between different diagnoses.
- Missing external causes of disease and death have decreased from 11,8 to 2,6 per cent during the period. The drop-out is concentrated to a few counties.

The number of persons treated in hospital due to an diagnosis of injury or poisoning has decreased from 117 000 in 1998 to 114 000 in 2002. In corresponding way, the number of persons treated with an external cause of disease and death has increased from 123 000 to 132 000.

Among more common external causes of disease and death an increase can be seen for:

- transport accidents with vehicles mainly aimed for road traffic,
- surgical and other medical measures causing abnormal or late complication with patient without association to misadventures at the operation or treatment occasion,
- late effects of accidental injury,
- intentional selfharm and
- exposure through accident to other and unspecified factors.

External causes of disease and death that have decreased are e.g. falls and poisoning accidents and exposure to harmful substances.

Among injury diagnosis that have increased are:

- fractures on upper limbs,
- fractures of the skull and other intracranial injuries.

Injury diagnosis that have decreased are e.g. concussions, fractures on lower limbs and fractures on bones in the neck or trunk.

Many of those changes are due to introduction of new methods for diagnostics and therapy. Also changes in the organisation in health care is an important factor in explaining the changes of the diagnosis pattern amongst in-patients.

For explanation of codes used in the tables please refer to the International Classification of Diseases, ICD10 and to appendix.
--

List of terms

Anknytning	Association
Antal	Number
Avsedd	Intended
Avsiktligt självdestruktiv handling	Intentional selfharm
Behandlad	Treated
Belastning	Strain
Biologiska substanser	Biological substances
Båda könen	Both sexes
Bål	Trunk
Diagnos	Diagnosis
Diagnosavsnitt	ICD-section
Diagnosgrupp	ICD-group
Droger	Drugs
Därav	Of which
Efter	After
Epidemiologiskt Centrum	Centre for Epidemiology
Extremiteter	Limbs
Fallolyckor	Falls
Farliga ämnen	Harmful substances
Fordon	Vehicles
Fraktur	Fracture
Företrädesvis	Mainly
Förgiftning	Poisoning
Hjärnblödning	Cerebral haemorrhage
Hjärnskakning	Concussion
Hud	Skin
Huvuddiagnos	Principle diagnosis
Höftfraktur	Fracture of the hip
Intrakraniell skada	Intracranial injury
Invånare	Inhabitants
Kirurgisk	Surgical
Komplikation	Complication
Krosskada	Contusion
Kvinnor	Women
Kön	Sex
Läkemedel	Medicaments
Län	County
Medicinsk	Medical
Miljöfaktorer	Environmental factors
Missöden	Misadventures
Mord	Homocide
Motorfordon	Motor vehicle
Män	Men

Naturfaktorer	Natural factors
Och	And
Offentlig	Public
Ogynnsamma effekter	Adverse effects
Olycksfall	Accident
Onormal	Abnormal
Ospecificerat	Unspecified
Patienter	Patients
Patientregistret	Hospital Discharge Register
Personer	Persons
Procent	Per cent
På grund av	Due to
Påfrestande rörelser	Strenuous movements
Ryggrad	Vertebral column
Sena effekter	Late effects
Sjukdom	Disease
Själv mord	Suicide
Skada	Injury
Skalle	Skull
Sluten vård	In-patient care
Socialstyrelsen	National Board of Health and Welfare
Stukning, vrickning	Sprain
Terapeutiskt bruk	Therapeutic use
Tidigare	Earlier
Transportolycksfall	Transport accident
Under	During
Urledvridning	Dislocation
Utskrivna	Discharged
Vanlig	Frequent
Vård	Care
Vägtrafik	Road traffic
Ytliga skador	Superficial injuries
Yttre orsak	External cause
Ålder	Age
År	Year
Överanstängning	Overexertion
Övriga	Others

Patientregistrets historik

Under större delen av 1900-talet rapporterade sjukhusen till Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen summariska sammanställningar över frekvenser av diagnoser och kirurgiska ingrepp i särskilda bilagor till sina årsberättelser.

1962 började dåvarande Medicinalstyrelsen samla in individuella uppgifter för patienter utskrivna från sjukhus och kliniker för psykiatrisk vård. Denna insamlingsrutin var från början rikstäckande.

1964 startade Medicinalstyrelsen en försöksverksamhet med motsvarande registrering för den slutna somatiska vården. På grund av det stora antalet patienter som årligen skrevs ut från den somatiska vården bedrevs försöksverksamheten inom ett begränsat geografiskt område, dåvarande Uppsala sjukvårdsregion. Snart gavs även möjlighet, för de sjukvårdshuvudmän som så önskade, att till Socialstyrelsen årligen leverera motsvarande data som samlades in inom försöksverksamheten. De slapp i gengäld att redovisa summariska sammanställningar per sjukhus över antal diagnoser och operationer, de s k C- och D-redogörelserna i sjukhusens årsberättelser.

Uppgifterna från den psykiatriska vården insamlades på blanketter som granskades och överfördes till datoriserade register av Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen. Även inom försöksverksamheten för den somatiska vården, som pågick till och med 1969, tillämpades motsvarande rutiner. De huvudmän som frivilligt anslöt sig till systemet levererade dock uppgifterna på datamedium.

Från början omfattade rapporteringen från kroppssjukvården även förlossningar. 1973 inrättades det medicinska födelseregistret med information om samtliga förlösta kvinnor och deras barn. I samband därmed upphörde insamling av förlossningsuppgifter till registret över slutna somatisk vård.

Under 1970-talet anslöt sig allt fler sjukvårdshuvudmän till rapporteringssystemet. 1983 täckte registreringen cirka 85 procent av utskrivningarna från den somatiska vården och i princip hela den psykiatriska vården. Genom en överenskommelse mellan staten och huvudmännen inskriven i det första s k Dagmaravtalet beslöts att de offentliga sjukvårdshuvudmännen skulle inrätta patientdatabaser med ett minimiinnehåll som omfattade samtliga uppgifter om den slutna vården som ingick i den individbundna rapporteringen. Samtidigt beslöt man att slå samman rapporteringen från somatisk och psykiatrisk vård. På riksnivå skulle uppgifterna samlas i ett enda register, som då kallades slutenvårdsregistret.

För registren över somatisk och psykiatrisk vård hade patienternas personnummer använts för att t.ex. beräkna deras ålder och kön samt för att kontrollera att dubletter inte förekom i registren. Personnumren utnyttjades också för att studera flöden mellan olika kliniker, förekomst av återintagningar vid olika kliniker eller för olika patientgrupper, framställning av den typ av statistik som presenteras i denna publikation samt vid epidemiologiska studier, där personnumret är nödvändigt t.ex. för att:

- undersöka samband mellan exponering för riskfaktorer och sjukhusvård
- studera överlevnad för olika kategorier patienter
- undersöka samband mellan diagnoser eller operationer i den slutna vården och senare tumörförekomst eller annan sjuklighet
- studera skillnader i vårdutnyttjande mellan t.ex. olika socioekonomiska grupper.

Socialstyrelsen sökte och fick Datainspektionens tillstånd att föra det nya registret från 1984 som personregister. Justitiekanslern besvärade sig över Datainspektionens beslut med hänvisning till oklarheter beträffande sekretesskyddet. Socialstyrelsen beslöt 1985 att i avvaktan på en tydligare lagreglering, som då bedömdes vara nära förestående, inte inrätta det personregister styrelsen fått tillstånd till. Uppgifterna till slutenvårdsregistret samlades därför in utan personnummer.

Det dröjde sedan ända till 1993 innan Socialstyrelsen genom en regeringsförordning (SFS 1993:1058) åter fick möjlighet att föra ett register med personnummer. Efter denna förändring kallas registret patientregistret.

Förordningen gav även möjlighet att retroaktivt komplettera registret med personuppgifter från 1984 och framåt. De flesta sjukvårdshuvudmän lyckades återskapa uppgifterna för de år registret tidigare fördes i oidentifierad form. Patientregistret täcker sålunda för perioden från 1987 hela riket och innehåller uppgifter om alla patienter som vårdats i slutet offentlig sjukvård. Från 1987 ingår åter vårdtillfällen i samband med förlossningar i patientregistret.

De äldsta uppgifterna i patientregistret avser år 1964. I de tidigaste årgångarna finns enbart uppgifter från det område som ingick i Uppsala sjukvårdsregion vid denna tid, dvs landstingen i Uppsala, Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län samt delar av Västmanlands och Västernorrlands läns landsting. För Uppsala och Gävleborgs län finns en obruten tidsserie från 1964 till 2002. För perioden 1964–1972 finns endast uppgifter angående somatisk vård. Uppgifter från psykiatrisk vård för denna tid har gallrats. En förteckning över vilka landsting/sjukhus som ingår i patientregistret år för år finns på registrets hemsida, <http://www.sos.se/epc/par> under rubriken ”Historik”.

Registret är för närvarande under utveckling i och med att rapporteringsskyldighet har införts även för privata vårdgivare och för delar av den öppna sjukvården. De uppgifter i denna publikation som avser vård hos privata vårdgivare utgör endast en marginell andel. Rapporteringen från öppen vård har fortfarande för stora brister för att publiceras inom ramen för den officiella statistiken men kan användas för forskningsändamål.

Patientregistret förs numera med stöd av lagen om hälsodataregister (1998:543) och förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen (2001:707).

Definitioner och begrepp

I föreliggande publikation har nedanstående definitioner använts.

Bidiagnos: annat tillstånd än huvuddiagnosen som haft relevans vid ett slutenvårdstillfälle.

Diagnos: benämning på sjukdom. I patientregistret för perioden 1998–2002 har diagnosen kodats i enlighet med Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10). 1987–1996 användes Klassifikation av sjukdomar 1987 motsvarande ICD9. För år 1997 har båda klassifikationerna använts parallellt.

Diagnoskategori: den treställiga diagnoskoden i respektive sjukdomsklassifikation.

Folkmängd: folkmängden i en viss population vid årets slut, den 31 december.

Huvuddiagnos: det tillstånd (här skada eller förgiftning) vars utredning och behandling varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

ICD: International Classification of Diseases, WHO:s internationella klassifikation av sjukdomar.

Patient: person som erhåller vård eller är registrerad för att erhålla vård. Ledsagare och nyfödda friska barn räknas inte som patienter. Här avgränsas patienter till sådana med minst ett slutenvårdstillfälle under aktuell period. Eftersom en och samma person kan förekomma med flera skadediagnoser och under flera perioder kan i allmänhet inte antalet personer summeras i de redovisade tabellerna.

Sluten vård: hälso- och sjukvård som ges till patient som är inskriven vid vårdenhet (medicinskt verksamhetsområde, klinik)

Slutenvårdstillfälle: vårdkontakt som avgränsas av inskrivning till och utskrivning från enhet för sluten sjukvård (medicinskt verksamhetsområde, klinik).

Yttre orsaker till skador och förgiftningar: anger skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, dvs händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsak till skada och förgiftning. 1998–2002 klassificeras uppkomstsättet med hjälp av en tilläggsklassifikation, Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. 1987–1997 har Yttre orsaker till skador och förgiftningar (den så kallade E-serien), i Klassifikation av sjukdomar 1987 använts. 1997 har båda klassifikationerna använts parallellt.

Material och metoder

Datainsamling

Uppgifterna till patientregistret insamlas en gång per år från sjukvårdens huvudmän. Till och med år 1997 har endast landstingen haft uppgiftsskyldighet men från 1998 omfattas alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården av uppgiftsskyldigheten.

Uppgifterna skall numera lämnas till Socialstyrelsen senast den 30 april året efter verksamhetsåret, samlat för huvudmannens hela slutna sjukvård. Sjukvårdshuvudmännen ansvarar själva för de grundsystem (patientadministrativa system) från vilka uppgifterna sammanställs och för de rutiner enligt vilka uppgifterna registreras.

Uppgifterna lämnas på maskinläsbart medium i enlighet med av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter, den senaste versionen för den i denna publikation aktuella perioden var SOSFS 2002:1.

Registerinnehåll

De uppgifter som ingår i patientregistret är patientens personnummer, kön, ålder och hemort, vårdande sjukhus och klinik (medicinskt verksamhetsområde), inskrivningsdatum, utskrivningsdatum och vårdtid, diagnoser och operationer, yttre orsak till skador och förgiftningar, inskrivningssätt, utskrivningssätt, planerad/oplanerad inskrivning samt avtalstyp. För en utförligare beskrivning av dessa variabler hänvisas till Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2002:1 eller till Socialstyrelsens hemsida (<http://www.sos.se/epc/par>). Information kan också beställas från Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen.

Innehållet i denna publikation

I denna publikation redovisas uppgifter från patientregistret avseende åren 1998–2002. Publikationen omfattar personer som vårdats med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker eller rapporterats med uppgift om yttre orsak till sjukdom och död.

I föreliggande rapports resultattabeller redovisas endast måttet antal utskrivna personer. Redovisning sker dels i absoluta tal dels per 100 000 invånare. De flesta tabeller innehåller frekvenser per år men i något fall redovisas frekvenserna för hela perioden sammantaget. Diagnoserna för skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (kapitel 19 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas enligt avsnitt i kapitel 19, enligt bilaga 1 samt på kategorinivå (treställig diagnoskod).

Yttre orsaker till sjukdom och död (kapitel 20 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas dels efter avsnitt enligt bilaga 2, dels på

kategorinivå (treställig yttre orsakskod). Yttre orsaker till sjukdom och död redovisas även för perioden 1987–2002 enligt gruppering i bilaga 3.

På grund av utrymmesskäl redovisas treställiga diagnos- och yttre orsakskoder endast med koder. Förklaringar till dessa koder finns i bilaga 4 och 5.

Kvalitet i patientregistret

För perioden 1998–2002 omfattar patientregistret totalt cirka 7,5 miljoner vårdtillfällen, varav cirka 700 000 med skada eller förgiftning som huvuddiagnos. Jämförelser som tidigare gjorts dels med den basårsstatistik som tidigare samlats in av Landstingsförbundet dels över variationer i rapportering från år till år tyder på att det kan föreligga en underrapportering till patientregistret på någon procent vad gäller den somatiska korttidsvården. För den geriatriska och den psykiatriska sjukvården är en sådan uppskattning mycket svår att göra bland annat på grund av de snabba organisationsförändringar som präglar den aktuella perioden.

Regelmässigt görs kvalitetskontroller av inrapporterade uppgifter, så långt dessa kan göras maskinellt. Därvid granskas fullständighet i rapportering samt om inrapporterade variabler har giltiga värden.

Beträffande de uppgifter som är av betydelse för denna presentation kan följande resultat från kvalitetskontrollerna noteras:

Giltiga personnummer har rapporterats vid cirka 99 procent av vårdtillfällena. Bortfallet var störst, 1,7 procent, 2002. Det varierar också mycket mellan olika huvudmän. En stor del av bortfallet – cirka 40 procent – avser nyfödda barn eller personer bosatta utanför Sverige. De nyfödda barnen i bortfallet har oftast inte hunnit få något personnummer vid vårdtillfället. En del huvudmän lyckas dock i stort sett eliminera denna del av bortfallet genom att efter det att vårdtillfället avslutats inhämta barnets personnummer.

Kön rapporteras i stort sett alltid och bortfallet för *ålder* är för hela perioden cirka 0,1 promille. Att ålder kan beräknas trots att personnumret är inkomplett beror på att födelsedatum oftast är komplett eller åtminstone födel-seår rapporteras.

Bortfallet vad gäller *huvuddiagnos* har under perioden legat omkring en procent per år. Detta avser den treställiga diagnoskod som redovisas i denna publikation. Vid en studie som gjorts på urval av cirka 1 000 vårdtillfällen inom somatisk korttidsvård 1990 har ytterligare uppgifter om kvaliteten i huvuddiagnosen analyserats. Därvid har konstaterats en felrapportering av treställiga huvuddiagnoskoder på mellan 10 procent vid en liberal bedömning och 12 procent vid en mer sträng bedömning. Större delen av de konstaterade felen i den studien berodde på felkodning eller på felaktig diagnos-sättning, medan överföringsfelen till patientregistret låg under 1 procent. På diagnoskapitelnivån låg den totala felrapporteringen på cirka 7 procent. Diagnoskvaliteten skiljer sig mellan sjukdomsgrupper och mellan åldersgrupper och därmed också mellan olika kliniktyper. Kvalitetsstudierna redovisas på patientregistrets hemsida <http://www.sos.se/epc/par>.

Andelen vårdtillfällen som har huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker och samtidigt saknar yttre orsak till sjukdom och död har minskat under åren från 11,8 procent 1998 till 2,6 procent 2002 (se tabell 1). Bortfallet varierar mellan landsting. Landstinget i Östergötland svarar för cirka en tredjedel av bortfallet. Vissa andra landsting så-

som Jönköpings län, Skåne län och Norrbotten län har stora bortfall enstaka år. De flesta län har dock mycket litet bortfall. När en tolkning av utvecklingen görs, måste det minskade bortfallet uppmärksammas då det kan vara en orsak till en eventuell trendökning.

Tabell 1. Bortfall i yttre orsak till sjukdom och död. Procent personer med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, med avsaknad av yttre orsak till sjukdom och död. Missing observations in external cause of injury and death. Percent patients with an injury or poisoning missing external cause of injury and death.

Hemlän	1998	1999	2000	2001	2002	Snitt
Stockholm	1,0	10,4	13,6	0,2	0,1	5,1
Uppsala	0,6	0,5	0,7	0,2	0,8	0,6
Södermanland	7,5	1,1	0,6	0,4	0,1	2,0
Östergötland	47,5	47,6	54,7	43,6	30,5	44,8
Jönköping	31,4	7,9	6,6	5,7	4,3	11,3
Kronoberg	3,1	0,4	1,1	0,6	0,6	1,2
Kalmar	3,8	3,7	3,8	3,3	3,7	3,6
Gotland	0,5	0,2	0,6	0,5	0,1	0,4
Blekinge	4,1	0,3	0,1	0,7	0,2	1,1
Skåne	44,1	4,3	0,4	0,2	0,2	10,1
Halland	2,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,5
Västra Götaland	3,3	7,0	4,6	4,5	1,9	4,3
Värmland	11,8	1,3	9,4	1,7	0,8	5,0
Örebro	1,8	1,0	1,0	1,5	1,6	1,4
Västmanland	0,4	0,6	0,4	0,6	0,9	0,6
Dalarna	1,3	0,4	0,6	0,3	0,1	0,6
Gävleborg	11,7	0,2	0,3	0,1	0,1	2,6
Västernorrland	0,3	0,1	0,2	0,0	0,3	0,2
Jämtland	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1
Västerbotten	0,6	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2
Norrbotten	24,5	24,0	7,4	2,4	6,1	13,2
Totalt	11,8	7,4	7,2	3,7	2,6	6,6

För patientens hemort ligger bortfallet av hemortslän omkring 0,2 procent förutom vid slutet av perioden då bortfallet var något högre. Detta hänger samman med ett högre bortfall av personnummer dessa år. Förutom bortfallet i hemortskoden förekommer också att patienten registrerats som boende utomlands eller som asylsökande utan angivande av hemort.

I bearbetningarna för denna publikation har inkluderats personer med giltiga värden för personnummer, kön, ålder och hemort. Hemortskoden har betraktats som giltig om hemortslän varit korrekt.

Resultat

Under femårsperioden 1998–2002 vårdades i genomsnitt ca 116 000 personer årligen inskrivna på sjukhus med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Antalet har minskat från 117 585 personer vid periodens början till 114 208 vid periodens slut. Utvecklingen per kön visas i diagram 2. Minskningen har varit större för kvinnorna än för männen.

Till varje skade- eller förgiftningsdiagnos skall det i patientregistreringen finnas en uppgift om den yttre orsaken till sjukdom och död. Det gäller oavsett om skadan behandlas som huvud- eller bidiagnos. Yttre orsak till sjukdom och död kan även anges utan att diagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker förekommer om angivande av en yttre orsak bedöms som adekvat. I de tabeller som presenteras här är därför antalet vårdade med yttre orsak något fler än antalet vårdade med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker.

I genomsnitt vårdades årligen ca 128 000 personer med yttre orsak till sjukdom och död under den aktuella perioden. Beträffande yttre orsaksrapporteringen kan en ökning konstateras. År 1998 rapporterades 123 394 personer ha vårdats och skrivits ut med en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död. Motsvarande antal var 132 927 personer 2002. Denna utveckling visas könsuppdelad i diagram 1. Ökningen har varit större för männen än för kvinnorna. Den ökande rapporteringen kan vara relaterad till en minskning av bortfallet.

Yttre orsak

Fallolycka är den vanligaste yttre orsaken till sjukdom och död och svarar för 52 procent av samtliga yttre orsaker. Den vanligaste formen av fallolycka är fall i samma plan genom halkning, snävning eller snubbling som ensam svarar för ca 30 procent av samtliga yttre orsaker.

Andra vanliga yttre orsaker är transportolyckor, kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället samt exponering för mekaniska krafter. Diagram 3 visar fördelningen över samtliga avsnitt i yttre orsak till sjukdom och död.

Yttre orsaker som ökat

Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik har för båda könen, per 100 000 invånare, ökat under femårsperioden (diagram 6 och 7). Det är fler män än kvinnor som skadas till följd av transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik och ökningen har också varit något större för männen. De åldrar som uppvisar störst uppgång är för båda könen 15–24 år. Övriga åldrar, förutom pojkar 0–4 år, uppvisar också ök-

ningar. Den vanligaste olycksformen är förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, följt av cyklist i transportolycka, ej kollision.

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället visar också en ökning, per 100 000 invånare, mellan 1998 och 2002. Ökningen finns bland båda könen, men mellan 1999 och 2000 sker en minskning bland kvinnorna. Uppgången är störst bland män i åldersgruppen 75–84 år.

Även avsnittet sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död ökar, per 100 000 invånare, under perioden 1998–2002. Uppgången finns främst mellan de två första åren av perioden. Äldre kvinnor står för den största delen av ökningen. Men för kvinnorna finns även en minskning mellan 2000 och 2001.

Avsnittet avsiktligt självdestruktiv handling visar totalt sett en uppgång, per 100 000 invånare, under perioden. Denna ökning är tydligast bland kvinnor i åldersgruppen 15–24 år (diagram 8 och 9). Det finns även en ökning bland övriga åldersgrupper.

Bland andra yttre orsaker till sjukdom och död som ökat under perioden märks exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer där den största ökningen skett bland kvinnor äldre än 84 år. Även missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård ökar under perioden, ökningen har främst skett bland äldre personer under den senare delen av perioden. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk, exponering för levande mekaniska krafter (t ex slagen, sparkad, biten eller riven av annan person), kontakt med giftiga djur och växter samt övergrepp av annan person är andra orsaker som ökat.

Yttre orsaker som minskat

Yttre orsaksavsnittet fallolycka har som helhet minskat, per 100 000 invånare, under perioden (diagram 4). Det är fler kvinnor än män som skadas till följd av fallolyckor och minskningen finns hos kvinnorna. De åldrar som för kvinnorna uppvisar störst nedgång är 65–84 år. Övriga åldrar uppvisar också minskningar. Bland männen däremot finns nedgång endast i åldrarna 15–44 år. Den vanligaste formen av fallolycka är fall i samma plan genom halkning, snävning eller snubbling.

Avsnittet förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen visar totalt sett en nedgång under perioden. Minskningen finns främst mellan de två sista åren av perioden och är tydligast för de yngsta åldersgrupperna, 0–4 år. Männen har en lite större minskning än kvinnorna.

Andra yttre orsaksavsnitt som minskat i omfattning mellan 1998 och 2002 är bland annat exponering för icke levande mekaniska krafter (t ex slagit sig mot eller träffad av andra föremål), överansträngning och umbäranden samt exponering för rök och öppen eld.

Huvuddiagnos

Frakturer svarar för 43 procent av patienternas huvuddiagnos i kapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Den vanligaste formen är frakturer på nedre extremitet, som svarar för ca 26 procent av huvuddiagnoserna.

En annan stor diagnosgrupp är intrakraniella skador som svarar för ca 15 procent av huvuddiagnoserna. De största diagnoserna är höftfraktur och hjärnskakning som tillsammans svarar för ca 30 procent av huvuddiagnoserna. Utvecklingen av antalet intagna som vårdas för höftfraktur eller intrakraniell skada, per 100 000 invånare, visas i diagram 5. Diagram 10 visar andel personer vårdade per utvalda diagnosavsnitt för samtliga år.

Diagnoser som ökat

10,6 procent av huvuddiagnoserna i kapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker består av fraktur på övre extremitet. Detta är en diagnos som har ökat, per 100 000 invånare, under perioden. De åldrar som uppvisar störst uppgång är män 5–24 år och kvinnor 45–64 år. Däremot visar kvinnor i åldersgruppen 65–74 år på en minskning. Dessa ökningar ses i diagram 11 och 12, där fraktur på skuldra och överarm samt underarmsfraktur visar en ökning.

Annan intrakraniell skada utan fraktur står för 2,5 procent av huvuddiagnoserna i kapitlet skador, förgiftningar och vissa andra yttre orsaker. Detta avsnitt har ökat under perioden, förutom hjärnskakningar som har minskat. Ökningen är ungefär lika stor för män som för kvinnor. Tydligast är uppgången i åldrarna 75+.

Också skallfrakturer har ökat mellan 1998 och 2002. Ökningen finns främst bland pojkar yngre än 15 år. Kvinnorna visar däremot en liten minskning.

Diagnoser som minskat

Hjärnskakningar är en diagnos som för båda könen, per 100 000 invånare, har minskat i alla åldrar under femårsperioden. Minskningen är något större för männen, framför allt i åldersgruppen 75–84 år. För kvinnorna sker den största nedgången i åldersgruppen 85+. Det som i diagram 5 ses som en minskning av diagnosen intrakraniell skada, är till största delen minskningen av hjärnskakning.

Frakturer på nedre extremitet visar en minskning mellan 1998 och 2002. Minskningen är störst bland äldre kvinnor. Även för männen är det de äldre som står för den större delen av nedgången. En stor del av denna grupp består av höftfrakturer. Hur dessa har minskat ses både i diagram 5 och 13. I diagram 5 ses att minskningen varit större de tre sista åren av perioden. Diagram 13 visar en stor skillnad mellan åldersgrupperna 65–84 år och 85+. Det framkommer också att kvinnorna i dessa grupper har högre antal personer per 100 000 invånare än männen. Diagram 11 och 12 visar nedgången av frakturer på underben inklusive fotled som också hör till denna grupp.

Även frakturer på halsens och bålens ben har minskat under perioden. Minskningen är störst bland kvinnor äldre än 74 år, men även äldre män står för en nedgång. Män i åldrarna 5–44 år visar en ökning, vilken även finns hos kvinnor mellan 0 och 24 år.

Diagram




Diagram 1. Antal personer utskrivna från sluten sjukvård med yttre orsak till sjukdom och död, per år 1998–2002




Diagram 2. Antal personer utskrivna från sluten sjukvård med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, per år 1998–2002




Diagram 3. Andel personer vårdade per avsnitt i yttre orsak till sjukdom och död, 1998–2002




Diagram 4. Antal personer per 100 000 invånare vårdade till följd av fallolycka, per år 1998–2002




Diagram 5. Antal personer per 100 000 invånare vårdade till följd av intrakraniell skada respektive höftfraktur, per år 1998–2002




Diagram 6. Antal kvinnor per 100 000 invånare vårdade till följd av transportolycka, per år 1998–2002




Diagram 7. Antal män per 100 000 invånare vårdade till följd av transportolycka, per år 1998–2002




Diagram 8. Antal kvinnor per 100 000 invånare vårdade till följd av avsiktligt självdestruktiv handling, per år 1998–2002




Diagram 9. Antal män per 100 000 invånare vårdade till följd av avsiktligt självdestruktiv handling, per år 1998–2002




Diagram 10. Andel personer vårdade per utvalda diagnosavsnitt, 1998–2002




Diagram 11. Antal kvinnor per 100 000 invånare vårdade till följd av några typer av frakturer, per år 1998–2002




Diagram 12. Antal män per 100 000 invånare vårdade till följd av några typer av frakturer, per år 1998–2002




Diagram 13. Antal personer per 100 000 kvinnor respektive 100 000 män i åldersgrupperna 65-74 år, 75-84 år och 85+ år, vårdade till följd av höftfraktur, per år 1998–2002

Tabeller

Tabell 2. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per kön, åldersgrupp och år
Number of patients with an injury or poisoning by sex, age and year

Kön	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
Män	0-4	2664	2743	2471	2489	2426	12793
	5-14	6696	6601	6524	6411	6503	32735
	15-24	7147	7159	7095	7154	7081	35636
	25-44	11949	12005	11546	11253	11081	57834
	45-64	11171	11084	11318	11396	11594	56563
	65-74	5445	5515	5428	5318	5305	27011
	75-84	7074	7004	6957	6926	6945	34906
	85+	3737	3858	3795	3953	3942	19285
	Totalt	55883	55969	55134	54900	54877	276763
Kvinnor	0-4	2090	2058	1869	1703	1757	9477
	5-14	4172	4185	4169	3963	3969	20458
	15-24	4260	4314	4164	4383	4314	21435
	25-44	7176	7155	6938	6972	6843	35084
	45-64	9131	9074	8946	9267	9462	45880
	65-74	7594	7156	6864	6709	6735	35058
	75-84	14920	14725	14365	14148	13948	72106
	85+	12359	12123	12437	12120	12301	61340
	Totalt	61702	60790	59752	59266	59330	300840
Båda könen		117585	116759	114886	114166	114208	577604

*Tabell 3. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder
av yttre orsaker per län, kön och år*
Number of patients with an injury or poisoning by county, sex and year

	Män					Kvinnor					
Hemlän	1998	1999	2000	2001	2002	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
Stockholm	9398	9584	9685	9595	9875	11515	11434	11507	10850	11571	105014
Uppsala	1614	1534	1722	1636	1666	1794	1752	1802	1818	1795	17133
Södermanland	1686	1827	1718	1628	1571	1897	1885	1808	1780	1713	17513
Östergötland	2792	2932	2916	2817	2752	2994	2975	2927	3015	3125	29245
Jönköping	2282	2437	2243	2312	2286	2489	2422	2417	2273	2251	23412
Kronoberg	1130	1150	1078	1099	1108	1133	1131	1114	1150	1152	11245
Kalmar	1715	1679	1657	1601	1612	1823	1724	1762	1679	1651	16903
Gotland	423	413	443	448	428	410	422	433	526	461	4407
Blekinge	690	724	630	655	689	806	856	798	839	825	7512
Skåne	6527	6400	6332	6170	6327	7325	7210	7024	7217	7188	67720
Halland	1943	1844	1871	1961	2008	1942	1928	1891	1957	1978	19323
Västra Götaland	10191	10339	9865	9877	9831	10907	10838	10246	10241	9857	102192
Värmland	1579	1547	1540	1627	1547	1746	1609	1656	1823	1684	16358
Örebro	1673	1722	1675	1613	1620	1893	1906	1786	1833	1916	17637
Västmanland	1184	1243	1232	1220	1356	1426	1455	1467	1479	1524	13586
Dalarna	2148	2064	2078	2035	2059	2157	2149	2194	2082	2096	21062
Gävleborg	1970	1830	1820	1950	1808	2174	2037	2045	1968	2029	19631
Västernorrland	1989	1889	1817	1858	1740	2159	2011	1990	1898	1827	19178
Jämtland	1114	1116	1133	1093	1107	1129	1171	1108	1147	1049	11167
Västerbotten	1948	1886	1907	1862	1731	2002	1980	1994	1959	1901	19170
Norrbottn	1877	1789	1769	1850	1722	1964	1894	1773	1726	1742	18106

Tabell 4. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per kön, åldersgrupp och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by sex, age and year

Kön	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
Män	0-4	1057,8	1140,8	1052,0	1062,6	1021,1	1067,0
	5-14	1126,9	1098,6	1084,2	1073,8	1102,9	1097,2
	15-24	1347,6	1365,6	1352,3	1351,0	1319,4	1347,1
	25-44	963,2	966,1	928,5	906,2	893,2	931,4
	45-64	1007,8	986,8	994,3	987,9	993,7	994,0
	65-74	1551,8	1590,1	1572,9	1537,9	1521,6	1554,8
	75-84	2964,6	2921,3	2880,1	2859,1	2871,7	2899,1
	85+	6160,7	6216,4	6026,1	6151,0	6035,9	6116,9
	Totalt	1277,1	1277,8	1255,1	1245,3	1239,6	1258,9
Kvinnor	0-4	872,6	901,5	838,3	768,7	781,2	833,4
	5-14	741,1	734,1	729,8	698,3	709,0	722,5
	15-24	840,3	861,4	831,8	867,6	841,7	848,5
	25-44	603,7	600,3	581,5	584,6	574,6	588,9
	45-64	835,3	820,2	798,1	817,1	824,6	819,0
	65-74	1866,9	1787,5	1736,7	1707,5	1716,5	1763,8
	75-84	4345,8	4285,1	4175,5	4120,2	4089,4	4203,3
	85+	9008,3	8664,4	8758,8	8448,3	8509,2	8674,5
	Totalt	1377,7	1356,5	1330,8	1316,8	1314,4	1339,2
Båda könen		1328,0	1317,6	1293,4	1281,4	1277,4	1299,5

*Tabell 5. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder
av yttre orsaker per 100 000 invånare per län, kön och år
Number of patients with an injury or poisoning by county, sex and year*

	Män					Kvinnor					
Hemlän	1998	1999	2000	2001	2002	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
Stockholm	1079,8	1087,8	1086,1	1065,6	1088,8	1261,1	1239,7	1235,3	1156,1	1226,4	1154,1
Uppsala	1124,6	1065,6	1188,9	1120,0	1131,5	1213,1	1180,1	1206,5	1207,6	1185,5	1162,9
Södermanland	1328,8	1442,2	1355,7	1278,3	1224,6	1466,1	1458,9	1398,2	1370,7	1310,5	1363,5
Östergötland	1358,7	1429,7	1421,1	1369,0	1333,3	1446,9	1442,5	1419,9	1459,4	1509,4	1419,1
Jönköping	1403,6	1501,5	1378,4	1420,7	1404,4	1504,2	1468,2	1463,9	1376,8	1362,7	1428,5
Kronoberg	1267,3	1296,7	1219,1	1242,7	1248,4	1274,3	1278,5	1262,9	1304,7	1305,8	1270,0
Kalmar	1452,1	1430,7	1418,1	1374,4	1383,0	1519,2	1447,0	1486,4	1420,3	1398,3	1433,3
Gotland	1481,6	1455,8	1566,1	1579,9	1509,8	1409,3	1452,2	1491,8	1810,4	1587,8	1534,6
Blekinge	910,9	960,4	836,4	871,1	917,7	1065,2	1137,8	1063,0	1121,2	1103,0	998,5
Skåne	1188,7	1162,0	1143,4	1106,3	1124,9	1282,0	1258,3	1220,2	1246,8	1233,7	1197,5
Halland	1435,1	1357,1	1370,1	1427,5	1450,6	1416,0	1400,6	1365,8	1405,1	1411,6	1404,0
Västra Götaland	1383,5	1401,7	1330,9	1325,9	1312,8	1453,6	1443,0	1359,9	1354,8	1298,0	1366,3
Värmland	1144,6	1128,7	1130,0	1197,7	1140,1	1244,0	1153,1	1193,8	1320,1	1222,7	1187,7
Örebro	1237,7	1276,0	1241,7	1197,9	1200,3	1357,8	1372,5	1287,5	1323,6	1383,9	1288,7
Västmanland	922,1	972,2	963,7	949,5	1051,9	1103,2	1127,5	1136,8	1142,3	1172,3	1054,6
Dalarna	1525,9	1478,6	1500,2	1475,1	1492,9	1517,7	1524,3	1570,0	1497,3	1511,0	1509,4
Gävleborg	1404,7	1312,4	1311,6	1410,0	1311,1	1531,2	1441,9	1455,6	1407,0	1458,5	1404,8
Västernorrland	1586,1	1521,7	1478,0	1522,3	1429,5	1707,0	1606,7	1605,2	1542,7	1490,2	1549,8
Jämtland	1688,5	1705,6	1745,0	1696,4	1727,4	1716,0	1794,0	1714,2	1787,8	1642,6	1721,8
Västerbotten	1517,2	1474,7	1497,2	1466,1	1359,7	1547,0	1537,1	1554,6	1532,7	1486,1	1497,4
Norrbottn	1423,2	1369,8	1364,8	1435,8	1340,6	1527,3	1485,6	1400,2	1371,1	1391,6	1411,0

Tabell 6. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
S00	Män	573	702	655	673	506	182	274	183	3748
	Kvinnor	503	479	347	393	333	173	478	580	3286
S01	Män	862	686	809	1234	1110	407	491	352	5951
	Kvinnor	507	392	250	436	459	217	660	889	3810
S02	Män	290	581	1944	2585	1650	401	392	159	8002
	Kvinnor	206	363	402	710	667	247	511	328	3434
S03	Män	14	24	47	37	21	10	13	8	174
	Kvinnor	8	19	16	27	16	11	28	13	138
S04	Män	4	7	11	20	18	12	1	2	75
	Kvinnor	3	1	3	17	24	2	2	3	55
S05	Män	63	281	246	539	367	101	81	36	1714
	Kvinnor	37	80	39	54	75	36	76	77	474
S06	Män	3942	9347	9127	9530	8994	3947	4472	2097	51456
	Kvinnor	3312	5987	4812	4780	4720	2559	4982	4227	35379
S07	Män	9	7	9	13	8	1	1	1	49
	Kvinnor	7	9	3	3	2	1	6	9	40
S08	Män	1	6	3	8	4	3	2		27
	Kvinnor	3	3	3	2	3	1	5	3	23
S09	Män	129	196	186	173	146	42	67	40	979
	Kvinnor	93	120	82	99	87	52	108	98	739
S10	Män	18	159	246	348	180	45	59	29	1084
	Kvinnor	17	104	192	230	106	45	63	58	815
S11	Män	12	18	49	87	61	9	10	5	251
	Kvinnor	6	8	13	22	16	3	4	6	78
S12	Män	2	31	269	590	511	295	338	179	2215
	Kvinnor	5	8	98	143	223	175	312	217	1181
S13	Män	12	95	303	570	289	59	72	31	1431
	Kvinnor	9	68	276	612	293	51	53	23	1385
S14	Män	10	12	83	180	129	65	48	12	539
	Kvinnor	11	10	11	52	46	21	21	14	186
S15	Män			7	7	5	1	2		22
	Kvinnor		2	3	5	1				11
S16	Män	1	6	10	11	5	1	2		36
	Kvinnor			8	9	8			1	26
S17	Män	2	11	8	13	9	4	2		49
	Kvinnor	2	3	1	7	1		1		15
S18	Män					1	1			2
	Kvinnor	1	1		1		1	1	1	6
S19	Män	5	10	28	25	10	1	4	3	
	Kvinnor	2	7	12	16	18	2	3	3	63

Tabell 6. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
S20	Män	26	234	494	800	645	299	445	238	3181
	Kvinnor	20	154	252	377	403	237	613	641	2697
S21	Män	1	15	87	136	82	15	13	4	353
	Kvinnor	5	8	4	15	13	7	2	1	55
S22	Män	7	133	490	1589	2529	1397	1682	917	8744
	Kvinnor	3	124	261	640	1209	1012	2446	2203	7898
S23	Män	1	9	24	53	33	13	21	12	166
	Kvinnor	2	4	20	21	29	15	19	25	135
S24	Män	1	6	40	52	37	15	5	1	157
	Kvinnor		3	5	11	27	6	9	2	63
S25	Män		2	12	23	8	11	8	4	68
	Kvinnor		1	1	6	5	3	5	4	25
S26	Män		1	8	16	12	6	7	1	51
	Kvinnor		1	1	4	5	2	2		15
S27	Män	5	45	328	545	656	249	281	96	2205
	Kvinnor	6	31	65	155	224	97	147	114	839
S28	Män		7	1	3	6	1	6	1	25
	Kvinnor	2	1		3	2	1	1	2	12
S29	Män	2	15	28	54	50	11	16	13	189
	Kvinnor	1	6	15	23	27	18	26	27	143
S30	Män	77	668	542	709	529	298	631	409	3863
	Kvinnor	52	461	433	467	330	365	1327	1378	4813
S31	Män	28	118	136	244	137	23	21	11	718
	Kvinnor	38	154	53	102	41	15	19	11	433
S32	Män	7	85	580	1110	1670	1125	1944	1381	7902
	Kvinnor	2	87	417	690	1037	1751	6045	5647	15677
S33	Män	1	14	35	67	70	28	25	26	266
	Kvinnor		5	21	36	27	15	65	58	227
S34	Män		5	16	52	34	7	3	6	123
	Kvinnor		6	17	31	19	5	12	1	91
S35	Män		4	16	24	14	2	6	5	71
	Kvinnor		2	12	70	29	8	7	3	131
S36	Män	42	558	440	357	256	67	60	15	1795
	Kvinnor	25	273	164	191	121	41	46	15	876
S37	Män	3	131	138	127	89	35	35	17	575
	Kvinnor	3	67	41	114	98	29	26	10	388
S38	Män	5	41	24	40	18	10	5	2	145
	Kvinnor	7	19	7	11	3	4	9	8	68
S39	Män	5	32	28	37	25	16	17	8	168
	Kvinnor	2	26	21	25	24	13	25	20	156

Tabell 6. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
S40	Män	4	27	111	155	120	75	116	93	701
	Kvinnor	5	27	51	86	64	74	264	346	917
S41	Män	7	34	59	74	56	7	11	9	257
	Kvinnor	6	15	7	16	8	4	18	25	99
S42	Män	513	1953	799	1182	1765	1004	1239	700	9155
	Kvinnor	427	1504	284	593	1793	2495	5215	3486	15797
S43	Män	2	27	357	740	768	309	273	125	2601
	Kvinnor	3	19	84	241	354	315	620	443	2079
S44	Män		7	15	21	22	5	9	6	85
	Kvinnor		3	5	11	14	4	13	9	59
S45	Män	1	7	9	20	17	7	2	1	64
	Kvinnor	1		4	6	5	4	4	5	29
S46	Män		7	21	175	343	46	17	6	615
	Kvinnor		1	5	15	67	30	22	10	150
S47	Män			2	4	12	2	2	3	25
	Kvinnor			2	4	1	2	2	3	14
S48	Män				4	6		2		12
	Kvinnor			1	3	2		1	1	8
S49	Män			5	8	1		2	3	19
	Kvinnor			2	5	1	1	6	3	18
S50	Män	5	27	67	98	60	18	49	24	348
	Kvinnor	7	22	39	37	35	22	60	74	296
S51	Män	11	80	147	242	137	38	37	22	714
	Kvinnor	1	44	52	66	46	29	55	60	353
S52	Män	668	7181	1520	1892	1970	650	583	258	14722
	Kvinnor	459	3400	464	1295	3754	3547	4893	2512	20324
S53	Män	21	252	108	144	144	27	15	4	715
	Kvinnor	10	217	72	152	221	68	53	24	817
S54	Män		11	48	73	41	9	4	3	189
	Kvinnor	1	8	14	18	24	6	7	6	84
S55	Män		4	16	36	19	5	1	1	82
	Kvinnor		2	4	8	2	5	5	1	27
S56	Män	2	27	82	149	105	16	6		387
	Kvinnor		4	14	33	21	5	3	4	84
S57	Män		2	9	27	20	2		1	61
	Kvinnor	1	1	6	8	5		3	1	25
S58	Män		1		5	7	6	1		20
	Kvinnor		1		2				1	4
S59	Män	1	2	1	3	1		2		10
	Kvinnor			1	4	1			2	8

Tabell 6. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
S60	Män	25	43	65	116	60	35	31	18	393
	Kvinnor	10	28	36	34	41	19	43	39	250
S61	Män	285	433	507	1068	944	297	154	40	3728
	Kvinnor	219	183	145	268	239	80	57	28	1219
S62	Män	93	618	1048	1580	1185	336	193	55	5108
	Kvinnor	63	319	181	379	410	205	254	170	1981
S63	Män	6	99	195	418	338	78	39	20	1193
	Kvinnor	6	47	80	201	204	50	64	15	667
S64	Män	20	106	257	489	224	36	24	2	1158
	Kvinnor	13	41	111	202	107	19	10	2	505
S65	Män	2	12	31	55	36	14	8		158
	Kvinnor	3	2	4	13	8	2	5	1	38
S66	Män	31	323	929	1528	1008	191	88	12	4110
	Kvinnor	40	88	193	433	289	58	41	11	1153
S67	Män	52	47	31	98	89	13	10	2	342
	Kvinnor	47	29	5	18	13	3	3	1	119
S68	Män	38	103	132	358	508	176	77	9	1401
	Kvinnor	34	40	22	61	85	17	16	4	279
S69	Män	4	6	7	23	17	8	4	1	70
	Kvinnor	1	3	6	4	3		2		19
S70	Män	10	80	163	224	442	589	1471	1276	4255
	Kvinnor	6	70	109	165	303	754	3239	4088	8734
S71	Män	9	84	87	126	99	19	26	17	467
	Kvinnor	8	37	15	31	21	15	33	37	197
S72	Män	440	785	720	1046	3531	5195	12384	9240	33341
	Kvinnor	214	354	229	442	3881	9666	31215	32607	78609
S73	Män	8	29	61	106	123	147	191	92	757
	Kvinnor	4	20	17	40	137	170	401	276	1065
S74	Män			7	5	10	2	5		29
	Kvinnor		1	3	3	2	3	4	4	20
S75	Män			15	18	21	10	5	2	71
	Kvinnor				3	5	3	4	2	17
S76	Män		22	56	128	352	110	86	25	779
	Kvinnor		8	13	36	67	35	46	36	241
S77	Män	3	9	11	11	17	4	9	6	70
	Kvinnor		4	2	4	4	1	17	22	54
S78	Män			1	7	6	4	2	2	22
	Kvinnor		2		1	1		4	4	12
S79	Män	1	2	3	11	6	15	18	7	63
	Kvinnor		7	5	1	8	12	32	46	111

Tabell 6. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
S80	Män	12	96	205	248	201	120	203	154	1239
	Kvinnor	6	64	103	132	186	242	657	687	2077
S81	Män	13	208	191	269	180	56	60	19	996
	Kvinnor	6	91	48	66	87	112	248	191	849
S82	Män	283	2382	3509	6924	7163	1982	1484	523	24250
	Kvinnor	142	1515	1311	4341	9308	4682	4535	2499	28333
S83	Män	1	306	1510	2325	542	111	85	42	4922
	Kvinnor	1	262	1155	1115	440	152	211	121	3457
S84	Män		6	17	13	14	4	2		56
	Kvinnor		3	5	7	5	8	4	3	35
S85	Män			13	21	12	2	1	2	51
	Kvinnor			3	7	5	7	6	8	36
S86	Män	1	21	102	1692	960	175	116	19	3086
	Kvinnor	2	10	32	335	242	94	68	18	801
S87	Män	2	6	21	42	32	5	5	3	116
	Kvinnor	1	3	2	10	8	3	8	7	42
S88	Män		3	5	22	17	12	9	3	71
	Kvinnor		1		1	11	5	12	8	38
S89	Män		2	3	9	7	2	1	3	27
	Kvinnor	1	3		5	3		4	7	23
S90	Män	13	25	46	73	45	13	22	17	254
	Kvinnor	11	21	17	34	23	14	39	68	227
S91	Män	90	179	114	154	192	64	42	19	854
	Kvinnor	64	109	30	41	44	35	51	37	411
S92	Män	15	142	364	740	817	162	86	36	2362
	Kvinnor	21	92	145	248	314	165	261	158	1404
S93	Män	7	36	214	387	249	60	42	26	1021
	Kvinnor	3	39	99	188	163	87	156	182	917
S94	Män		1	5	6	6		1	1	20
	Kvinnor		1	2	4	3	1	2	1	14
S95	Män			1	1	2	2		1	7
	Kvinnor			1	1		1	1	1	5
S96	Män	3	25	39	69	48	10	4		198
	Kvinnor	1	12	8	26	33	2	4	2	88
S97	Män	8	6	19	33	38	5	5		114
	Kvinnor	4	4	5	3	4	1	2		23
S98	Män	8	9	5	20	25	10	2	1	80
	Kvinnor	7	7	2	6	4	2	2	2	32
S99	Män		4	6	8	5		2	1	26
	Kvinnor		1		4	2	2	3	3	15

Tabell 6. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
T00	Män	9	53	54	79	32	19	41	15	302
	Kvinnor	10	33	41	50	29	16	56	53	288
T01	Män	14	40	103	147	115	48	55	37	559
	Kvinnor	12	30	25	50	54	35	79	108	393
T02	Män		2	19	38	30	9	22	9	129
	Kvinnor		2	3	15	18	12	34	47	131
T03	Män		1	3		1	1	4		10
	Kvinnor	1		1	2	2		5	2	13
T04	Män	2	13	19	29	19	5	11		98
	Kvinnor	3	12	9	21	13	3	11	14	86
T05	Män			1		1				2
	Kvinnor					4		1		5
T06	Män		4	4	13	6	2	6	2	37
	Kvinnor			5	8	2	3	4	6	28
T07	Män	1	1	12	37	10	6	6	3	76
	Kvinnor		3	13	11	12	4	9	3	55
T08	Män		1	6	13	15	4	15	3	57
	Kvinnor		1	3	2	6	4	26	32	74
T09	Män	4	19	21	33	22	12	9	5	125
	Kvinnor		12	13	13	9	7	9	8	71
T10	Män	2		4	5	3	1	1	1	17
	Kvinnor	1	3		1	3	1	4	3	16
T11	Män	12	10	31	51	53	24	38	23	242
	Kvinnor	4	19	18	19	24	19	62	55	220
T12	Män		1	1	5	4	2	4	2	19
	Kvinnor		1			1	1	4	10	17
T13	Män	5	30	39	49	48	31	39	22	263
	Kvinnor	11	12	20	25	25	39	85	71	288
T14	Män	74	135	146	229	239	144	157	78	1202
	Kvinnor	59	92	71	158	170	118	240	190	1098
T15	Män	46	50	7	23	16	2			144
	Kvinnor	36	25	1	3	1				66
T16	Män	50	50	6	3	2	1	1	1	114
	Kvinnor	43	41	1	4	3			1	93
T17	Män	434	138	29	73	110	69	63	50	966
	Kvinnor	314	76	24	74	100	64	100	100	852
T18	Män	265	283	198	590	894	405	467	196	3298
	Kvinnor	225	197	129	302	520	301	448	314	2436
T19	Män	1	1		8	13	8	19	13	63
	Kvinnor	3	15	5	26	14	5	10	8	86

Tabell 6. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
T20	Män	168	104	136	265	139	36	25	10	883
	Kvinnor	107	45	22	46	70	19	13	5	327
T21	Män	231	58	46	117	111	32	28	11	634
	Kvinnor	166	37	24	28	40	21	38	20	374
T22	Män	128	31	39	102	80	23	14	5	422
	Kvinnor	86	15	11	28	26	19	26	10	221
T23	Män	166	72	93	223	165	24	10	6	759
	Kvinnor	91	33	21	48	44	14	22	10	283
T24	Män	63	60	48	113	96	34	27	10	451
	Kvinnor	61	48	23	49	45	11	26	10	273
T25	Män	33	26	16	48	46	10	10	2	191
	Kvinnor	19	12	10	18	9	12	8	3	91
T26	Män	5	11	41	130	85	6	2		280
	Kvinnor	1	5	10	16	14	3	3	1	53
T27	Män	3	6	14	27	25	3	5	4	87
	Kvinnor	1	2	20	9	10	2	4	5	53
T28	Män	53	21	13	40	36	7	12	10	192
	Kvinnor	51	19	26	27	11	8	7	4	153
T29	Män	57	24	41	81	60	22	9	4	298
	Kvinnor	47	17	15	19	27	16	13	10	164
T30	Män	45	23	26	75	44	9	13	3	238
	Kvinnor	27	7	10	14	23	9	7	3	100
T31	Män	15	4	14	29	39	11	7	4	123
	Kvinnor	18	10	10	8	12	8	10	9	85
T32	Män	3			1	1				5
	Kvinnor	2			1	5			1	9
T33	Män		2	7	13	16	5	3	3	49
	Kvinnor		1		1	1	2	6	1	12
T34	Män			6	11	26	7	10	1	61
	Kvinnor		1	2	4	7	2	4	3	23
T35	Män		4	5	12	17	17	8	3	66
	Kvinnor			4		7	1	7	2	21
T36	Män	5	2	2	5	4	7	4	2	31
	Kvinnor	5	6	44	15	14	6	5	10	105
T37	Män	7	2	3	6	5	4	1	1	29
	Kvinnor	5	6	9	12	3	3	6	3	47
T38	Män	16	9	21	44	48	12	13	5	168
	Kvinnor	15	8	49	61	49	16	16	12	226
T39	Män	69	37	246	486	212	48	43	15	1156
	Kvinnor	64	372	1877	1108	368	70	69	35	3963

Tabell 6. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
T40	Män	22	11	241	363	122	23	28	14	824
	Kvinnor	15	21	222	218	101	32	47	28	684
T41	Män	3	3	11	25	10	2	1		55
	Kvinnor	1	4	17	13	5			2	42
T42	Män	68	32	377	1027	716	201	176	78	2675
	Kvinnor	50	119	901	1922	1310	297	346	164	5109
T43	Män	38	29	329	648	362	66	45	11	1528
	Kvinnor	37	81	791	1315	730	125	120	34	3233
T44	Män	44	9	25	44	42	12	18	8	202
	Kvinnor	31	17	72	78	55	18	24	12	307
T45	Män	81	9	12	20	51	36	23	12	244
	Kvinnor	51	20	82	58	36	32	62	28	369
T46	Män	18	5	7	25	72	98	299	199	723
	Kvinnor	22	5	38	40	55	121	555	603	1439
T47	Män	15	1	4	7	10	3	3	1	44
	Kvinnor	8	6	26	13	7	5	3	4	72
T48	Män	102	9	15	38	17	4	3	6	194
	Kvinnor	52	25	46	30	35	7	15	5	215
T49	Män	25	3	2	10	2		5	2	49
	Kvinnor	9	2	9	10	2	1	3	2	38
T50	Män	78	31	324	818	550	134	206	83	2224
	Kvinnor	66	108	1096	1575	976	248	357	212	4638
T51	Män	10	179	521	474	444	73	21	2	1724
	Kvinnor	9	181	520	384	253	29	4	8	1388
T52	Män	464	42	42	54	41	7	2	2	654
	Kvinnor	228	20	32	15	10	1	1	2	309
T53	Män	16		2	7	4				29
	Kvinnor	10	2	1	3	2	1			19
T54	Män	26	6	8	12	11	3		5	71
	Kvinnor	12	3	5	18	4	1	1		44
T55	Män	29	4	3	9	6	1	6	10	68
	Kvinnor	20	4	6	8	7	5	9	14	73
T56	Män	3	3	3	5	4	2	1		21
	Kvinnor	5		1		4		1	1	12
T57	Män	7	1	5	8	3	1		1	26
	Kvinnor	7	3	1		3	1	2		17
T58	Män	5	30	37	130	92	30	25	6	355
	Kvinnor	8	9	25	41	37	12	17	12	161
T59	Män	20	106	155	327	222	45	37	18	930
	Kvinnor	20	52	95	122	109	24	40	32	494

Tabell 6. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
T60	Män	14	3		5	4	1			27
	Kvinnor	5	1	1	5	1				13
T61	Män		1	1	2	5	1			10
	Kvinnor		1			2	2	4		9
T62	Män	31	12	35	14	17	4	6	3	122
	Kvinnor	40	15	9	19	14	4	6	1	108
T63	Män	111	194	51	101	105	31	20	6	619
	Kvinnor	69	113	23	60	96	43	21	4	429
T64	Män		1		1	1	1			4
	Kvinnor		1	2	3	3			2	11
T65	Män	102	42	208	350	170	43	34	21	970
	Kvinnor	66	60	391	420	212	50	59	31	1289
T66	Män					2	4	2		8
	Kvinnor			1			3	3		7
T67	Män	2	1	8	15	21	18	30	7	102
	Kvinnor	1	2	6	5	12	14	14	10	64
T68	Män	5	9	33	76	96	65	63	43	390
	Kvinnor		3	16	19	37	17	50	43	185
T69	Män	1	2		3	2	1		2	11
	Kvinnor			1	2	1		2		6
T70	Män		1	33	49	8				91
	Kvinnor		1	5	7	4		1		18
T71	Män	1	7	7	13	10	2	1	1	42
	Kvinnor	4	4	8	9	4			6	35
T73	Män	2	4	20	27	19	7	13	6	98
	Kvinnor	2	5	6	16	19	6	10	5	69
T74	Män	28	42	144	157	81	13	4	3	472
	Kvinnor	32	55	165	307	132	10	7	2	710
T75	Män	126	86	134	340	182	27	18	2	915
	Kvinnor	61	43	52	116	69	13	16	4	374
T78	Män	293	380	318	727	766	335	219	52	3090
	Kvinnor	167	246	475	961	997	397	337	143	3723
T79	Män	35	62	170	364	399	195	151	48	1424
	Kvinnor	26	52	47	172	178	145	170	111	901

Tabell 6. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
T80	Män	2	4	6	18	37	23	20	3	113
	Kvinnor	3	6	3	30	47	26	14	4	133
T81	Män	201	442	634	1621	2999	2150	1823	394	10264
	Kvinnor	110	337	602	2487	3249	1686	1806	630	10907
T82	Män	12	8	19	64	337	341	318	57	1156
	Kvinnor	10	7	12	53	207	222	285	79	875
T83	Män		4	6	21	74	117	172	88	482
	Kvinnor		2	20	178	78	42	55	22	397
T84	Män	6	43	158	510	1815	2152	2538	638	7860
	Kvinnor	4	30	82	424	1910	2607	4003	1803	10863
T85	Män	49	82	53	159	255	150	114	27	889
	Kvinnor	50	83	70	195	279	147	160	61	1045
T86	Män	5	17	49	217	358	48	4	4	702
	Kvinnor	5	16	27	116	202	27	20	5	418
T87	Män	1		2	28	61	67	100	44	303
	Kvinnor		3		8	37	49	93	69	259
T88	Män	52	53	73	226	413	306	323	117	1563
	Kvinnor	40	40	156	442	529	356	571	299	2433
T90	Män		12	57	134	93	14	8	3	321
	Kvinnor	8	9	42	63	52	12	8	5	199
T91	Män		1	37	196	153	30	6	5	428
	Kvinnor		4	34	126	83	18	18	10	293
T92	Män	8	108	368	1005	776	104	42	7	2418
	Kvinnor	7	78	178	506	570	176	128	41	1684
T93	Män	6	45	246	566	392	216	312	150	1933
	Kvinnor	2	21	141	295	481	422	911	579	2852
T94	Män				4	7	2		3	16
	Kvinnor			3	2	4	2	6	2	19
T95	Män	7	21	23	49	37	5	2		144
	Kvinnor	4	12	24	45	30	4	1		120
T96	Män	1		1	1		1	2	1	7
	Kvinnor			1	1		2		1	5
T97	Män			2		1	1			4
	Kvinnor							1		1
T98	Män		8	7	25	46	21	23	6	136
	Kvinnor	2		6	56	65	32	19	9	189

Tabell 7. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
S00	Män	47,8	23,5	24,8	10,8	8,9	10,5	22,8	58,0	17,0
	Kvinnor	44,2	16,9	13,7	6,6	5,9	8,7	27,9	82,0	14,6
S01	Män	71,9	23,0	30,6	19,9	19,5	23,4	40,8	111,6	27,1
	Kvinnor	44,6	13,8	9,9	7,3	8,2	10,9	38,5	125,7	17,0
S02	Män	24,2	19,5	73,5	41,6	29,0	23,1	32,6	50,4	36,4
	Kvinnor	18,1	12,8	15,9	11,9	11,9	12,4	29,8	46,4	15,3
S03	Män	1,2	0,8	1,8	0,6	0,4	0,6	1,1	2,5	0,8
	Kvinnor	0,7	0,7	0,6	0,5	0,3	0,6	1,6	1,8	0,6
S04	Män	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,7	0,1	0,6	0,3
	Kvinnor	0,3	0,0	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,4	0,2
S05	Män	5,3	9,4	9,3	8,7	6,4	5,8	6,7	11,4	7,8
	Kvinnor	3,3	2,8	1,5	0,9	1,3	1,8	4,4	10,9	2,1
S06	Män	328,8	313,3	345,0	153,5	158,1	227,2	371,4	665,1	234,1
	Kvinnor	291,2	211,4	190,5	80,2	84,3	128,7	290,4	597,8	157,5
S07	Män	0,8	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2
	Kvinnor	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	1,3	0,2
S08	Män	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1
	Kvinnor	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1
S09	Män	10,8	6,6	7,0	2,8	2,6	2,4	5,6	12,7	4,5
	Kvinnor	8,2	4,2	3,2	1,7	1,6	2,6	6,3	13,9	3,3
S10	Män	1,5	5,3	9,3	5,6	3,2	2,6	4,9	9,2	4,9
	Kvinnor	1,5	3,7	7,6	3,9	1,9	2,3	3,7	8,2	3,6
S11	Män	1,0	0,6	1,9	1,4	1,1	0,5	0,8	1,6	1,1
	Kvinnor	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,8	0,3
S12	Män	0,2	1,0	10,2	9,5	9,0	17,0	28,1	56,8	10,1
	Kvinnor	0,4	0,3	3,9	2,4	4,0	8,8	18,2	30,7	5,3
S13	Män	1,0	3,2	11,5	9,2	5,1	3,4	6,0	9,8	6,5
	Kvinnor	0,8	2,4	10,9	10,3	5,2	2,6	3,1	3,3	6,2
S14	Män	0,8	0,4	3,1	2,9	2,3	3,7	4,0	3,8	2,5
	Kvinnor	1,0	0,4	0,4	0,9	0,8	1,1	1,2	2,0	0,8
S15	Män	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S16	Män	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
S17	Män	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
	Kvinnor	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
S18	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
S19	Män	0,4	0,3	1,1	0,4	0,2	0,1	0,3	1,0	0,4
	Kvinnor	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3

Tabell 7. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
S20	Män	2,2	7,8	18,7	12,9	11,3	17,2	37,0	75,5	14,5
	Kvinnor	1,8	5,4	10,0	6,3	7,2	11,9	35,7	90,6	12,0
S21	Män	0,1	0,5	3,3	2,2	1,4	0,9	1,1	1,3	1,6
	Kvinnor	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
S22	Män	0,6	4,5	18,5	25,6	44,4	80,4	139,7	290,9	39,8
	Kvinnor	0,3	4,4	10,3	10,7	21,6	50,9	142,6	311,5	35,2
S23	Män	0,1	0,3	0,9	0,9	0,6	0,7	1,7	3,8	0,8
	Kvinnor	0,2	0,1	0,8	0,4	0,5	0,8	1,1	3,5	0,6
S24	Män	0,1	0,2	1,5	0,8	0,7	0,9	0,4	0,3	0,7
	Kvinnor	0,0	0,1	0,2	0,2	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
S25	Män	0,0	0,1	0,5	0,4	0,1	0,6	0,7	1,3	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,1
S26	Män	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,3	0,6	0,3	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
S27	Män	0,4	1,5	12,4	8,8	11,5	14,3	23,3	30,4	10,0
	Kvinnor	0,5	1,1	2,6	2,6	4,0	4,9	8,6	16,1	3,7
S28	Män	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	0,3	0,1
	Kvinnor	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1
S29	Män	0,2	0,5	1,1	0,9	0,9	0,6	1,3	4,1	0,9
	Kvinnor	0,1	0,2	0,6	0,4	0,5	0,9	1,5	3,8	0,6
S30	Män	6,4	22,4	20,5	11,4	9,3	17,2	52,4	129,7	17,6
	Kvinnor	4,6	16,3	17,1	7,8	5,9	18,4	77,4	194,9	21,4
S31	Män	2,3	4,0	5,1	3,9	2,4	1,3	1,7	3,5	3,3
	Kvinnor	3,3	5,4	2,1	1,7	0,7	0,8	1,1	1,6	1,9
S32	Män	0,6	2,8	21,9	17,9	29,3	64,8	161,5	438,0	35,9
	Kvinnor	0,2	3,1	16,5	11,6	18,5	88,1	352,4	798,6	69,8
S33	Män	0,1	0,5	1,3	1,1	1,2	1,6	2,1	8,2	1,2
	Kvinnor	0,0	0,2	0,8	0,6	0,5	0,8	3,8	8,2	1,0
S34	Män	0,0	0,2	0,6	0,8	0,6	0,4	0,2	1,9	0,6
	Kvinnor	0,0	0,2	0,7	0,5	0,3	0,3	0,7	0,1	0,4
S35	Män	0,0	0,1	0,6	0,4	0,2	0,1	0,5	1,6	0,3
	Kvinnor	0,0	0,1	0,5	1,2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6
S36	Män	3,5	18,7	16,6	5,7	4,5	3,9	5,0	4,8	8,2
	Kvinnor	2,2	9,6	6,5	3,2	2,2	2,1	2,7	2,1	3,9
S37	Män	0,3	4,4	5,2	2,0	1,6	2,0	2,9	5,4	2,6
	Kvinnor	0,3	2,4	1,6	1,9	1,7	1,5	1,5	1,4	1,7
S38	Män	0,4	1,4	0,9	0,6	0,3	0,6	0,4	0,6	0,7
	Kvinnor	0,6	0,7	0,3	0,2	0,1	0,2	0,5	1,1	0,3
S39	Män	0,4	1,1	1,1	0,6	0,4	0,9	1,4	2,5	0,8
	Kvinnor	0,2	0,9	0,8	0,4	0,4	0,7	1,5	2,8	0,7

Tabell 7. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
S40	Män	0,3	0,9	4,2	2,5	2,1	4,3	9,6	29,5	3,2
	Kvinnor	0,4	1,0	2,0	1,4	1,1	3,7	15,4	48,9	4,1
S41	Män	0,6	1,1	2,2	1,2	1,0	0,4	0,9	2,9	1,2
	Kvinnor	0,5	0,5	0,3	0,3	0,1	0,2	1,0	3,5	0,4
S42	Män	42,8	65,5	30,2	19,0	31,0	57,8	102,9	222,0	41,6
	Kvinnor	37,5	53,1	11,2	10,0	32,0	125,5	304,0	493,0	70,3
S43	Män	0,2	0,9	13,5	11,9	13,5	17,8	22,7	39,6	11,8
	Kvinnor	0,3	0,7	3,3	4,0	6,3	15,8	36,1	62,6	9,3
S44	Män	0,0	0,2	0,6	0,3	0,4	0,3	0,7	1,9	0,4
	Kvinnor	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	1,3	0,3
S45	Män	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3
	Kvinnor	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,7	0,1
S46	Män	0,0	0,2	0,8	2,8	6,0	2,6	1,4	1,9	2,8
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,3	1,2	1,5	1,3	1,4	0,7
S47	Män	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	1,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,4	0,1
S48	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
S49	Män	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	1,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,4	0,1
S50	Män	0,4	0,9	2,5	1,6	1,1	1,0	4,1	7,6	1,6
	Kvinnor	0,6	0,8	1,5	0,6	0,6	1,1	3,5	10,5	1,3
S51	Män	0,9	2,7	5,6	3,9	2,4	2,2	3,1	7,0	3,2
	Kvinnor	0,1	1,6	2,1	1,1	0,8	1,5	3,2	8,5	1,6
S52	Män	55,7	240,7	57,5	30,5	34,6	37,4	48,4	81,8	67,0
	Kvinnor	40,4	120,1	18,4	21,7	67,0	178,5	285,2	355,2	90,5
S53	Män	1,8	8,4	4,1	2,3	2,5	1,6	1,2	1,3	3,3
	Kvinnor	0,9	7,7	2,9	2,6	3,9	3,4	3,1	3,4	3,6
S54	Män	0,0	0,4	1,8	1,2	0,7	0,5	0,3	1,0	0,9
	Kvinnor	0,1	0,3	0,6	0,3	0,4	0,3	0,4	0,8	0,4
S55	Män	0,0	0,1	0,6	0,6	0,3	0,3	0,1	0,3	0,4
	Kvinnor	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1
S56	Män	0,2	0,9	3,1	2,4	1,8	0,9	0,5	0,0	1,8
	Kvinnor	0,0	0,1	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,6	0,4
S57	Män	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,1	0,0	0,3	0,3
	Kvinnor	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1
S58	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
S59	Män	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0

Tabell 7. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
S60	Män	2,1	1,4	2,5	1,9	1,1	2,0	2,6	5,7	1,8
	Kvinnor	0,9	1,0	1,4	0,6	0,7	1,0	2,5	5,5	1,1
S61	Män	23,8	14,5	19,2	17,2	16,6	17,1	12,8	12,7	17,0
	Kvinnor	19,3	6,5	5,7	4,5	4,3	4,0	3,3	4,0	5,4
S62	Män	7,8	20,7	39,6	25,4	20,8	19,3	16,0	17,4	23,2
	Kvinnor	5,5	11,3	7,2	6,4	7,3	10,3	14,8	24,0	8,8
S63	Män	0,5	3,3	7,4	6,7	5,9	4,5	3,2	6,3	5,4
	Kvinnor	0,5	1,7	3,2	3,4	3,6	2,5	3,7	2,1	3,0
S64	Män	1,7	3,6	9,7	7,9	3,9	2,1	2,0	0,6	5,3
	Kvinnor	1,1	1,4	4,4	3,4	1,9	1,0	0,6	0,3	2,2
S65	Män	0,2	0,4	1,2	0,9	0,6	0,8	0,7	0,0	0,7
	Kvinnor	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2
S66	Män	2,6	10,8	35,1	24,6	17,7	11,0	7,3	3,8	18,7
	Kvinnor	3,5	3,1	7,6	7,3	5,2	2,9	2,4	1,6	5,1
S67	Män	4,3	1,6	1,2	1,6	1,6	0,7	0,8	0,6	1,6
	Kvinnor	4,1	1,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,5
S68	Män	3,2	3,5	5,0	5,8	8,9	10,1	6,4	2,9	6,4
	Kvinnor	3,0	1,4	0,9	1,0	1,5	0,9	0,9	0,6	1,2
S69	Män	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
	Kvinnor	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
S70	Män	0,8	2,7	6,2	3,6	7,8	33,9	122,2	404,7	19,4
	Kvinnor	0,5	2,5	4,3	2,8	5,4	37,9	188,8	578,1	38,9
S71	Män	0,8	2,8	3,3	2,0	1,7	1,1	2,2	5,4	2,1
	Kvinnor	0,7	1,3	0,6	0,5	0,4	0,8	1,9	5,2	0,9
S72	Män	36,7	26,3	27,2	16,8	62,1	299,0	1028,6	2930,8	151,7
	Kvinnor	18,8	12,5	9,1	7,4	69,3	486,3	1819,6	4611,2	349,9
S73	Män	0,7	1,0	2,3	1,7	2,2	8,5	15,9	29,2	3,4
	Kvinnor	0,4	0,7	0,7	0,7	2,4	8,6	23,4	39,0	4,7
S74	Män	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,6	0,1
S75	Män	0,0	0,0	0,6	0,3	0,4	0,6	0,4	0,6	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1
S76	Män	0,0	0,7	2,1	2,1	6,2	6,3	7,1	7,9	3,5
	Kvinnor	0,0	0,3	0,5	0,6	1,2	1,8	2,7	5,1	1,1
S77	Män	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,7	1,9	0,3
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	3,1	0,2
S78	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6	0,1
	Kvinnor	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,1
S79	Män	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,9	1,5	2,2	0,3
	Kvinnor	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,6	1,9	6,5	0,5

Tabell 7. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
S80	Män	1,0	3,2	7,7	4,0	3,5	6,9	16,9	48,8	5,6
	Kvinnor	0,5	2,3	4,1	2,2	3,3	12,2	38,3	97,2	9,2
S81	Män	1,1	7,0	7,2	4,3	3,2	3,2	5,0	6,0	4,5
	Kvinnor	0,5	3,2	1,9	1,1	1,6	5,6	14,5	27,0	3,8
S82	Män	23,6	79,8	132,6	111,5	125,9	114,1	123,3	165,9	110,3
	Kvinnor	12,5	53,5	51,9	72,9	166,2	235,6	264,4	353,4	126,1
S83	Män	0,1	10,3	57,1	37,4	9,5	6,4	7,1	13,3	22,4
	Kvinnor	0,1	9,3	45,7	18,7	7,9	7,6	12,3	17,1	15,4
S84	Män	0,0	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3
	Kvinnor	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,2	0,4	0,2
S85	Män	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,6	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	1,1	0,2
S86	Män	0,1	0,7	3,9	27,3	16,9	10,1	9,6	6,0	14,0
	Kvinnor	0,2	0,4	1,3	5,6	4,3	4,7	4,0	2,5	3,6
S87	Män	0,2	0,2	0,8	0,7	0,6	0,3	0,4	1,0	0,5
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,5	1,0	0,2
S88	Män	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,7	0,7	1,0	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,7	1,1	0,2
S89	Män	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	0,1
	Kvinnor	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	1,0	0,1
S90	Män	1,1	0,8	1,7	1,2	0,8	0,7	1,8	5,4	1,2
	Kvinnor	1,0	0,7	0,7	0,6	0,4	0,7	2,3	9,6	1,0
S91	Män	7,5	6,0	4,3	2,5	3,4	3,7	3,5	6,0	3,9
	Kvinnor	5,6	3,8	1,2	0,7	0,8	1,8	3,0	5,2	1,8
S92	Män	1,3	4,8	13,8	11,9	14,4	9,3	7,1	11,4	10,7
	Kvinnor	1,8	3,2	5,7	4,2	5,6	8,3	15,2	22,3	6,2
S93	Män	0,6	1,2	8,1	6,2	4,4	3,5	3,5	8,2	4,6
	Kvinnor	0,3	1,4	3,9	3,2	2,9	4,4	9,1	25,7	4,1
S94	Män	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
S95	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
S96	Män	0,3	0,8	1,5	1,1	0,8	0,6	0,3	0,0	0,9
	Kvinnor	0,1	0,4	0,3	0,4	0,6	0,1	0,2	0,3	0,4
S97	Män	0,7	0,2	0,7	0,5	0,7	0,3	0,4	0,0	0,5
	Kvinnor	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
S98	Män	0,7	0,3	0,2	0,3	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4
	Kvinnor	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
S99	Män	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,4	0,1

Tabell 7. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
T00	Män	0,8	1,8	2,0	1,3	0,6	1,1	3,4	4,8	1,4
	Kvinnor	0,9	1,2	1,6	0,8	0,5	0,8	3,3	7,5	1,3
T01	Män	1,2	1,3	3,9	2,4	2,0	2,8	4,6	11,7	2,5
	Kvinnor	1,1	1,1	1,0	0,8	1,0	1,8	4,6	15,3	1,7
T02	Män	0,0	0,1	0,7	0,6	0,5	0,5	1,8	2,9	0,6
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	2,0	6,6	0,6
T03	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0
	Kvinnor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
T04	Män	0,2	0,4	0,7	0,5	0,3	0,3	0,9	0,0	0,4
	Kvinnor	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,6	2,0	0,4
T05	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
T06	Män	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,5	0,6	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,8	0,1
T07	Män	0,1	0,0	0,5	0,6	0,2	0,3	0,5	1,0	0,3
	Kvinnor	0,0	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5	0,4	0,2
T08	Män	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	1,2	1,0	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	1,5	4,5	0,3
T09	Män	0,3	0,6	0,8	0,5	0,4	0,7	0,7	1,6	0,6
	Kvinnor	0,0	0,4	0,5	0,2	0,2	0,4	0,5	1,1	0,3
T10	Män	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
	Kvinnor	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1
T11	Män	1,0	0,3	1,2	0,8	0,9	1,4	3,2	7,3	1,1
	Kvinnor	0,4	0,7	0,7	0,3	0,4	1,0	3,6	7,8	1,0
T12	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,6	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,4	0,1
T13	Män	0,4	1,0	1,5	0,8	0,8	1,8	3,2	7,0	1,2
	Kvinnor	1,0	0,4	0,8	0,4	0,4	2,0	5,0	10,0	1,3
T14	Män	6,2	4,5	5,5	3,7	4,2	8,3	13,0	24,7	5,5
	Kvinnor	5,2	3,2	2,8	2,7	3,0	5,9	14,0	26,9	4,9
T15	Män	3,8	1,7	0,3	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,7
	Kvinnor	3,2	0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
T16	Män	4,2	1,7	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5
	Kvinnor	3,8	1,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4
T17	Män	36,2	4,6	1,1	1,2	1,9	4,0	5,2	15,9	4,4
	Kvinnor	27,6	2,7	1,0	1,2	1,8	3,2	5,8	14,1	3,8
T18	Män	22,1	9,5	7,5	9,5	15,7	23,3	38,8	62,2	15,0
	Kvinnor	19,8	7,0	5,1	5,1	9,3	15,1	26,1	44,4	10,8
T19	Män	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,6	4,1	0,3
	Kvinnor	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,3	0,6	1,1	0,4

Tabell 7. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
T20	Män	14,0	3,5	5,1	4,3	2,4	2,1	2,1	3,2	4,0
	Kvinnor	9,4	1,6	0,9	0,8	1,2	1,0	0,8	0,7	1,5
T21	Män	19,3	1,9	1,7	1,9	2,0	1,8	2,3	3,5	2,9
	Kvinnor	14,6	1,3	1,0	0,5	0,7	1,1	2,2	2,8	1,7
T22	Män	10,7	1,0	1,5	1,6	1,4	1,3	1,2	1,6	1,9
	Kvinnor	7,6	0,5	0,4	0,5	0,5	1,0	1,5	1,4	1,0
T23	Män	13,8	2,4	3,5	3,6	2,9	1,4	0,8	1,9	3,5
	Kvinnor	8,0	1,2	0,8	0,8	0,8	0,7	1,3	1,4	1,3
T24	Män	5,3	2,0	1,8	1,8	1,7	2,0	2,2	3,2	2,1
	Kvinnor	5,4	1,7	0,9	0,8	0,8	0,6	1,5	1,4	1,2
T25	Män	2,8	0,9	0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	0,6	0,9
	Kvinnor	1,7	0,4	0,4	0,3	0,2	0,6	0,5	0,4	0,4
T26	Män	0,4	0,4	1,5	2,1	1,5	0,3	0,2	0,0	1,3
	Kvinnor	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
T27	Män	0,3	0,2	0,5	0,4	0,4	0,2	0,4	1,3	0,4
	Kvinnor	0,1	0,1	0,8	0,2	0,2	0,1	0,2	0,7	0,2
T28	Män	4,4	0,7	0,5	0,6	0,6	0,4	1,0	3,2	0,9
	Kvinnor	4,5	0,7	1,0	0,5	0,2	0,4	0,4	0,6	0,7
T29	Män	4,8	0,8	1,5	1,3	1,1	1,3	0,7	1,3	1,4
	Kvinnor	4,1	0,6	0,6	0,3	0,5	0,8	0,8	1,4	0,7
T30	Män	3,8	0,8	1,0	1,2	0,8	0,5	1,1	1,0	1,1
	Kvinnor	2,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
T31	Män	1,3	0,1	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6	1,3	0,6
	Kvinnor	1,6	0,4	0,4	0,1	0,2	0,4	0,6	1,3	0,4
T32	Män	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
T33	Män	0,0	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	1,0	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1
T34	Män	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,4	0,8	0,3	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1
T35	Män	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	1,0	0,7	1,0	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,4	0,3	0,1
T36	Män	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	0,6	0,1
	Kvinnor	0,4	0,2	1,7	0,3	0,2	0,3	0,3	1,4	0,5
T37	Män	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1
	Kvinnor	0,4	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,2
T38	Män	1,3	0,3	0,8	0,7	0,8	0,7	1,1	1,6	0,8
	Kvinnor	1,3	0,3	1,9	1,0	0,9	0,8	0,9	1,7	1,0
T39	Män	5,8	1,2	9,3	7,8	3,7	2,8	3,6	4,8	5,3
	Kvinnor	5,6	13,1	74,3	18,6	6,6	3,5	4,0	4,9	17,6

Tabell 7. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
T40	Män	1,8	0,4	9,1	5,8	2,1	1,3	2,3	4,4	3,7
	Kvinnor	1,3	0,7	8,8	3,7	1,8	1,6	2,7	4,0	3,0
T41	Män	0,3	0,1	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3
	Kvinnor	0,1	0,1	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2
T42	Män	5,7	1,1	14,3	16,5	12,6	11,6	14,6	24,7	12,2
	Kvinnor	4,4	4,2	35,7	32,3	23,4	14,9	20,2	23,2	22,7
T43	Män	3,2	1,0	12,4	10,4	6,4	3,8	3,7	3,5	7,0
	Kvinnor	3,3	2,9	31,3	22,1	13,0	6,3	7,0	4,8	14,4
T44	Män	3,7	0,3	0,9	0,7	0,7	0,7	1,5	2,5	0,9
	Kvinnor	2,7	0,6	2,9	1,3	1,0	0,9	1,4	1,7	1,4
T45	Män	6,8	0,3	0,5	0,3	0,9	2,1	1,9	3,8	1,1
	Kvinnor	4,5	0,7	3,2	1,0	0,6	1,6	3,6	4,0	1,6
T46	Män	1,5	0,2	0,3	0,4	1,3	5,6	24,8	63,1	3,3
	Kvinnor	1,9	0,2	1,5	0,7	1,0	6,1	32,4	85,3	6,4
T47	Män	1,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
	Kvinnor	0,7	0,2	1,0	0,2	0,1	0,3	0,2	0,6	0,3
T48	Män	8,5	0,3	0,6	0,6	0,3	0,2	0,2	1,9	0,9
	Kvinnor	4,6	0,9	1,8	0,5	0,6	0,4	0,9	0,7	1,0
T49	Män	2,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,4	0,6	0,2
	Kvinnor	0,8	0,1	0,4	0,2	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2
T50	Män	6,5	1,0	12,2	13,2	9,7	7,7	17,1	26,3	10,1
	Kvinnor	5,8	3,8	43,4	26,4	17,4	12,5	20,8	30,0	20,6
T51	Män	0,8	6,0	19,7	7,6	7,8	4,2	1,7	0,6	7,8
	Kvinnor	0,8	6,4	20,6	6,4	4,5	1,5	0,2	1,1	6,2
T52	Män	38,7	1,4	1,6	0,9	0,7	0,4	0,2	0,6	3,0
	Kvinnor	20,0	0,7	1,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3	1,4
T53	Män	1,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
T54	Män	2,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	1,6	0,3
	Kvinnor	1,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2
T55	Män	2,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	3,2	0,3
	Kvinnor	1,8	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5	2,0	0,3
T56	Män	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
T57	Män	0,6	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1
	Kvinnor	0,6	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
T58	Män	0,4	1,0	1,4	2,1	1,6	1,7	2,1	1,9	1,6
	Kvinnor	0,7	0,3	1,0	0,7	0,7	0,6	1,0	1,7	0,7
T59	Män	1,7	3,6	5,9	5,3	3,9	2,6	3,1	5,7	4,2
	Kvinnor	1,8	1,8	3,8	2,0	1,9	1,2	2,3	4,5	2,2

Tabell 7. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
T60	Män	1,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
T61	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
T62	Män	2,6	0,4	1,3	0,2	0,3	0,2	0,5	1,0	0,6
	Kvinnor	3,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,5
T63	Män	9,3	6,5	1,9	1,6	1,8	1,8	1,7	1,9	2,8
	Kvinnor	6,1	4,0	0,9	1,0	1,7	2,2	1,2	0,6	1,9
T64	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0
T65	Män	8,5	1,4	7,9	5,6	3,0	2,5	2,8	6,7	4,4
	Kvinnor	5,8	2,1	15,5	7,1	3,8	2,5	3,4	4,4	5,7
T66	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
T67	Män	0,2	0,0	0,3	0,2	0,4	1,0	2,5	2,2	0,5
	Kvinnor	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	0,8	1,4	0,3
T68	Män	0,4	0,3	1,2	1,2	1,7	3,7	5,2	13,6	1,8
	Kvinnor	0,0	0,1	0,6	0,3	0,7	0,9	2,9	6,1	0,8
T69	Män	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
T70	Män	0,0	0,0	1,2	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
T71	Män	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2
	Kvinnor	0,4	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,8	0,2
T73	Män	0,2	0,1	0,8	0,4	0,3	0,4	1,1	1,9	0,4
	Kvinnor	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,6	0,7	0,3
T74	Män	2,3	1,4	5,4	2,5	1,4	0,7	0,3	1,0	2,1
	Kvinnor	2,8	1,9	6,5	5,2	2,4	0,5	0,4	0,3	3,2
T75	Män	10,5	2,9	5,1	5,5	3,2	1,6	1,5	0,6	4,2
	Kvinnor	5,4	1,5	2,1	1,9	1,2	0,7	0,9	0,6	1,7
T78	Män	24,4	12,7	12,0	11,7	13,5	19,3	18,2	16,5	14,1
	Kvinnor	14,7	8,7	18,8	16,1	17,8	20,0	19,6	20,2	16,6
T79	Män	2,9	2,1	6,4	5,9	7,0	11,2	12,5	15,2	6,5
	Kvinnor	2,3	1,8	1,9	2,9	3,2	7,3	9,9	15,7	4,0

Tabell 7. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnoskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela tidsperioden

Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-diagnosis, sex and age

Diagnos	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
T80	Män	0,2	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	1,7	1,0	0,5
	Kvinnor	0,3	0,2	0,1	0,5	0,8	1,3	0,8	0,6	0,6
T81	Män	16,8	14,8	24,0	26,1	52,7	123,8	151,4	125,0	46,7
	Kvinnor	9,7	11,9	23,8	41,7	58,0	84,8	105,3	89,1	48,6
T82	Män	1,0	0,3	0,7	1,0	5,9	19,6	26,4	18,1	5,3
	Kvinnor	0,9	0,2	0,5	0,9	3,7	11,2	16,6	11,2	3,9
T83	Män	0,0	0,1	0,2	0,3	1,3	6,7	14,3	27,9	2,2
	Kvinnor	0,0	0,1	0,8	3,0	1,4	2,1	3,2	3,1	1,8
T84	Män	0,5	1,4	6,0	8,2	31,9	123,9	210,8	202,4	35,8
	Kvinnor	0,4	1,1	3,2	7,1	34,1	131,2	233,4	255,0	48,4
T85	Män	4,1	2,7	2,0	2,6	4,5	8,6	9,5	8,6	4,0
	Kvinnor	4,4	2,9	2,8	3,3	5,0	7,4	9,3	8,6	4,7
T86	Män	0,4	0,6	1,9	3,5	6,3	2,8	0,3	1,3	3,2
	Kvinnor	0,4	0,6	1,1	1,9	3,6	1,4	1,2	0,7	1,9
T87	Män	0,1	0,0	0,1	0,5	1,1	3,9	8,3	14,0	1,4
	Kvinnor	0,0	0,1	0,0	0,1	0,7	2,5	5,4	9,8	1,2
T88	Män	4,3	1,8	2,8	3,6	7,3	17,6	26,8	37,1	7,1
	Kvinnor	3,5	1,4	6,2	7,4	9,4	17,9	33,3	42,3	10,8
T90	Män	0,0	0,4	2,2	2,2	1,6	0,8	0,7	1,0	1,5
	Kvinnor	0,7	0,3	1,7	1,1	0,9	0,6	0,5	0,7	0,9
T91	Män	0,0	0,0	1,4	3,2	2,7	1,7	0,5	1,6	1,9
	Kvinnor	0,0	0,1	1,3	2,1	1,5	0,9	1,0	1,4	1,3
T92	Män	0,7	3,6	13,9	16,2	13,6	6,0	3,5	2,2	11,0
	Kvinnor	0,6	2,8	7,0	8,5	10,2	8,9	7,5	5,8	7,5
T93	Män	0,5	1,5	9,3	9,1	6,9	12,4	25,9	47,6	8,8
	Kvinnor	0,2	0,7	5,6	5,0	8,6	21,2	53,1	81,9	12,7
T94	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	1,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1
T95	Män	0,6	0,7	0,9	0,8	0,7	0,3	0,2	0,0	0,7
	Kvinnor	0,4	0,4	1,0	0,8	0,5	0,2	0,1	0,0	0,5
T96	Män	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
T97	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
T98	Män	0,0	0,3	0,3	0,4	0,8	1,2	1,9	1,9	0,6
	Kvinnor	0,2	0,0	0,2	0,9	1,2	1,6	1,1	1,3	0,8

Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Skador på huvudet</i>							
Män	0-4	470,1	525,7	493,0	500,8	452,0	488,2
	5-14	420,1	403,3	394,0	377,9	373,1	393,7
	15-24	481,8	483,8	477,4	470,2	453,0	473,1
	25-44	237,7	239,2	227,3	218,0	202,5	225,0
	45-64	210,6	210,5	212,1	212,0	204,1	209,8
	65-74	263,3	283,4	286,0	276,5	276,8	277,2
	75-84	465,2	475,9	451,7	447,9	456,1	459,3
	85+	865,5	894,3	881,3	872,9	855,9	873,8
	Totalt	321,7	325,1	316,6	310,2	298,7	314,4
Kvinnor	0-4	435,5	450,3	411,3	364,7	377,9	408,6
	5-14	281,4	278,0	251,0	245,8	244,7	260,2
	15-24	236,3	248,8	225,7	222,3	226,3	231,9
	25-44	108,9	111,7	111,1	100,3	96,1	105,6
	45-64	111,1	108,2	108,0	109,5	108,9	109,1
	65-74	157,1	164,4	163,7	157,8	156,7	159,9
	75-84	375,7	394,9	388,6	375,1	385,8	384,0
	85+	823,6	854,1	847,2	899,2	848,8	854,9
	Totalt	209,7	214,2	205,0	199,1	197,9	205,2
Båda könen		265,1	269,0	260,2	254,1	247,8	259,2
<i>Skador på halsen</i>							
Män	0-4	4,4	2,1	5,5	7,7	6,3	5,2
	5-14	10,3	10,5	9,3	13,4	12,9	11,3
	15-24	31,1	33,6	40,2	36,4	38,8	36,0
	25-44	23,4	28,1	28,8	28,7	27,4	27,3
	45-64	17,9	18,3	18,9	21,9	18,3	19,0
	65-74	21,4	24,2	21,7	27,5	22,7	23,5
	75-84	36,5	38,0	39,7	38,4	33,1	37,1
	85+	54,4	74,1	69,9	65,4	75,0	67,9
	Totalt	21,0	23,3	24,3	25,6	23,9	23,6
Kvinnor	0-4	5,0	5,7	3,6	4,5	4,0	4,6
	5-14	8,0	6,0	8,9	7,0	7,1	7,4
	15-24	18,3	27,2	26,0	24,5	21,9	23,6
	25-44	18,3	21,6	17,5	19,5	15,6	18,5
	45-64	10,8	12,0	12,1	13,0	10,9	11,8
	65-74	11,1	14,5	11,9	12,7	14,3	12,9
	75-84	22,4	21,0	24,1	21,3	24,9	22,7
	85+	41,5	40,0	40,8	35,5	47,0	41,0
	Totalt	14,8	16,9	16,1	16,2	15,1	15,8
Båda könen		17,9	20,1	20,2	20,9	19,5	19,7

Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Skador på bröstregionen</i>							
Män	0-4	3,6	3,3	3,0	2,6	4,6	3,4
	5-14	15,8	13,8	12,8	15,6	19,2	15,4
	15-24	47,3	49,0	52,4	61,6	62,2	54,5
	25-44	46,4	52,5	50,6	52,8	51,8	50,8
	45-64	67,8	68,4	70,8	68,5	68,0	68,7
	65-74	117,7	109,8	119,7	109,6	102,1	111,8
	75-84	201,6	207,7	197,9	189,5	189,0	197,1
	85+	422,0	380,3	368,4	434,1	356,8	392,0
	Totalt	64,7	65,8	66,4	67,8	66,4	66,2
Kvinnor	0-4	1,7	3,9	4,0	5,9	1,8	3,4
	5-14	10,7	10,2	11,4	12,2	14,1	11,7
	15-24	19,7	22,8	22,2	27,3	29,5	24,3
	25-44	19,1	19,0	20,2	23,6	21,0	20,6
	45-64	34,9	34,3	33,6	31,0	33,2	33,4
	65-74	74,5	66,9	74,1	64,9	60,1	68,2
	75-84	202,4	194,7	193,9	167,7	159,5	183,7
	85+	446,1	385,2	418,3	402,2	397,1	409,5
	Totalt	53,2	50,5	52,5	50,3	49,2	51,1
Båda könen		58,9	58,1	59,4	58,9	57,7	58,6
<i>Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet</i>							
Män	0-4	17,9	14,6	13,2	14,1	9,7	13,9
	5-14	52,5	57,4	54,0	52,9	54,9	54,4
	15-24	61,5	66,2	67,7	77,4	72,1	69,0
	25-44	38,3	42,1	44,4	39,7	43,4	41,6
	45-64	46,5	45,5	44,0	47,2	46,7	46,0
	65-74	85,2	80,2	88,1	92,8	89,5	87,1
	75-84	226,3	220,6	225,6	207,2	205,5	217,0
	85+	614,9	565,6	598,6	550,8	491,5	563,3
	Totalt	66,0	66,6	68,1	67,4	66,6	66,9
Kvinnor	0-4	12,1	12,3	9,9	11,7	9,8	11,2
	5-14	38,7	39,5	45,9	28,4	38,2	38,1
	15-24	41,0	43,7	42,7	42,0	49,2	43,7
	25-44	25,6	27,2	27,5	29,3	29,1	27,7
	45-64	29,7	31,3	29,0	29,6	27,8	29,5
	65-74	107,4	109,7	107,5	101,0	104,2	106,0
	75-84	443,0	421,1	414,8	389,7	389,4	411,6
	85+	1016,1	957,0	1009,9	883,9	893,0	951,2
	Totalt	99,1	97,4	98,8	90,8	92,7	95,7
Båda könen		82,7	82,2	83,6	79,2	79,7	81,5

Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Skador på skuldra och överarm</i>							
Män	0-4	42,1	46,6	44,7	40,1	43,4	43,4
	5-14	67,2	68,4	66,3	66,0	73,4	68,2
	15-24	48,1	51,9	49,0	50,2	54,4	50,7
	25-44	36,9	37,2	37,3	40,0	36,2	37,5
	45-64	51,5	49,6	52,4	53,8	57,6	53,0
	65-74	76,1	86,2	78,5	76,3	82,6	80,0
	75-84	130,3	129,7	125,0	131,3	138,9	131,1
	85+	262,1	299,7	263,6	291,0	277,1	278,8
	Totalt	57,7	59,6	58,3	59,9	62,2	59,5
Kvinnor	0-4	40,9	39,0	37,2	38,4	36,9	38,5
	5-14	51,0	53,7	59,9	48,8	59,8	54,6
	15-24	16,4	21,4	15,8	17,2	17,0	17,5
	25-44	16,4	16,9	15,8	15,5	15,6	16,0
	45-64	39,2	38,2	38,4	40,6	43,2	40,0
	65-74	145,0	141,6	126,8	139,5	144,0	139,4
	75-84	339,3	338,4	313,9	332,0	353,3	335,4
	85+	598,4	541,0	576,1	537,4	592,8	569,1
	Totalt	81,9	80,6	78,4	79,0	84,5	80,9
Båda könen		70,0	70,2	68,5	69,5	73,5	70,3
<i>Skador på armbåge och underarm</i>							
Män	0-4	52,0	65,3	63,9	53,4	53,9	57,6
	5-14	250,3	239,8	248,1	242,0	258,5	247,7
	15-24	68,4	75,2	72,6	72,7	74,3	72,7
	25-44	40,8	41,1	41,6	41,6	41,7	41,4
	45-64	40,8	42,7	41,3	45,8	42,9	42,7
	65-74	38,5	44,4	46,1	44,0	42,4	43,1
	75-84	63,3	52,1	62,1	53,3	51,7	56,5
	85+	87,4	104,7	90,5	105,8	88,8	95,5
	Totalt	74,9	76,0	76,9	76,0	76,8	76,1
Kvinnor	0-4	39,7	45,1	43,1	34,3	43,1	41,1
	5-14	122,4	123,7	133,6	133,7	124,3	127,6
	15-24	25,4	26,4	26,2	29,5	22,2	25,9
	25-44	24,9	27,2	23,9	26,9	30,2	26,6
	45-64	66,0	71,0	65,7	75,2	79,5	71,5
	65-74	186,1	191,3	179,4	176,1	172,5	181,2
	75-84	285,2	283,4	271,5	297,9	278,8	283,4
	85+	387,8	340,2	363,4	328,3	375,6	358,9
	Totalt	93,7	95,2	92,9	96,5	96,4	94,9
Båda könen		84,4	85,7	85,0	86,3	86,7	85,6

Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Skador på handled och hand</i>							
Män	0-4	48,0	42,0	43,4	47,0	48,4	45,8
	5-14	58,2	56,6	58,3	53,9	64,3	58,3
	15-24	121,8	124,0	125,2	112,9	108,1	118,4
	25-44	93,7	92,3	90,1	90,9	86,6	90,7
	45-64	76,6	75,1	80,0	75,8	73,2	76,1
	65-74	64,1	69,5	67,8	61,3	70,6	66,7
	75-84	44,4	55,1	46,0	54,9	54,2	50,9
	85+	49,5	53,2	50,8	48,2	49,0	50,1
	Totalt	79,7	79,6	80,1	77,4	77,0	78,8
Kvinnor	0-4	38,4	41,6	42,2	31,6	33,3	37,5
	5-14	25,4	24,7	28,4	28,0	28,9	27,1
	15-24	27,8	32,9	28,4	30,9	32,0	30,4
	25-44	26,0	27,0	27,8	26,7	26,3	26,8
	45-64	26,3	25,3	26,3	22,7	24,1	24,9
	65-74	22,9	22,2	22,8	23,7	20,9	22,5
	75-84	24,5	28,2	29,6	32,9	26,4	28,3
	85+	40,1	40,7	28,9	35,5	41,5	37,3
	Totalt	26,9	27,8	28,0	27,0	27,1	27,4
Båda könen		53,0	53,4	53,8	51,9	51,8	52,8
<i>Skador på höft och lår</i>							
Män	0-4	38,5	41,6	34,5	36,7	34,9	37,3
	5-14	28,1	35,4	30,6	35,0	32,9	32,4
	15-24	38,8	35,7	40,8	43,2	43,4	40,4
	25-44	27,5	26,2	23,3	23,4	28,5	25,8
	45-64	76,1	77,7	75,1	76,5	74,5	76,0
	65-74	344,3	337,9	317,3	308,3	297,7	321,1
	75-84	1095,5	1075,7	1071,4	1031,6	1050,7	1064,9
	85+	3084,5	3174,2	3004,3	3056,0	3051,6	3073,5
	Totalt	167,9	169,4	163,9	163,9	165,0	166,0
Kvinnor	0-4	18,0	16,6	20,6	19,9	24,5	19,9
	5-14	19,9	15,3	19,8	15,7	13,6	16,8
	15-24	16,0	15,2	15,0	15,4	13,3	15,0
	25-44	11,9	11,6	10,9	11,2	12,2	11,5
	45-64	79,7	77,2	74,4	74,9	66,7	74,5
	65-74	529,8	508,1	478,2	464,0	476,1	491,5
	75-84	1934,9	1871,5	1856,8	1794,2	1755,6	1842,7
	85+	4933,1	4733,5	4771,3	4595,7	4586,3	4721,8
	Totalt	375,4	363,3	361,9	350,4	345,5	359,3
Båda könen		272,9	267,5	264,0	258,1	256,1	263,7

Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Skador på knä och underben</i>							
Män	0-4	31,8	27,0	21,7	20,1	27,4	25,7
	5-14	97,6	92,7	93,1	106,5	102,4	98,4
	15-24	223,6	219,0	207,2	195,8	184,6	206,0
	25-44	199,6	193,1	176,1	173,2	165,4	181,5
	45-64	168,2	155,3	154,4	150,7	149,6	155,5
	65-74	144,8	151,1	139,7	125,5	122,8	136,8
	75-84	169,7	170,2	143,2	159,3	138,5	156,1
	85+	247,3	244,9	219,1	211,6	238,9	232,2
	Totalt	165,7	159,7	150,5	148,9	144,0	153,7
Kvinnor	0-4	15,4	16,2	13,9	13,1	10,7	13,9
	5-14	68,9	70,3	65,5	69,4	66,5	68,1
	15-24	120,3	109,2	97,3	106,7	84,5	103,6
	25-44	112,0	108,3	95,5	93,3	87,2	99,3
	45-64	194,5	186,9	171,7	174,9	171,2	179,7
	65-74	277,1	255,8	246,7	250,4	241,4	254,4
	75-84	324,2	330,0	308,7	312,5	295,2	314,1
	85+	479,6	493,9	439,5	478,9	460,7	470,4
	Totalt	165,0	160,5	147,4	151,2	142,9	153,4
Båda könen		165,3	160,1	148,9	150,1	143,5	153,6
<i>Skador på fotled och fot</i>							
Män	0-4	9,9	12,1	12,8	12,8	12,6	12,0
	5-14	13,5	14,3	12,6	13,2	17,6	14,2
	15-24	30,7	29,9	26,7	30,6	32,2	30,1
	25-44	23,1	25,2	23,8	20,9	22,2	23,0
	45-64	24,0	25,6	26,1	21,2	24,5	24,3
	65-74	20,2	17,3	16,8	18,2	18,9	18,3
	75-84	18,0	16,7	18,2	12,4	17,8	16,6
	85+	41,2	22,6	27,0	28,0	38,3	31,4
	Totalt	21,9	22,5	21,8	20,1	22,6	21,8
Kvinnor	0-4	11,7	10,5	10,8	5,9	9,8	9,8
	5-14	10,5	9,3	10,3	8,1	12,0	10,0
	15-24	13,4	11,6	12,6	11,1	10,9	11,9
	25-44	10,3	9,6	9,1	8,0	8,6	9,1
	45-64	9,8	11,7	8,3	10,2	11,1	10,2
	65-74	19,7	15,7	15,4	12,7	12,2	15,2
	75-84	30,0	29,7	29,4	27,7	29,3	29,2
	85+	69,2	67,2	71,1	43,9	63,6	62,9
	Totalt	14,8	14,2	13,6	11,9	13,6	13,6
Båda könen		18,3	18,3	17,7	15,9	18,1	17,7

Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Skador som engagerar flera kroppsregioner</i>							
Män	0-4	2,8	2,9	2,1	2,1	0,8	2,2
	5-14	3,4	5,5	4,8	2,3	3,2	3,9
	15-24	8,3	8,8	9,0	6,8	7,8	8,1
	25-44	5,6	5,4	6,3	5,3	4,9	5,5
	45-64	3,5	3,4	3,6	4,1	4,2	3,8
	65-74	3,1	6,3	8,4	4,0	4,0	5,2
	75-84	10,9	12,9	11,6	9,9	14,9	12,0
	85+	11,5	20,9	22,2	31,1	18,4	20,9
	Totalt	5,1	5,9	6,2	5,1	5,3	5,5
Kvinnor	0-4	2,5	4,4	1,8	1,8	0,9	2,3
	5-14	3,0	5,3	2,3	1,2	2,3	2,8
	15-24	2,6	4,2	4,0	4,9	3,5	3,8
	25-44	3,0	2,7	3,0	2,1	2,6	2,7
	45-64	2,2	2,4	2,8	2,1	2,6	2,4
	65-74	3,4	3,2	3,5	3,3	4,6	3,6
	75-84	9,6	11,3	11,6	8,2	16,7	11,5
	85+	24,1	29,3	33,1	41,8	35,3	32,8
	Totalt	3,9	4,7	4,6	4,1	4,9	4,4
Båda könen		4,5	5,3	5,4	4,6	5,1	5,0

Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion

Män	0-4	8,7	7,9	9,4	6,4	8,0	8,1
	5-14	6,9	7,3	5,8	7,2	5,6	6,6
	15-24	6,4	9,7	12,0	9,3	9,5	9,4
	25-44	5,1	6,9	6,4	6,0	6,4	6,2
	45-64	6,9	7,5	6,9	5,7	6,5	6,7
	65-74	13,4	12,7	12,5	13,0	11,2	12,5
	75-84	24,7	20,9	22,4	22,3	19,0	21,8
	85+	39,6	37,1	46,0	49,8	39,8	42,5
	Totalt	8,4	9,2	9,2	8,6	8,4	8,7
Kvinnor	0-4	7,1	7,0	7,6	5,9	5,3	6,6
	5-14	4,8	3,9	5,6	6,2	4,3	4,9
	15-24	5,1	3,6	4,6	6,9	4,5	4,9
	25-44	2,9	4,1	3,9	3,8	3,7	3,7
	45-64	4,2	4,0	4,4	5,1	3,3	4,2
	65-74	11,1	10,5	8,9	7,1	9,9	9,5
	75-84	25,3	28,8	26,2	23,0	21,7	25,0
	85+	58,3	53,6	66,9	41,8	41,5	52,3
	Totalt	8,1	8,1	8,6	7,8	7,0	7,9
Båda könen		8,2	8,6	8,9	8,2	7,7	8,3

Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning</i>							
Män	0-4	64,7	72,4	68,1	65,7	59,3	66,1
	5-14	17,5	19,5	19,9	15,6	15,4	17,6
	15-24	10,2	10,1	9,3	7,2	9,3	9,2
	25-44	10,6	12,2	10,9	11,0	12,3	11,4
	45-64	18,7	19,8	19,9	17,3	17,0	18,5
	65-74	23,9	30,0	29,8	30,4	25,2	27,9
	75-84	37,7	47,5	46,8	51,2	50,4	46,8
	85+	62,6	91,8	87,3	73,1	104,1	84,1
	Totalt	19,9	22,7	21,9	20,3	20,6	21,1
Kvinnor	0-4	56,4	56,5	54,3	58,2	47,1	54,5
	5-14	14,2	13,2	11,0	13,9	10,4	12,5
	15-24	6,3	5,8	8,4	5,5	4,9	6,2
	25-44	7,3	6,6	6,9	6,7	5,9	6,7
	45-64	11,1	11,6	12,5	12,0	10,1	11,4
	65-74	21,6	18,0	20,5	17,6	17,6	19,1
	75-84	34,1	37,8	32,6	28,5	29,6	32,5
	85+	54,7	66,5	63,4	53,7	64,3	60,5
	Totalt	16,4	16,4	16,3	15,5	14,1	15,7
Båda könen		18,1	19,5	19,0	17,9	17,3	18,4

Brännskador och frätskador

Män	0-4	79,4	86,9	71,9	76,0	71,6	77,2
	5-14	14,8	13,5	13,6	10,9	16,1	13,8
	15-24	19,8	20,6	21,3	17,6	14,7	18,8
	25-44	21,5	20,2	16,3	18,6	16,4	18,6
	45-64	16,5	13,1	14,2	14,3	15,8	14,8
	65-74	8,8	13,6	10,7	9,0	10,9	10,6
	75-84	12,6	12,5	12,4	15,7	9,9	12,6
	85+	21,4	12,9	19,1	15,6	27,6	19,3
	Totalt	21,0	20,1	18,4	18,4	18,3	19,2
Kvinnor	0-4	53,9	53,9	57,0	59,1	63,1	57,3
	5-14	11,7	8,2	6,7	7,6	7,3	8,3
	15-24	9,3	5,2	8,2	6,5	9,0	7,6
	25-44	3,8	6,0	5,0	4,0	6,2	5,0
	45-64	5,5	4,7	5,9	4,8	5,3	5,2
	65-74	7,6	5,2	5,3	7,6	7,1	6,6
	75-84	11,1	10,2	9,3	6,1	9,1	9,2
	85+	11,7	15,7	9,2	9,8	11,8	11,6
	Totalt	9,6	8,9	8,9	8,3	9,7	9,1
Båda könen		15,2	14,4	13,6	13,3	14,0	14,1

Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Köldskada</i>							
Män	0-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5-14	0,5	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2
	15-24	0,9	0,6	0,2	1,1	0,6	0,7
	25-44	0,9	0,5	0,3	0,8	0,3	0,6
	45-64	0,9	0,5	0,9	1,1	1,3	0,9
	65-74	2,6	0,9	1,2	1,4	2,0	1,6
	75-84	3,8	2,5	0,8	0,4	0,8	1,7
	85+	1,6	4,8	0,0	3,1	1,5	2,2
	Totalt	1,1	0,6	0,5	0,9	0,8	0,8
Kvinnor	0-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5-14	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1
	15-24	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2
	25-44	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	45-64	0,1	0,3	0,2	0,6	0,1	0,2
	65-74	0,0	0,5	0,0	0,3	0,5	0,3
	75-84	1,5	0,6	0,6	0,9	1,2	0,9
	85+	1,5	0,7	0,7	1,4	0,0	0,8
	Totalt	0,2	0,2	0,1	0,4	0,2	0,2
Båda könen		0,7	0,4	0,3	0,6	0,5	0,5
<i>Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser</i>							
Män	0-4	57,6	51,2	47,7	48,2	41,2	49,3
	5-14	6,6	7,3	6,5	5,9	5,1	6,3
	15-24	49,0	56,1	59,3	65,9	63,0	58,7
	25-44	56,5	53,4	52,2	54,0	56,2	54,5
	45-64	38,3	36,8	35,8	39,0	39,5	37,9
	65-74	39,0	43,0	34,5	35,0	29,5	36,2
	75-84	77,9	67,6	73,3	68,9	70,3	71,6
	85+	128,6	130,5	142,9	147,8	133,2	136,7
	Totalt	45,0	44,1	43,3	45,4	44,8	44,5
Kvinnor	0-4	43,4	42,5	41,3	30,2	30,7	37,7
	5-14	30,0	27,4	24,9	28,0	23,2	26,7
	15-24	176,7	187,9	190,4	205,1	207,2	193,5
	25-44	95,5	95,3	98,3	106,4	105,3	100,2
	45-64	63,7	59,3	62,0	67,3	65,4	63,5
	65-74	51,1	46,2	50,6	44,3	47,7	48,0
	75-84	93,5	92,8	97,7	90,6	93,8	93,7
	85+	177,8	153,7	159,9	154,0	151,5	159,2
	Totalt	84,2	82,7	85,0	88,9	88,4	85,9
Båda könen		64,9	63,6	64,4	67,4	66,8	65,4

Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning</i>							
Män	0-4	76,6	72,4	65,6	66,2	68,2	69,9
	5-14	23,9	20,6	23,4	22,4	14,1	20,9
	15-24	39,4	38,2	40,8	43,4	39,1	40,2
	25-44	21,4	21,7	26,7	27,1	23,9	24,1
	45-64	15,9	17,1	21,5	20,8	22,8	19,7
	65-74	14,3	11,0	14,2	13,0	16,6	13,8
	75-84	13,8	15,8	11,6	11,1	11,2	12,7
	85+	23,1	16,1	22,2	31,1	24,5	23,5
	Totalt	24,7	23,9	26,8	26,9	25,3	25,5
Kvinnor	0-4	43,4	55,6	38,6	41,5	39,6	43,8
	5-14	13,9	16,7	17,5	16,0	18,0	16,4
	15-24	35,1	40,3	44,5	52,3	47,2	43,9
	25-44	16,8	14,9	20,1	20,6	20,4	18,6
	45-64	11,8	11,6	14,5	14,1	15,7	13,5
	65-74	7,6	7,7	8,1	10,9	8,9	8,7
	75-84	15,7	12,2	8,7	6,4	5,6	9,7
	85+	16,0	16,4	14,1	14,6	13,8	15,0
	Totalt	17,8	18,4	19,9	20,9	20,6	19,5
Båda könen		21,2	21,1	23,3	23,9	22,9	22,5

Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

Män	0-4	33,0	45,3	34,5	32,9	43,4	37,8
	5-14	23,9	16,5	18,4	14,1	15,8	17,7
	15-24	24,5	24,8	25,7	28,3	27,4	26,2
	25-44	22,3	23,4	26,0	19,5	21,8	22,6
	45-64	21,9	21,5	20,9	16,0	23,7	20,8
	65-74	28,2	26,5	28,4	29,5	24,4	27,4
	75-84	26,0	32,5	27,3	28,9	33,1	29,6
	85+	31,3	40,3	42,9	34,2	38,3	37,4
	Totalt	24,1	24,3	24,6	21,1	24,4	23,7
Kvinnor	0-4	25,5	21,5	22,0	23,0	25,8	23,6
	5-14	10,8	12,1	11,7	12,5	15,7	12,6
	15-24	29,6	29,4	27,8	27,1	30,4	28,9
	25-44	25,6	25,8	23,5	22,6	23,8	24,3
	45-64	23,1	24,7	22,2	20,2	23,0	22,6
	65-74	25,6	24,2	21,5	20,6	22,7	22,9
	75-84	28,0	25,0	24,4	29,4	22,6	25,9
	85+	28,4	35,0	28,9	33,5	23,5	29,8
	Totalt	23,8	24,1	22,1	21,9	23,3	23,0
Båda könen		24,0	24,2	23,3	21,5	23,8	23,4

Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld</i>							
Män	0-4	1,6	2,9	1,7	3,0	5,5	2,9
	5-14	2,2	2,2	1,7	2,3	2,0	2,1
	15-24	7,2	6,1	6,5	5,3	7,3	6,5
	25-44	6,5	6,8	5,1	5,3	5,6	5,9
	45-64	8,7	4,8	6,7	7,8	6,9	7,0
	65-74	9,7	13,3	11,6	11,3	10,6	11,3
	75-84	12,2	13,8	11,2	12,8	12,8	12,5
	85+	14,8	11,3	20,6	15,6	13,8	15,2
	Totalt	6,9	6,3	6,1	6,5	6,6	6,5
Kvinnor	0-4	1,7	1,8	4,5	2,7	0,9	2,3
	5-14	1,6	3,0	0,7	1,8	2,3	1,9
	15-24	2,2	2,4	2,0	2,0	1,2	1,9
	25-44	3,7	3,2	2,4	2,7	2,5	2,9
	45-64	3,0	3,6	2,0	3,7	3,6	3,2
	65-74	6,1	7,0	7,8	8,1	7,1	7,2
	75-84	15,1	9,3	7,0	9,3	9,1	10,0
	85+	19,7	10,7	16,9	12,5	18,7	15,7
	Totalt	4,6	4,2	3,4	4,0	3,9	4,0
Båda könen		5,7	5,2	4,7	5,2	5,2	5,2

Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

Män	0-4	21,0	25,8	23,8	32,0	36,2	27,7
	5-14	21,9	20,0	20,1	23,4	23,4	21,8
	15-24	32,6	34,7	36,6	39,7	42,7	37,3
	25-44	44,0	45,9	45,9	40,7	48,2	44,9
	45-64	104,8	102,6	107,3	106,3	114,8	107,2
	65-74	286,1	284,9	298,7	300,2	310,1	296,0
	75-84	420,8	392,1	432,6	440,9	449,9	427,3
	85+	399,0	388,3	441,4	429,5	425,7	417,1
	Totalt	98,6	97,2	102,8	102,9	109,3	102,2
Kvinnor	0-4	22,5	19,7	18,4	19,0	17,8	19,5
	5-14	15,8	16,5	19,3	17,8	21,6	18,2
	15-24	38,5	32,9	38,0	39,6	40,8	38,0
	25-44	67,6	62,6	63,2	63,9	67,5	64,9
	45-64	110,9	108,3	110,4	110,8	124,9	113,1
	65-74	253,5	238,3	246,9	249,2	249,0	247,4
	75-84	369,3	387,9	382,8	383,5	412,5	387,2
	85+	357,9	407,4	409,2	393,8	398,4	393,6
	Totalt	114,8	113,9	115,9	116,0	123,3	116,8
Båda könen		106,8	105,6	109,4	109,6	116,4	109,6

*Tabell 8a. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year*

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker</i>							
Män	0-4	3,2	3,3	0,4	2,1	0,4	1,9
	5-14	7,7	7,7	5,2	7,0	7,0	6,9
	15-24	37,0	33,4	21,7	25,9	24,4	28,5
	25-44	41,2	33,1	28,8	29,3	32,0	32,9
	45-64	33,6	28,4	24,1	26,0	24,0	27,2
	65-74	24,5	23,6	18,8	23,4	24,4	23,0
	75-84	36,5	40,9	33,1	31,0	23,6	33,0
	85+	85,7	59,6	55,6	48,2	36,7	56,8
	Totalt	31,1	26,8	21,8	23,5	22,9	25,2
Kvinnor	0-4	4,6	1,3	0,4	1,4	2,7	2,1
	5-14	5,3	6,7	3,7	3,5	3,9	4,6
	15-24	24,1	17,8	13,6	13,1	18,3	17,4
	25-44	24,2	20,4	16,4	17,9	16,1	19,0
	45-64	27,4	23,1	22,7	22,4	22,2	23,5
	65-74	49,9	37,7	28,8	28,3	25,2	34,1
	75-84	82,4	70,7	60,2	52,7	53,1	63,8
	85+	126,8	96,5	101,4	73,9	64,3	92,2
	Totalt	31,5	25,8	22,4	21,2	20,9	24,4
Båda könen		31,3	26,3	22,1	22,3	21,9	24,8

Tabell 8b. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Skallfrakturer</i>							
Män	0-4	21,4	22,9	22,6	25,2	26,1	23,6
	5-14	15,0	18,6	20,3	19,1	19,7	18,5
	15-24	68,1	71,0	65,4	68,0	71,4	68,8
	25-44	40,1	39,6	40,3	35,1	37,1	38,4
	45-64	26,7	26,7	26,2	26,5	27,8	26,8
	65-74	19,7	22,2	23,8	20,5	22,9	21,8
	75-84	26,8	29,6	33,9	30,5	30,6	30,3
	85+	52,8	56,4	57,2	34,2	41,3	48,2
	Totalt	33,4	34,6	34,5	32,7	34,5	33,9
Kvinnor	0-4	18,8	18,0	14,8	13,5	19,1	16,9
	5-14	12,4	11,2	13,0	13,7	10,9	12,3
	15-24	13,6	14,2	13,6	18,0	14,8	14,8
	25-44	10,1	13,0	12,9	10,8	8,9	11,1
	45-64	11,5	11,2	10,3	11,0	11,5	11,1
	65-74	11,6	13,2	12,9	11,5	10,7	12,0
	75-84	30,6	27,6	27,9	25,0	32,0	28,6
	85+	37,9	46,5	43,7	57,2	39,4	45,0
	Totalt	14,2	14,9	14,5	14,8	13,9	14,5
Båda könen		23,7	24,6	24,4	23,7	24,1	24,1
<i>Frakturer på halsens och bålens ben</i>							
Män	0-4	2,8	1,2	1,7	0,4	0,4	1,3
	5-14	6,9	8,2	6,6	9,7	9,0	8,1
	15-24	42,6	44,6	42,5	49,7	47,5	45,4
	25-44	45,8	47,6	49,9	46,3	51,7	48,3
	45-64	78,3	74,5	78,8	80,2	73,6	77,1
	65-74	160,2	145,0	154,2	155,0	145,1	151,9
	75-84	325,6	322,0	312,1	289,0	295,2	308,7
	85+	788,0	725,1	754,3	740,7	640,0	728,6
	Totalt	80,6	78,5	80,7	80,2	77,9	79,6
Kvinnor	0-4	0,8	1,3	0,4	0,5	0,9	0,8
	5-14	7,1	7,2	8,6	6,3	8,2	7,5
	15-24	28,0	27,0	26,6	25,7	29,5	27,4
	25-44	23,1	23,0	23,7	22,6	22,3	22,9
	45-64	43,1	41,4	41,8	40,9	38,9	41,2
	65-74	148,5	141,1	141,7	131,1	127,4	138,1
	75-84	533,6	493,0	491,2	434,5	428,9	476,3
	85+	1180,8	1049,9	1111,3	1028,2	1005,1	1074,1
	Totalt	111,3	103,5	106,1	97,4	95,8	102,8
Båda könen		96,1	91,2	93,5	88,9	86,9	91,3

Tabell 8b. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Frakturer på övre extremitet</i>							
Män	0-4	97,7	112,3	114,1	97,8	99,8	104,3
	5-14	322,1	308,1	316,8	311,0	337,0	318,9
	15-24	116,5	126,1	124,1	121,6	128,2	123,3
	25-44	74,1	71,5	70,8	73,8	71,8	72,4
	45-64	79,1	82,8	85,6	86,6	84,3	83,7
	65-74	102,0	115,0	106,3	107,9	115,3	109,3
	75-84	162,6	158,1	161,5	154,8	153,0	158,0
	85+	275,3	338,4	289,0	317,4	274,1	298,8
	Totalt	125,4	127,6	127,9	127,0	129,6	127,5
Kvinnor	0-4	81,8	87,2	86,1	72,2	82,7	82,0
	5-14	173,4	173,1	191,0	180,4	182,7	180,1
	15-24	33,7	40,5	33,6	40,0	34,3	36,4
	25-44	35,9	38,0	34,1	37,3	40,0	37,1
	45-64	98,5	101,4	97,2	106,6	112,5	103,3
	65-74	314,2	312,5	289,2	296,3	294,9	301,5
	75-84	569,2	568,1	534,3	577,8	579,0	565,6
	85+	856,4	760,5	820,5	744,5	846,7	805,5
	Totalt	162,0	161,4	158,0	161,2	166,3	161,8
Båda könen		143,9	144,7	143,1	144,3	148,1	144,8
<i>Frakturer på nedre extremitet</i>							
Män	0-4	67,1	63,6	52,8	50,8	60,2	59,0
	5-14	101,0	105,5	101,7	115,7	109,6	106,7
	15-24	170,1	166,0	166,6	168,5	164,7	167,2
	25-44	137,8	138,8	130,8	129,7	134,2	134,3
	45-64	201,8	194,9	192,0	188,0	188,3	192,9
	65-74	412,4	414,6	386,8	375,1	360,3	389,9
	75-84	1096,3	1072,3	1039,1	1018,0	1027,5	1050,5
	85+	2875,1	2964,8	2766,1	2785,3	2817,4	2840,7
	Totalt	261,1	260,7	250,6	250,3	251,1	254,8
Kvinnor	0-4	32,6	34,2	30,9	31,6	32,9	32,4
	5-14	71,4	66,1	67,7	68,0	64,3	67,5
	15-24	67,9	64,7	64,3	68,1	58,3	64,6
	25-44	90,1	88,1	78,5	77,7	76,2	82,1
	45-64	246,0	241,2	225,3	232,4	217,1	232,2
	65-74	727,7	693,4	660,1	648,0	645,3	675,3
	75-84	1987,1	1938,4	1928,9	1855,1	1792,3	1900,5
	85+	4693,3	4527,7	4564,2	4358,7	4367,0	4500,0
	Totalt	464,6	452,3	444,7	434,0	422,9	443,7
Båda könen		364,0	357,6	348,7	343,1	337,8	350,2

Tabell 8b. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Hjämskakning</i>							
Män	0-4	304,5	355,2	318,9	315,5	281,2	315,0
	5-14	327,8	308,1	307,8	281,2	279,5	300,9
	15-24	323,9	317,8	309,5	299,1	276,3	305,2
	25-44	142,6	140,4	128,2	119,3	104,8	127,1
	45-64	124,4	117,8	113,8	108,7	101,3	113,0
	65-74	139,7	144,2	147,2	129,3	125,1	137,1
	75-84	238,5	218,1	202,4	194,0	174,1	205,3
	85+	387,4	378,7	373,2	370,3	355,2	372,7
	Totalt	202,8	198,6	190,0	179,0	166,5	187,3
Kvinnor	0-4	308,5	300,1	284,4	250,5	262,3	281,7
	5-14	219,9	218,6	193,4	188,7	190,3	202,2
	15-24	189,0	197,3	173,6	160,9	166,2	177,3
	25-44	79,1	76,4	75,8	61,6	63,1	71,2
	45-64	71,4	70,0	67,5	63,2	61,6	66,7
	65-74	96,9	96,7	94,6	89,8	90,0	93,6
	75-84	212,9	214,8	218,6	190,5	188,2	205,0
	85+	465,0	467,4	446,5	432,2	407,4	443,3
	Totalt	143,3	142,4	134,3	122,6	123,0	133,1
Båda könen		172,7	170,2	161,8	150,5	144,5	159,9
<i>Annan intrakraniell skada utan fraktur</i>							
Män	0-4	15,1	17,9	13,2	14,9	15,2	15,3
	5-14	11,6	13,3	15,5	14,4	15,9	14,1
	15-24	32,6	35,3	36,8	38,1	43,4	37,3
	25-44	23,1	25,1	22,9	25,8	25,7	24,5
	45-64	36,3	36,6	41,3	47,1	44,4	41,2
	65-74	77,8	85,6	86,4	90,2	83,8	84,7
	75-84	150,9	164,7	152,8	163,1	180,7	162,5
	85+	270,4	283,6	284,2	301,9	283,3	284,8
	Totalt	40,4	43,4	43,7	47,3	47,8	44,5
Kvinnor	0-4	6,7	15,8	12,6	9,0	12,9	11,3
	5-14	9,4	10,7	9,8	10,4	9,1	9,9
	15-24	11,6	12,6	12,0	14,8	16,4	13,5
	25-44	6,3	6,9	8,4	10,6	9,2	8,3
	45-64	15,3	15,8	14,8	16,7	18,7	16,3
	65-74	27,8	33,5	34,9	37,4	34,2	33,5
	75-84	76,0	85,3	81,4	87,1	85,9	83,1
	85+	125,4	138,7	151,4	190,3	164,6	154,4
	Totalt	20,5	23,2	23,2	26,4	25,5	23,8
Båda könen		30,3	33,1	33,3	36,8	36,5	34,0

Tabell 8b. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per diagnosgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by ICD-group, sex, age and year

Diagnosgrupp	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Annat</i>							
Män	0-4	557,5	578,1	538,1	566,1	547,6	557,5
	5-14	357,1	352,0	329,2	338,5	347,7	344,9
	15-24	634,5	649,2	654,9	658,3	637,8	646,9
	25-44	535,7	539,8	521,7	512,8	502,9	522,6
	45-64	500,8	491,0	499,0	495,6	516,5	500,6
	65-74	716,5	737,8	747,3	734,0	737,7	734,6
	75-84	1129,9	1135,7	1156,7	1163,3	1169,8	1151,1
	85+	1918,9	1920,7	1967,4	1993,3	2001,3	1961,2
	Totalt	581,9	584,6	579,6	579,7	581,6	581,5
Kvinnor	0-4	433,4	452,5	414,0	396,8	374,4	414,6
	5-14	254,2	257,7	254,5	238,4	251,5	251,3
	15-24	514,0	524,3	522,4	556,5	541,4	531,8
	25-44	371,8	369,0	361,9	376,4	368,8	369,6
	45-64	374,4	364,0	365,7	369,1	388,8	372,5
	65-74	636,0	587,2	586,5	580,0	590,8	596,3
	75-84	1238,8	1264,7	1207,4	1218,5	1259,8	1237,8
	85+	2363,8	2370,0	2362,8	2275,2	2296,6	2333,1
	Totalt	528,5	525,9	517,5	520,9	527,6	524,1
Båda könen		554,9	554,9	548,2	550,0	554,3	552,5

Tabell 9. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per kön, åldersgrupp och år

Number of patients with external cause of injury and death by sex, age and year

Kön	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
Män	0-4	2541	2808	2527	2646	2608	13130
	5-14	6346	6528	6495	6496	6678	32543
	15-24	6896	7275	7309	7516	7519	36515
	25-44	11809	12443	12118	12134	12160	60664
	45-64	11982	12285	12600	13239	13703	63809
	65-74	6439	6676	6665	6837	7137	33754
	75-84	8060	8421	8421	8917	9189	43008
	85+	4003	4338	4276	4669	4792	22078
	Totalt	58076	60774	60411	62454	63786	305501
Kvinnor	0-4	2008	2065	1895	1817	1882	9667
	5-14	3975	4205	4236	4104	4124	20644
	15-24	4310	4594	4587	4869	4892	23252
	25-44	7908	8215	8394	8279	8318	41114
	45-64	10246	10510	10530	11159	11617	54062
	65-74	8344	8201	7997	8118	8204	40864
	75-84	15834	16290	15925	16586	16340	80975
	85+	12693	12855	13155	13670	13761	66134
	Totalt	65318	66935	66719	68603	69140	336715
Totalt		123394	127709	127130	131057	132927	642217

Tabell 10. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per län, kön och år
Number of patients with external cause of injury and death by county, sex and year

	Män					Kvinnor					
Hemlän	1998	1999	2000	2001	2002	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
Stockholm	10788	10497	10455	11593	12056	13502	12679	12662	13807	14171	122210
Uppsala	1870	1737	1906	1826	1865	2145	2001	2033	2065	2008	19456
Södermanland	1751	2008	1920	1816	1768	2059	2137	2017	2009	1926	19411
Östergötland	1906	1967	1787	2081	2545	2053	1972	1713	2193	2742	20959
Jönköping	1732	2535	2357	2416	2466	2115	2616	2583	2437	2476	23733
Kronoberg	1276	1335	1239	1278	1286	1326	1340	1358	1369	1346	13153
Kalmar	1887	1825	1796	1768	1798	2059	1923	1966	1903	1855	18780
Gotland	472	471	496	505	504	493	507	499	602	543	5092
Blekinge	813	873	786	813	858	968	1026	1003	1024	980	9144
Skåne	4526	7043	7395	7463	7846	5290	8098	8347	8615	8763	73386
Halland	2156	2104	2144	2240	2395	2226	2240	2187	2287	2388	22367
Västra Götaland	11416	11204	10998	11114	11464	12371	11840	11565	11713	11610	115295
Värmland	1588	1816	1691	1851	1756	1773	1906	1797	2081	1940	18199
Örebro	2050	1977	1921	1846	1834	2206	2159	2045	2064	2157	20259
Västmanland	1374	1410	1411	1391	1497	1646	1647	1660	1639	1645	15320
Dalarna	2409	2307	2307	2266	2266	2430	2424	2470	2358	2351	23588
Gävleborg	1921	2170	2188	2489	2286	2116	2544	2845	2464	2608	23631
Västernorrland	2292	2236	2098	2172	2056	2548	2372	2350	2288	2185	22597
Jämtland	1298	1260	1286	1204	1233	1284	1332	1285	1297	1208	12687
Västerbotten	2353	2270	2272	2207	2026	2443	2391	2392	2337	2238	22929
Norrbottn	2195	1716	1953	2116	1949	2255	1781	1947	2048	2003	19963

Tabell 11. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by sex, age and year

Kön	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
Män	0-4	1008,9	1167,9	1075,8	1129,6	1097,7	1095,1
	5-14	1068,0	1086,4	1079,4	1088,1	1132,6	1090,8
	15-24	1300,3	1387,8	1393,0	1419,4	1401,0	1380,3
	25-44	951,9	1001,3	974,5	977,2	980,2	977,0
	45-64	1080,9	1093,7	1106,9	1147,6	1174,4	1121,3
	65-74	1835,1	1924,8	1931,3	1977,2	2047,1	1942,9
	75-84	3377,8	3512,3	3486,2	3681,0	3799,6	3572,1
	85+	6599,2	6989,8	6789,9	7265,1	7337,4	7002,8
	Totalt	1327,3	1387,5	1375,2	1416,7	1440,8	1389,6
Kvinnor	0-4	838,4	904,6	849,9	820,2	836,8	850,1
	5-14	706,1	737,6	741,6	723,2	736,7	729,1
	15-24	850,1	917,3	916,3	963,8	954,5	920,5
	25-44	665,3	689,3	703,5	694,2	698,4	690,2
	45-64	937,3	950,0	939,4	983,9	1012,4	965,1
	65-74	2051,2	2048,5	2023,4	2066,1	2091,0	2055,9
	75-84	4612,1	4740,6	4628,9	4830,2	4790,7	4720,4
	85+	9251,7	9187,6	9264,4	9528,7	9519,2	9352,5
	Totalt	1458,5	1493,6	1485,9	1524,3	1531,8	1498,9
Båda könen		1393,6	1441,2	1431,2	1471,0	1486,7	1444,9

Tabell 12. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per län, kön och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by county, sex and year

	Män					Kvinnor					
Hemlän	1998	1999	2000	2001	2002	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
Stockholm	1239,5	1191,4	1172,5	1287,5	1329,3	1478,7	1374,7	1359,3	1471,2	1501,9	1343,1
Uppsala	1302,9	1206,6	1316,0	1250,0	1266,6	1450,4	1347,9	1361,1	1371,6	1326,2	1320,6
Södermanland	1380,1	1585,0	1515,1	1425,9	1378,1	1591,3	1654,0	1559,9	1547,0	1473,4	1511,3
Östergötland	927,6	959,2	870,9	1011,3	1233,0	992,2	956,2	831,0	1061,5	1324,4	1017,0
Jönköping	1065,3	1561,9	1448,5	1484,6	1514,9	1278,1	1585,8	1564,4	1476,2	1498,9	1448,1
Kronoberg	1431,1	1505,3	1401,2	1445,1	1448,9	1491,3	1514,8	1539,5	1553,2	1525,7	1485,5
Kalmar	1597,7	1555,1	1537,1	1517,8	1542,6	1715,8	1614,0	1658,4	1609,8	1571,1	1592,4
Gotland	1653,2	1660,3	1753,5	1780,9	1777,9	1694,6	1744,7	1719,1	2071,9	1870,3	1773,1
Blekinge	1073,3	1158,0	1043,6	1081,3	1142,8	1279,4	1363,7	1336,0	1368,5	1310,2	1215,4
Skåne	824,3	1278,7	1335,4	1338,1	1395,0	925,9	1413,2	1450,0	1488,3	1504,0	1297,7
Halland	1592,4	1548,5	1570,1	1630,6	1730,2	1623,0	1627,2	1579,6	1642,1	1704,2	1625,2
Västra Götaland	1549,9	1518,9	1483,8	1491,9	1530,9	1648,7	1576,4	1535,0	1549,5	1528,9	1541,5
Värmland	1151,1	1324,9	1240,7	1362,6	1294,1	1263,2	1366,0	1295,5	1506,9	1408,6	1321,4
Örebro	1516,6	1464,9	1424,0	1370,9	1358,9	1582,3	1554,7	1474,2	1490,4	1558,0	1480,3
Västmanland	1070,0	1102,8	1103,7	1082,6	1161,2	1273,5	1276,3	1286,4	1265,9	1265,4	1189,1
Dalarna	1711,3	1652,7	1665,5	1642,5	1643,0	1709,8	1719,3	1767,5	1695,8	1694,8	1690,4
Gävleborg	1369,8	1556,2	1576,8	1799,7	1657,8	1490,3	1800,7	2025,0	1761,6	1874,7	1691,1
Västernorrland	1827,7	1801,3	1706,6	1779,6	1689,1	2014,5	1895,1	1895,6	1859,7	1782,2	1826,0
Jämtland	1967,4	1925,7	1980,6	1868,7	1924,0	1951,6	2040,7	1988,0	2021,6	1891,6	1956,1
Västerbotten	1832,7	1774,9	1783,7	1737,7	1591,4	1887,8	1856,1	1864,9	1828,4	1749,5	1791,0
Norrbottn	1664,4	1313,9	1506,7	1642,2	1517,3	1753,6	1396,9	1537,7	1626,9	1600,1	1555,8

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
V01	Män	21	38	16	32	52	29	67	36	291
	Kvinnor	6	27	8	15	49	48	120	86	359
V02	Män	1	20	15	8	12	4	1	2	63
	Kvinnor		8	10	6	15	8	9	3	59
V03	Män	14	75	42	65	50	32	54	9	341
	Kvinnor	11	66	42	50	62	47	80	24	382
V04	Män	2	8	15	10	10	4	4	1	54
	Kvinnor		7	8	10	13	8	8	3	57
V05	Män		2	5	14	3	1	1	1	27
	Kvinnor		1	1	7	9	1	1	2	22
V06	Män	2	5	1	2	8	3	3	4	28
	Kvinnor	1	3	2	2	8	3	2	9	30
V08	Män									
	Kvinnor					1				1
V09	Män	69	255	284	391	331	156	172	59	1717
	Kvinnor	46	186	181	229	268	213	256	115	1494
V10	Män	9	35	14	42	61	18	9	8	196
	Kvinnor	8	25	20	34	43	26	34	8	198
V11	Män	10	104	50	62	92	23	25	9	375
	Kvinnor	3	71	51	81	108	51	22	4	391
V12	Män	1	20	12	16	22	12	6	3	92
	Kvinnor	1	14	9	14	18	3	5	1	65
V13	Män	6	200	120	173	187	89	91	20	886
	Kvinnor	2	95	103	127	194	58	53	8	640
V14	Män		16	9	16	14	5	7	3	70
	Kvinnor	1	8	3	9	14	4	10	1	50
V15	Män		1		2	3	1	1		8
	Kvinnor		1			1				2
V16	Män		9	1	8	8	6	1	1	34
	Kvinnor		3	2	5	5	2	1	1	19
V17	Män	16	81	38	66	72	16	18	2	309
	Kvinnor	4	41	15	34	32	12	10	1	149
V18	Män	165	1636	478	912	1022	335	372	100	5020
	Kvinnor	77	827	307	546	830	420	398	51	3456
V19	Män	117	1128	542	865	936	263	270	69	4190
	Kvinnor	72	553	409	518	631	215	183	44	2625

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
V20	Män	1	20	68	82	52	7	1	1	232
	Kvinnor	1	4	13	13	8				39
V21	Män		7	22	14	5		1	1	50
	Kvinnor			6	4	4	1			15
V22	Män	1	52	151	94	39	9	1		347
	Kvinnor	1	5	22	13	5	2			48
V23	Män	2	84	494	302	138	26	18	5	1069
	Kvinnor		17	93	51	18		1		180
V24	Män		7	34	21	10	3	3	1	79
	Kvinnor			3	3	4				10
V25	Män		3	4	2	2				11
	Kvinnor		1			4		1		6
V26	Män		4	20	28	11	2			65
	Kvinnor		1	1	2	2				6
V27	Män	2	50	175	147	36	10	5		425
	Kvinnor		11	19	17	9		1		57
V28	Män	12	475	1135	1215	479	51	35	11	3413
	Kvinnor	5	75	183	129	80	9	3		484
V29	Män	3	300	864	873	363	51	19	5	2478
	Kvinnor	1	51	147	126	50	6	5	1	387
V30	Män		2	3	7	1		2		15
	Kvinnor			2	1	1	1			5
V31	Män	1	3	4	8	9	3			28
	Kvinnor		1				1			2
V32	Män		1	3	3	1				8
	Kvinnor									
V33	Män				1	1				2
	Kvinnor			1	2	1				4
V34	Män			3	4	4	1	1	1	14
	Kvinnor		2			2				4
V35	Män			2		2		1		5
	Kvinnor			1		2				3
V36	Män				1		1	1		3
	Kvinnor									
V37	Män			1	2					3
	Kvinnor									
V38	Män		2	2	4	3	2	2		15
	Kvinnor			1		1				2
V39	Män		1	4	10	8	3	2	2	30
	Kvinnor		1		1	4	2			8

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
V40	Män	8	35	192	303	181	41	25	9	794
	Kvinnor	3	22	108	153	133	47	29	4	499
V41	Män	1	6	6	2	3	2			20
	Kvinnor		1	5	7	7	1	3		24
V42	Män		11	21	41	21	3	4		101
	Kvinnor		1	12	19	13	5	3	1	54
V43	Män	27	96	494	861	575	184	201	37	2475
	Kvinnor	23	79	348	765	603	193	149	15	2175
V44	Män	6	13	85	167	119	41	35	8	474
	Kvinnor	1	13	45	122	80	20	28	1	310
V45	Män	2	4	7	14	12	6	4	4	53
	Kvinnor		5	3	13	9	4	3	1	38
V46	Män	1	13	64	97	69	21	18	6	289
	Kvinnor	4	11	36	69	40	23	12		195
V47	Män	10	30	521	524	272	73	75	15	1520
	Kvinnor	5	17	197	209	162	61	40	5	696
V48	Män	20	107	1232	1330	596	166	129	32	3612
	Kvinnor	22	60	528	606	411	115	95	13	1850
V49	Män	60	215	1729	2181	1166	395	397	94	6237
	Kvinnor	56	245	838	1299	919	367	303	42	4069
V50	Män	1		9	13	4	1		1	29
	Kvinnor		3	2	5	2				12
V51	Män		7	7	5					19
	Kvinnor				1			1		2
V52	Män		2	5	4	4				15
	Kvinnor		1	1						2
V53	Män				13	3	1			17
	Kvinnor				2				1	3
V54	Män			3	7	5				15
	Kvinnor		1		1	4				6
V55	Män	2			2	4	2	1		11
	Kvinnor	1		2	7	2			1	13
V56	Män		1							1
	Kvinnor							1		1
V57	Män			3	1	9				13
	Kvinnor		2	2	1	2				7
V58	Män		2	13	9	10	1			35
	Kvinnor	1	1	5	2	1	1	6	1	18
V59	Män		4	21	24	17	1		1	68
	Kvinnor	1	1	7	7	6		3		25

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
 Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
V60	Män		1	5	9	4	1	2		22
	Kvinnor		1	4	3					8
V61	Män					2				2
	Kvinnor		3	2	3					8
V62	Män			4	7	4	1		1	17
	Kvinnor			1	4	5			1	11
V63	Män			5	14	11	1			31
	Kvinnor			2	2		3			7
V64	Män	1	4	9	36	28	9	2	1	90
	Kvinnor		2	3	5	1		2		13
V65	Män									
	Kvinnor							1		1
V66	Män			4	8	2	1			15
	Kvinnor			1				1		2
V67	Män		1	7	8	18				34
	Kvinnor		1							1
V68	Män		2	52	86	57	6	3		206
	Kvinnor	3		3	3	3				12
V69	Män			34	49	55	7			145
	Kvinnor			2	7	7				16
V70	Män			3	3	5			1	12
	Kvinnor		2	3	4	6	1	2	1	19
V71	Män			2	1	5		2		10
	Kvinnor			1	1	1			1	4
V72	Män		1	3						4
	Kvinnor					1				1
V73	Män	1	1	4	3	2	2		1	14
	Kvinnor		2	1	7	3	1			14
V74	Män		8	5	9	7		1		30
	Kvinnor		7	4	3	4		1	1	20
V75	Män					1				1
	Kvinnor		1	1	1					3
V76	Män				3	6	2			11
	Kvinnor						1			1
V77	Män	1		5	10	11	4			31
	Kvinnor		1	1	7	8	2	2		21
V78	Män		4	7	14	14	6	5	2	52
	Kvinnor	1	6	20	18	23	18	26	15	127
V79	Män	2	17	21	22	32	12	7	7	120
	Kvinnor		10	23	43	35	23	43	18	195

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
V80	Män	13	64	38	160	199	38	13	2	527
	Kvinnor	24	1690	1312	1386	427	8	3		4850
V81	Män	2	6	11	22	29	5	3	1	79
	Kvinnor		3	4	13	14	8	22	4	68
V82	Män			6	4	6	1	1		18
	Kvinnor			1	2		3	12	1	19
V83	Män		1	19	33	34	1	3	1	92
	Kvinnor			2	7	4	2	2		17
V84	Män	1	17	24	32	78	38	26	5	221
	Kvinnor	4	4	11	2	5	1	1		28
V85	Män	1	25	30	43	41	2	6		148
	Kvinnor	1	6	9	10	9	3	1	2	41
V86	Män	6	53	228	314	137	34	11		783
	Kvinnor	2	19	51	68	40	4	2		186
V87	Män		7	15	15	9	3	7	1	57
	Kvinnor	1	3	6	6	12	3	3		34
V88	Män	5	14	12	13	11	9	3	1	68
	Kvinnor	3	2	8	5	4	1	1	1	25
V89	Män	18	89	166	186	134	36	40	8	677
	Kvinnor	10	44	62	72	71	21	32	5	317
V90	Män		2	9	8	12	3	2		36
	Kvinnor		1		2	6			1	10
V91	Män	3	14	45	73	35	10	3	2	185
	Kvinnor	3	3	13	29	19	7	8	3	85
V92	Män	14	5	6	93	498	413	388	142	1559
	Kvinnor	18	6	6	67	310	276	334	200	1217
V93	Män	153	3	6	11	10	3		1	187
	Kvinnor	118	1	32	134	5	2	1	2	295
V94	Män	1	1	12	20	11	6	3	1	55
	Kvinnor			2	7	18	7	2	1	37
V95	Män	3	6		15	29	11	13	2	79
	Kvinnor	3	4	168	607	16	5	10	2	815
V96	Män			10	40	25				75
	Kvinnor			4	10	4				18
V97	Män			21	50	16				87
	Kvinnor			13	13	7				33
V98	Män	2	19	6	19	10	2	1		59
	Kvinnor	3	8	5	9	5	3	3	2	38
V99	Män	8	10	23	48	25	5	4	2	125
	Kvinnor	5	14	11	17	13	7	8	4	79

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
 Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
W00	Män	65	739	500	1214	1956	1091	1150	388	7103
	Kvinnor	61	469	302	1075	2655	1810	1989	782	9143
W01	Män	1458	4709	3625	7624	11320	8779	17138	12255	66908
	Kvinnor	1003	2872	2037	4559	12888	16505	43751	42752	126369
W02	Män	93	3186	1682	1026	604	108	50	13	6762
	Kvinnor	48	1031	518	578	471	96	53	23	2818
W03	Män	100	1022	963	857	240	74	86	47	3389
	Kvinnor	55	399	361	216	177	151	284	176	1819
W04	Män	205	63	18	20	18	6	19	15	364
	Kvinnor	169	58	34	18	26	24	55	48	432
W05	Män	8	26	12	47	146	154	271	167	831
	Kvinnor	9	11	8	37	142	211	454	511	1383
W06	Män	408	172	12	50	140	214	602	494	2092
	Kvinnor	404	155	23	40	128	269	1087	1400	3506
W07	Män	427	106	29	66	176	176	320	209	1509
	Kvinnor	416	98	14	105	316	414	905	739	3007
W08	Män	614	195	18	43	63	57	66	36	1092
	Kvinnor	501	163	22	35	93	124	162	134	1234
W09	Män	540	1992	110	113	65	30	41	21	2912
	Kvinnor	402	1443	41	70	67	35	71	48	2177
W10	Män	631	353	320	979	1756	1004	1264	530	6837
	Kvinnor	474	292	263	806	1845	1415	2427	1120	8642
W11	Män	41	126	73	770	1965	836	413	80	4304
	Kvinnor	28	65	24	145	386	269	247	65	1229
W12	Män	12	76	71	366	576	87	23	1	1212
	Kvinnor	11	20	10	15	25	6	5	2	94
W13	Män	119	443	380	764	876	268	129	28	3007
	Kvinnor	63	177	144	155	125	40	36	12	752
W14	Män	102	1209	44	64	173	115	60	16	1783
	Kvinnor	42	433	3	11	33	13	16	4	555
W15	Män	10	100	34	72	57	12	8	4	297
	Kvinnor	6	28	8	23	17	10	4	1	97
W16	Män	7	114	114	163	61	10	3	1	473
	Kvinnor	6	46	27	29	15	4	1		128
W17	Män	384	855	258	607	816	220	178	62	3380
	Kvinnor	309	560	176	230	271	121	179	129	1975
W18	Män	193	472	247	485	879	739	1324	832	5171
	Kvinnor	130	293	184	331	677	808	2248	2134	6805
W19	Män	1418	3588	2382	4526	5895	3256	4949	3169	29183
	Kvinnor	1084	2308	1327	2330	4295	4239	10458	9637	35678

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
W20	Män	83	199	177	475	507	160	64	12	1677
	Kvinnor	59	110	62	104	63	21	26	14	459
W21	Män	11	475	458	339	93	7	8	1	1392
	Kvinnor	11	200	134	76	31	6	4	1	463
W22	Män	302	729	611	944	764	227	175	65	3817
	Kvinnor	173	382	183	252	234	106	251	162	1743
W23	Män	254	354	334	808	851	150	84	23	2858
	Kvinnor	216	195	74	175	149	53	77	44	983
W24	Män	1	9	24	96	57	16	7		210
	Kvinnor	1	6	1	5	4	2	1		20
W25	Män	82	306	737	746	270	50	22	9	2222
	Kvinnor	71	129	173	247	152	27	15	2	816
W26	Män	32	246	580	1061	538	67	33	8	2565
	Kvinnor	28	58	135	313	180	19	11	5	749
W27	Män	14	51	77	228	260	81	30	6	747
	Kvinnor	7	23	10	28	31	13	5	3	120
W28	Män	8	53	83	97	118	37	22	8	426
	Kvinnor	3	12	17	13	31	9	6		91
W29	Män	23	89	252	707	870	337	163	15	2456
	Kvinnor	15	30	29	66	78	28	10	2	258
W30	Män	4	15	27	75	109	33	21	1	285
	Kvinnor	4	6	6	10	16	7		2	51
W31	Män	74	188	347	953	1041	264	89	18	2974
	Kvinnor	56	75	55	130	127	39	42	23	547
W32	Män		8	32	58	28	4	3	2	135
	Kvinnor		2	1	4	3		1		11
W33	Män		6	14	30	19	4	3		76
	Kvinnor		1		2	2		1		6
W34	Män	1	37	43	72	38	4	4		199
	Kvinnor		3	11	7	3				24
W35	Män				3					3
	Kvinnor		1			1				2
W36	Män		1		9	10	4		1	25
	Kvinnor									
W37	Män		1	3	9	17	1			31
	Kvinnor									
W38	Män		1	5	20	19	4			49
	Kvinnor	1	1		1	4	1			8
W39	Män	4	59	41	53	28	3	2	1	191
	Kvinnor	4	8	8	6	2				28

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
W40	Män	2	19	29	56	39	9	5	1	160
	Kvinnor		3	5	13	15	3	2		41
W41	Män	1		16	61	30	4	1		113
	Kvinnor		1		3	1	1	1		7
W42	Män			1	2	5	2			10
	Kvinnor		1	2	2		1		1	7
W43	Män	4	4	24	41	35	9	8	1	126
	Kvinnor	1	6	16	37	26	8	14	2	110
W44	Män	511	419	230	668	890	385	415	204	3722
	Kvinnor	444	247	106	312	486	281	427	331	2634
W45	Män	60	160	94	252	226	44	24	9	869
	Kvinnor	39	76	15	58	43	17	19	5	272
W46	Män									
	Kvinnor						1			1
W47	Män				1					1
	Kvinnor									
W48	Män									
	Kvinnor				1					1
W49	Män	16	49	154	263	166	56	64	17	785
	Kvinnor	10	24	55	109	103	46	38	29	414
W50	Män	20	288	1265	1178	404	44	23	5	3227
	Kvinnor	11	78	170	206	130	25	26	19	665
W51	Män	29	389	753	500	61	6	6	1	1745
	Kvinnor	17	154	153	58	28	4	8	9	431
W52	Män	16	124	245	249	108	8	13	2	765
	Kvinnor	12	41	50	52	49	15	20	11	250
W53	Män				4	1				5
	Kvinnor			1	2					3
W54	Män	72	76	34	91	143	39	22	5	482
	Kvinnor	95	117	36	110	140	52	38	17	605
W55	Män	36	43	37	210	324	88	69	9	816
	Kvinnor	35	249	248	360	265	72	72	15	1316
W56	Män			2	3	4	1	1		11
	Kvinnor		1	3	2	2		1		9
W57	Män	21	19	6	27	32	14	3		122
	Kvinnor	12	13	2	23	26	12	4	5	97
W58	Män	2	2	4	9	4		1		22
	Kvinnor		1	2	1			1		5
W59	Män	18	26	23	86	95	32	10	2	292
	Kvinnor	8	71	68	96	84	31	19	8	385

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
W60	Män	4	5	2	7	8	3			29
	Kvinnor	1	1	8	5	2	1	9	1	28
W64	Män	109	183	280	539	495	155	85	17	1863
	Kvinnor	77	132	115	167	144	57	66	38	796
W65	Män	14	3	3	1	2	1			24
	Kvinnor	7	2							9
W66	Män		2		1	3		1		7
	Kvinnor									
W67	Män	21	25	11	10	5	2			74
	Kvinnor	5	9	2	3			2		21
W68	Män	6	6	5	4	4	1	1		27
	Kvinnor	3		1		1				5
W69	Män	7	10	12	15	31	5	4	3	87
	Kvinnor	6	9	8	7	8	6	2	2	48
W70	Män	7	3	4	10	19	8	7		58
	Kvinnor	2	1	2	5	2	2		1	15
W73	Män	7	1	3	1		1			13
	Kvinnor	1				1	1			3
W74	Män	19	11	12	19	26	13	4		104
	Kvinnor	11	4	7	5	6	2	6	1	42
W75	Män	2	1				4			7
	Kvinnor	1				1				2
W76	Män	3	9	2	1	1			1	17
	Kvinnor	1	4		2					7
W77	Män	1			2					3
	Kvinnor							1		1
W78	Män	8	2	1	4	6	8	6	2	37
	Kvinnor	5	1	1		4	1	4	2	18
W79	Män	133	39	14	47	100	64	88	36	521
	Kvinnor	64	21	15	45	74	49	90	79	437

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
W80	Män	103	78	12	39	46	20	26	10	334
	Kvinnor	82	94	63	70	51	25	25	25	435
W81	Män	2		2	5	5	2	2		18
	Kvinnor	1		1	2		2	1	1	8
W83	Män	5		2	5	3	1	2		18
	Kvinnor	2	2	4	3	3	2	3		19
W84	Män	10	10	6	7	3	7	6	4	53
	Kvinnor	13	5	3	5	4	6	5	5	46
W85	Män	5	5	16	35	23	1			85
	Kvinnor	2		1	4	3		1		11
W86	Män	30	34	72	174	75	6	5		396
	Kvinnor	15	12	18	44	26	5	4		124
W87	Män	40	28	60	180	82	6	9	1	406
	Kvinnor	18	21	15	48	23	1	3		129
W88	Män		2		2	7	5	6		22
	Kvinnor			2	5	7	3	6	1	24
W89	Män	5	9	14	28	23	4	5	4	92
	Kvinnor	1	6	9	6	5	3	3	1	34
W90	Män			3	4	3	2	1		13
	Kvinnor		1		2	1	1	2		7
W91	Män	1	1	9	5	10	1	3	3	33
	Kvinnor		5	6		4	6	10	7	38
W92	Män	1	1	5	12	15	10	18	6	68
	Kvinnor	2	2	4	3	4	3	7	11	36
W93	Män	1		2	4	6	4		4	21
	Kvinnor	1						1		2
W94	Män			22	34	5				61
	Kvinnor	1	1	3	7	2				14
W98	Män					1				1
	Kvinnor									
W99	Män	7	16	20	51	45	22	23	9	193
	Kvinnor	6	10	19	26	32	24	31	27	175

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
X00	Män	20	55	147	248	182	49	54	18	773
	Kvinnor	20	34	88	101	107	38	42	35	465
X01	Män	4	9	10	24	11	13	4	1	76
	Kvinnor		4	1	10	3	2	6	6	32
X02	Män	7	9	21	30	25	7	11	5	115
	Kvinnor	15	7	14	11	21	2	12	4	86
X03	Män	5	19	27	27	26	6	2		112
	Kvinnor	5	10	3	8	5		3		34
X04	Män	5	55	93	182	97	27	14	3	476
	Kvinnor	4	14	11	18	15	6	3		71
X05	Män	1	4		3	3	1	3	2	17
	Kvinnor	1	2		2	5	2	8	6	26
X06	Män	1	15	5	29	36	16	14	6	122
	Kvinnor	7	4	3	7	26	13	15	5	80
X08	Män	7	12	29	81	63	14	13	5	224
	Kvinnor	5	8	23	34	34	10	14	7	135
X09	Män	11	20	73	184	150	38	31	14	521
	Kvinnor	11	12	33	67	77	24	34	20	278
X10	Män	306	62	24	43	40	8	19	1	503
	Kvinnor	233	50	28	37	34	19	26	11	438
X11	Män	29	9	5	25	18	10	7	4	107
	Kvinnor	22	11	9	10	10	3	12	8	85
X12	Män	301	59	44	99	68	12	11	8	602
	Kvinnor	188	54	25	58	31	22	24	16	418
X13	Män	3	5	5	18	13	2		1	47
	Kvinnor		4	1	6	2				13
X14	Män		4	3	18	7	4	1		37
	Kvinnor		2	2	4	3	1			12
X15	Män	75	5	5	12	11	7	3	8	126
	Kvinnor	36	5	3	3	10	10	17	10	94
X16	Män	15	4	3	20	27	9	14	6	98
	Kvinnor	14	3	4	7	6	4	12	4	54
X17	Män	2	7	7	15	8		1	2	42
	Kvinnor	1	2	1	7		1			12
X18	Män	3	2	9	20	21		2	1	58
	Kvinnor	2	1	3	1		1	5	3	16
X19	Män	53	11	24	73	38	9	11	5	224
	Kvinnor	21	7	8	19	17	12	13	5	102

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
X20	Män	89	165	48	87	58	16	11	3	477
	Kvinnor	59	105	20	47	67	33	15	2	348
X21	Män				2					2
	Kvinnor					1	1			2
X22	Män		1	1	1	1		1		5
	Kvinnor	1								1
X23	Män	37	105	49	212	232	68	38	5	746
	Kvinnor	16	47	36	120	194	52	33	10	508
X24	Män				1	1				2
	Kvinnor						1		1	2
X25	Män	1	3		2	2	3	1		12
	Kvinnor	2		1		4	1			8
X26	Män		2		4	7				13
	Kvinnor		1							1
X27	Män	2	2	1	4	8		1		18
	Kvinnor	1			4	4	4		2	15
X28	Män	2	4	3	2	5				16
	Kvinnor	7	1	1	1	4	2		1	17
X29	Män	57	45	18	31	37	7	8	2	205
	Kvinnor	39	26	13	25	26	19	6	1	155
X30	Män			3	1	12	8	16	6	46
	Kvinnor	1	1	3	1	9	8	11	8	42
X31	Män		7	26	57	90	33	50	29	292
	Kvinnor		1	4	7	27	9	35	26	109
X32	Män	2	3	1	2	2		1		11
	Kvinnor	1		3	3	2	1	1	1	12
X33	Män		2	10	32	14		2		60
	Kvinnor		6	8	16	9	1	1		41
X34	Män		1					1		2
	Kvinnor				1					1
X36	Män			2	2	2				6
	Kvinnor				1					1
X37	Män				1	1				2
	Kvinnor							1	1	2
X38	Män						1			1
	Kvinnor									
X39	Män	1		1	3	5	3	1		14
	Kvinnor	1		3	1	1	1	1	1	9

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
X40	Män	72	14	32	81	81	27	27	17	351
	Kvinnor	49	20	67	79	65	21	34	42	377
X41	Män	66	10	33	59	85	36	32	19	340
	Kvinnor	50	25	35	87	96	56	99	28	476
X42	Män	12	4	42	49	19	6	6	6	144
	Kvinnor	7	3	33	22	15	10	14	10	114
X43	Män	46	2	8	7	7	14	12	7	103
	Kvinnor	23	4	7	8	8	12	18	19	99
X44	Män	359	75	138	188	190	113	223	109	1395
	Kvinnor	260	68	171	201	183	158	337	265	1644
X45	Män	15	55	144	80	71	18	3	1	387
	Kvinnor	9	37	136	45	25	7	3	3	265
X46	Män	306	17	21	27	18	4	3	2	398
	Kvinnor	153	9	13	9	5	2	1	4	196
X47	Män	8	134	85	113	67	16	8	4	435
	Kvinnor	8	30	45	30	20	6	11	9	159
X48	Män	7	5	3	4	4	2	1		26
	Kvinnor	3	1	1	3	2	1		1	12
X49	Män	372	117	139	318	219	50	40	35	1290
	Kvinnor	243	80	102	144	99	39	55	38	800
X50	Män	4	58	396	1104	654	172	209	64	2661
	Kvinnor	6	46	189	376	348	279	468	229	1941
X51	Män		1	2	5	1		1		10
	Kvinnor					3	4	2		9
X52	Män				1					1
	Kvinnor						1		1	2
X53	Män	1	1		2	2	2	4		12
	Kvinnor	1		2		1	1	3		8
X54	Män	1	1	1	7		1	5	2	18
	Kvinnor			1	2		2	2		7
X56	Män									
	Kvinnor						1			1
X57	Män	3	3	8	30	47	27	21	13	152
	Kvinnor	2	3	8	13	28	16	46	25	141
X58	Män	202	206	216	437	309	71	65	18	1524
	Kvinnor	119	139	186	256	200	69	79	35	1083
X59	Män	112	162	230	436	483	223	199	92	1937
	Kvinnor	87	122	161	335	396	233	341	208	1883

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
X60	Män	4	18	283	549	310	44	32	12	1252
	Kvinnor	2	240	1524	1061	502	78	65	23	3495
X61	Män	1	20	422	1183	753	161	110	44	2694
	Kvinnor		116	1185	2309	1496	265	246	98	5715
X62	Män		6	119	189	63	6	5		388
	Kvinnor		8	113	127	56	9	5	2	320
X63	Män		3	26	44	29	2	7	1	112
	Kvinnor	1	10	77	93	51	5	8	1	246
X64	Män	5	77	769	1881	1081	217	148	54	4232
	Kvinnor	3	312	2425	3400	1911	285	274	88	8698
X65	Män	1	71	258	256	291	36	13	1	927
	Kvinnor		86	230	214	131	13	1	3	678
X66	Män	1	8	12	17	19	6		1	64
	Kvinnor		5	17	25	11	2			60
X67	Män		1	16	69	54	9	4	1	154
	Kvinnor		1	4	12	13	1		1	32
X68	Män				7	4		1		12
	Kvinnor			2	4	3				9
X69	Män	1	5	32	68	41	8	4	1	160
	Kvinnor		9	76	76	35	4	2	3	205
X70	Män		8	40	147	96	25	20	8	344
	Kvinnor		5	37	78	35	7	7	1	170
X71	Män		1	7	19	16	8	6	1	58
	Kvinnor		4	15	21	21	9	6	1	77
X72	Män			5	9	7	2	2	2	27
	Kvinnor			1					1	2
X73	Män			9	13	20	9	4		55
	Kvinnor				1		1			2
X74	Män				5	5	2			12
	Kvinnor			2	2					4
X75	Män			1	1	3				5
	Kvinnor									
X76	Män		1	6	29	15	2	1		54
	Kvinnor		1	2	13	15		4		35
X77	Män			1	1					2
	Kvinnor		1		3	2				6
X78	Män	2	14	173	383	208	46	57	25	908
	Kvinnor	3	24	345	355	143	26	31	13	940
X79	Män	2		6	8	15			1	32
	Kvinnor	1	2	6	6	1			2	18

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
X80	Män			43	92	46	8	9	5	203
	Kvinnor		11	61	76	34	12	7		201
X81	Män			7	25	12	1		1	46
	Kvinnor		3	11	9	11	2	1		37
X82	Män			10	26	9	3			48
	Kvinnor			5	12	7	1		1	26
X83	Män			6	17	11	2	2	2	40
	Kvinnor		3	7	12	6	1	1	1	31
X84	Män	1	2	86	227	154	25	20	4	519
	Kvinnor		10	235	361	242	31	33	15	927
X85	Män	1	1	6	4	2				14
	Kvinnor			5	2	2	1	1		11
X86	Män		1		5	4	2			12
	Kvinnor				4					4
X87	Män			1	2	1				4
	Kvinnor			1		2	1			4
X88	Män			2	2	1				5
	Kvinnor			1	2	3		2	1	9
X89	Män			3	1					4
	Kvinnor				3		1	1		5
X90	Män			1	6		1			8
	Kvinnor			1		1			2	4
X91	Män		4	3	4	5	1			17
	Kvinnor			4	6	1			1	12
X92	Män				2	1				3
	Kvinnor	1	1							2
X93	Män		1	16	35	11	1	1		65
	Kvinnor			1	6	3				10
X94	Män		1	5	9	4		1		20
	Kvinnor		1	2	4	3		2		12
X95	Män			6	15	6	1	1		29
	Kvinnor		1			4				5
X96	Män		1		4	1				6
	Kvinnor					1				1
X97	Män	1		1	6	2	1			11
	Kvinnor					2				2
X98	Män			1	1					2
	Kvinnor				1	1				2
X99	Män		4	362	535	194	15	8	1	1119
	Kvinnor	1	9	21	94	42	4	6	2	179

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
Y00	Män	2	13	229	303	146	24	6	4	727
	Kvinnor	1	4	16	41	35	5	2	4	108
Y01	Män	2		7	5	3			2	19
	Kvinnor	1	2	4	9	3	1	2		22
Y02	Män		2	7	2	4				15
	Kvinnor				1	1			1	3
Y03	Män				5	1				6
	Kvinnor	1			3	1		1	1	7
Y04	Män	3	105	1241	1204	523	41	21	2	3140
	Kvinnor	3	23	175	254	151	21	16	9	652
Y05	Män	2	11	5	4	3				25
	Kvinnor	12	60	89	78	17	2			258
Y06	Män	1	1	2	3	3	1	1		12
	Kvinnor	1	6		2	1	2	1		13
Y07	Män	35	98	1091	1237	565	66	26	9	3127
	Kvinnor	20	44	267	553	336	39	35	11	1305
Y08	Män			6	9	4	1			20
	Kvinnor			2	3	2	1	2		10
Y09	Män	1	5	80	102	48	7	3		246
	Kvinnor	3	2	11	17	22	4	4	1	64
Y10	Män	6	1	24	42	33	7	6	1	120
	Kvinnor	12	21	79	64	34	11	16	9	246
Y11	Män	9	2	47	113	93	16	15	2	297
	Kvinnor	7	13	66	128	99	22	26	17	378
Y12	Män			51	64	16	2	1		134
	Kvinnor	1		27	30	7	1	4	1	71
Y13	Män	7		3	3	9	1		2	25
	Kvinnor	1	3	13	5	2	3	3	1	31
Y14	Män	32	17	114	158	96	27	37	17	498
	Kvinnor	19	24	133	208	148	40	59	31	662
Y15	Män		19	66	56	75	13	4		233
	Kvinnor	1	25	38	31	18	3	1	3	120
Y16	Män	22	4	2	6	5	1			40
	Kvinnor	16		7	3	1	2	1		30
Y17	Män		1	5	10	7	1			24
	Kvinnor	1	1	4	3	5		2	1	17
Y18	Män	1	1	1			1			4
	Kvinnor			1	1			2		4
Y19	Män	16	6	6	11	11	3	1	10	64
	Kvinnor	6	3	12	8	10	4	7	3	53

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
Y20	Män		1	1	3	2		2		9
	Kvinnor		1	2	1		1			5
Y21	Män	5		1	2	1	1	2		12
	Kvinnor	3				1				4
Y22	Män	1		4	13	2				20
	Kvinnor									
Y23	Män			4	4	4		2		14
	Kvinnor									
Y24	Män		2	1	5	1				9
	Kvinnor									
Y25	Män		2	2		1	1			6
	Kvinnor		1		2			1		4
Y26	Män	2	3	5	10	15	5	2	1	43
	Kvinnor		1	3	5	5		3	1	18
Y27	Män	3	1		3	2	1		2	12
	Kvinnor				1	2		2		5
Y28	Män	4	7	30	56	25	3	6	1	132
	Kvinnor	3	4	11	12	9	3	3	1	46
Y29	Män	3	14	18	26	24	5	3	2	95
	Kvinnor	2	4	4	5	3	4	2	5	29
Y30	Män	2	2	6	7	5	2	3	6	33
	Kvinnor	4	3	3	8	6	7	1	5	37
Y31	Män			1	4	4		3	2	14
	Kvinnor		1	2	2	2	1	6	4	18
Y32	Män		2	9	7	7	2	1	1	29
	Kvinnor			1	8	3	2	1	1	16
Y33	Män	13	11	23	47	20	14	19	9	156
	Kvinnor	13	12	20	24	20	9	15	7	120
Y34	Män	16	24	59	123	164	52	56	27	521
	Kvinnor	18	16	34	58	92	51	97	59	425
Y35	Män			7	15	6	1			29
	Kvinnor			1	1	4		1		7
Y36	Män		1	4	27	2	1	2		37
	Kvinnor			3	1	2				6

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
Y40	Män	22	31	39	92	116	100	114	39	553
	Kvinnor	21	24	64	183	166	120	193	123	894
Y41	Män	2	4	2	9	15	15	21	8	76
	Kvinnor	3	2	5	21	22	19	23	18	113
Y42	Män	4	14	10	12	33	27	32	10	142
	Kvinnor	4	14	20	40	49	38	65	35	265
Y43	Män	5	14	20	43	93	45	31	5	256
	Kvinnor	9	7	10	56	140	76	30	10	338
Y44	Män	1	6	9	29	133	178	193	48	597
	Kvinnor	5	5	12	36	90	142	273	100	663
Y45	Män	6	9	15	80	100	62	78	28	378
	Kvinnor	3	11	60	101	121	101	133	64	594
Y46	Män		4	12	23	61	48	41	10	199
	Kvinnor	4	10	13	32	53	39	54	19	224
Y47	Män	2	3	17	20	33	20	18	6	119
	Kvinnor	2	4	15	46	35	18	35	25	180
Y48	Män	3	5	1	5	7	9	4	1	35
	Kvinnor		3	6	20	13	5	6	2	55
Y49	Män	3	2	8	41	41	32	38	11	176
	Kvinnor	1	2	16	62	73	53	68	35	310
Y50	Män		3	2	6	5	3	6	3	28
	Kvinnor	2	1	3	2	4	4	16	12	44
Y51	Män	1	2	3	5	28	25	45	11	120
	Kvinnor	2	3	2	3	15	34	72	26	157
Y52	Män	1	1		7	83	126	291	158	667
	Kvinnor	1		3	10	56	137	497	437	1141
Y53	Män	1	2	2	3	12	8	8	2	38
	Kvinnor	1	1	8	6	17	10	12	3	58
Y54	Män	1			3	15	18	30	15	82
	Kvinnor				4	18	24	74	52	172
Y55	Män	6		2	1	3	6	7	4	29
	Kvinnor	1	4	4	9	6	16	13	7	60
Y56	Män	1	1	3	8	2	5	11	2	33
	Kvinnor	2	1	5	11	7	4	8	7	45
Y57	Män	33	50	133	449	930	879	1325	530	4329
	Kvinnor	40	58	272	821	1120	1080	2168	1310	6869
Y58	Män	11	2	3	2	4	3	1	1	27
	Kvinnor	14	1		3	5	5	5	2	35
Y59	Män	24	16		3	9	10	9	2	73
	Kvinnor	9	9	13	15	10	14	11	5	86

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
Y60	Män	36	63	83	259	591	535	596	178	2341
	Kvinnor	29	43	189	1900	2245	1005	1152	555	7118
Y61	Män	4	1	4	12	17	23	27	5	93
	Kvinnor	2	3	2	12	26	13	18	6	82
Y62	Män	18	19	8	43	80	59	39	7	273
	Kvinnor	6	6	18	29	49	32	32	18	190
Y63	Män	2	3	3	9	15	18	35	9	94
	Kvinnor	1	1	2	9	16	14	32	15	90
Y64	Män			5	5	4	2	4		20
	Kvinnor		1	4	13	5	3	3	5	34
Y65	Män	22	17	13	47	144	108	130	41	522
	Kvinnor	11	6	8	73	134	94	162	62	550
Y66	Män			1	4	3	1	1		10
	Kvinnor			1	7	5	4	4		21
Y69	Män	21	10	22	51	102	90	112	23	431
	Kvinnor	19	11	11	71	99	72	90	32	405
Y70	Män		1	1	4	14	7	6	2	35
	Kvinnor			1	8	16	9	9	3	46
Y71	Män	2	1	2	17	68	59	33	9	191
	Kvinnor		2	3	12	39	33	45	14	148
Y72	Män		1	2	2	8	4	3	2	22
	Kvinnor	1	2	4	2	1	2		1	13
Y73	Män	4	1	3	21	63	74	148	52	366
	Kvinnor	3	2	2	9	41	27	44	19	147
Y74	Män	2	1	3	4	11	8	6	2	37
	Kvinnor	2	1	1	6	11	5	7	3	36
Y75	Män	9	7		8	7	4	2		37
	Kvinnor	1	8	5	6	7	3			30
Y76	Män	2		1						3
	Kvinnor			19	157	53	16	5	3	253
Y77	Män		1			2	3	1	1	8
	Kvinnor			1	1		2	3	6	13
Y78	Män				9	31	15	20	1	76
	Kvinnor	1	1	2	8	32	24	25	5	98
Y79	Män		9	27	106	190	154	171	63	720
	Kvinnor		5	23	76	250	254	477	251	1336

Tabell 13. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
 Number of patients with external cause of injury and death by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
Y80	Män				6	4	5	6		21
	Kvinnor			3	2	8	4	6	2	25
Y81	Män	2	1		8	29	20	18	3	81
	Kvinnor	1		6	14	17	13	14	9	74
Y82	Män	5	3	6	17	37	20	21	5	114
	Kvinnor	5	1	13	33	34	21	30	11	148
Y83	Män	323	640	1038	2908	7182	6005	5415	1116	24627
	Kvinnor	209	516	882	3854	7150	4823	5834	2188	25456
Y84	Män	28	38	51	155	556	552	669	284	2333
	Kvinnor	23	45	38	218	420	284	320	120	1468
Y85	Män	8	7	59	199	108	19	15	4	419
	Kvinnor		4	24	84	66	16	14	3	211
Y86	Män	7	68	359	874	702	264	351	150	2775
	Kvinnor	7	38	220	420	632	549	1031	669	3566
Y87	Män	1	3	13	31	14	4	4	5	75
	Kvinnor	1	3	10	27	8	1	8	1	59
Y88	Män	38	113	273	748	1801	1930	2218	610	7731
	Kvinnor	26	100	203	648	1864	2170	3338	1568	9917
Y89	Män	1	3	72	168	99	61	64	16	484
	Kvinnor	7	7	54	114	111	48	75	52	468
Y90	Män		50	110	36	51	8	1	1	257
	Kvinnor		57	123	20	30	6	1		237
Y91	Män		22	62	54	71	14	5	1	229
	Kvinnor		24	55	37	25	9	2		152
Y95	Män	2	6	21	75	130	99	103	28	464
	Kvinnor			9	26	108	77	114	68	402
Y96	Män			1	3	3		3		10
	Kvinnor				1	4	1	2	1	9
Y97	Män	1		6	6	8		3	1	25
	Kvinnor		2	3	9	6	5	4	1	30
Y98	Män	2		3	11	18	8	1	4	47
	Kvinnor		2	1	3	9	5	6	2	28

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
V01	Män	1,8	1,3	0,6	0,5	0,9	1,7	5,6	11,4	1,3
	Kvinnor	0,5	1,0	0,3	0,3	0,9	2,4	7,0	12,2	1,6
V02	Män	0,1	0,7	0,6	0,1	0,2	0,2	0,1	0,6	0,3
	Kvinnor	0,0	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3
V03	Män	1,2	2,5	1,6	1,0	0,9	1,8	4,5	2,9	1,6
	Kvinnor	1,0	2,3	1,7	0,8	1,1	2,4	4,7	3,4	1,7
V04	Män	0,2	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
	Kvinnor	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,4	0,3
V05	Män	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1
V06	Män	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	1,3	0,1
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	1,3	0,1
V08	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V09	Män	5,8	8,5	10,7	6,3	5,8	9,0	14,3	18,7	7,8
	Kvinnor	4,0	6,6	7,2	3,8	4,8	10,7	14,9	16,3	6,7
V10	Män	0,8	1,2	0,5	0,7	1,1	1,0	0,7	2,5	0,9
	Kvinnor	0,7	0,9	0,8	0,6	0,8	1,3	2,0	1,1	0,9
V11	Män	0,8	3,5	1,9	1,0	1,6	1,3	2,1	2,9	1,7
	Kvinnor	0,3	2,5	2,0	1,4	1,9	2,6	1,3	0,6	1,7
V12	Män	0,1	0,7	0,5	0,3	0,4	0,7	0,5	1,0	0,4
	Kvinnor	0,1	0,5	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3
V13	Män	0,5	6,7	4,5	2,8	3,3	5,1	7,6	6,3	4,0
	Kvinnor	0,2	3,4	4,1	2,1	3,5	2,9	3,1	1,1	2,8
V14	Män	0,0	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,6	1,0	0,3
	Kvinnor	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,6	0,1	0,2
V15	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V16	Män	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
V17	Män	1,3	2,7	1,4	1,1	1,3	0,9	1,5	0,6	1,4
	Kvinnor	0,4	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,1	0,7
V18	Män	13,8	54,8	18,1	14,7	18,0	19,3	30,9	31,7	22,8
	Kvinnor	6,8	29,2	12,2	9,2	14,8	21,1	23,2	7,2	15,4
V19	Män	9,8	37,8	20,5	13,9	16,4	15,1	22,4	21,9	19,1
	Kvinnor	6,3	19,5	16,2	8,7	11,3	10,8	10,7	6,2	11,7

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
V20	Män	0,1	0,7	2,6	1,3	0,9	0,4	0,1	0,3	1,1
	Kvinnor	0,1	0,1	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
V21	Män	0,0	0,2	0,8	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
V22	Män	0,1	1,7	5,7	1,5	0,7	0,5	0,1	0,0	1,6
	Kvinnor	0,1	0,2	0,9	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
V23	Män	0,2	2,8	18,7	4,9	2,4	1,5	1,5	1,6	4,9
	Kvinnor	0,0	0,6	3,7	0,9	0,3	0,0	0,1	0,0	0,8
V24	Män	0,0	0,2	1,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
V25	Män	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
V26	Män	0,0	0,1	0,8	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V27	Män	0,2	1,7	6,6	2,4	0,6	0,6	0,4	0,0	1,9
	Kvinnor	0,0	0,4	0,8	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3
V28	Män	1,0	15,9	42,9	19,6	8,4	2,9	2,9	3,5	15,5
	Kvinnor	0,4	2,6	7,2	2,2	1,4	0,5	0,2	0,0	2,2
V29	Män	0,3	10,1	32,7	14,1	6,4	2,9	1,6	1,6	11,3
	Kvinnor	0,1	1,8	5,8	2,1	0,9	0,3	0,3	0,1	1,7
V30	Män	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
V31	Män	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
V32	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V33	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V34	Män	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
	Kvinnor	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V35	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V36	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V37	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V38	Män	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V39	Män	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,6	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
V40	Män	0,7	1,2	7,3	4,9	3,2	2,4	2,1	2,9	3,6
	Kvinnor	0,3	0,8	4,3	2,6	2,4	2,4	1,7	0,6	2,2
V41	Män	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1
V42	Män	0,0	0,4	0,8	0,7	0,4	0,2	0,3	0,0	0,5
	Kvinnor	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2
V43	Män	2,3	3,2	18,7	13,9	10,1	10,6	16,7	11,7	11,3
	Kvinnor	2,0	2,8	13,8	12,8	10,8	9,7	8,7	2,1	9,7
V44	Män	0,5	0,4	3,2	2,7	2,1	2,4	2,9	2,5	2,2
	Kvinnor	0,1	0,5	1,8	2,0	1,4	1,0	1,6	0,1	1,4
V45	Män	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	1,3	0,2
	Kvinnor	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
V46	Män	0,1	0,4	2,4	1,6	1,2	1,2	1,5	1,9	1,3
	Kvinnor	0,4	0,4	1,4	1,2	0,7	1,2	0,7	0,0	0,9
V47	Män	0,8	1,0	19,7	8,4	4,8	4,2	6,2	4,8	6,9
	Kvinnor	0,4	0,6	7,8	3,5	2,9	3,1	2,3	0,7	3,1
V48	Män	1,7	3,6	46,6	21,4	10,5	9,6	10,7	10,1	16,4
	Kvinnor	1,9	2,1	20,9	10,2	7,3	5,8	5,5	1,8	8,2
V49	Män	5,0	7,2	65,4	35,1	20,5	22,7	33,0	29,8	28,4
	Kvinnor	4,9	8,7	33,2	21,8	16,4	18,5	17,7	5,9	18,1
V50	Män	0,1	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
V51	Män	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
V52	Män	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V53	Män	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
V54	Män	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
V55	Män	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
V56	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
V57	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V58	Män	0,0	0,1	0,5	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2
	Kvinnor	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1
V59	Män	0,0	0,1	0,8	0,4	0,3	0,1	0,0	0,3	0,3
	Kvinnor	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
V60	Män	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V61	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V62	Män	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
V63	Män	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
V64	Män	0,1	0,1	0,3	0,6	0,5	0,5	0,2	0,3	0,4
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
V65	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
V66	Män	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
V67	Män	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V68	Män	0,0	0,1	2,0	1,4	1,0	0,3	0,2	0,0	0,9
	Kvinnor	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
V69	Män	0,0	0,0	1,3	0,8	1,0	0,4	0,0	0,0	0,7
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
V70	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
V71	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
V72	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V73	Män	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1
	Kvinnor	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
V74	Män	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
V75	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V76	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
V77	Män	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
V78	Män	0,0	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,2
	Kvinnor	0,1	0,2	0,8	0,3	0,4	0,9	1,5	2,1	0,6
V79	Män	0,2	0,6	0,8	0,4	0,6	0,7	0,6	2,2	0,5
	Kvinnor	0,0	0,4	0,9	0,7	0,6	1,2	2,5	2,5	0,9

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
V80	Män	1,1	2,1	1,4	2,6	3,5	2,2	1,1	0,6	2,4
	Kvinnor	2,1	59,7	51,9	23,3	7,6	0,4	0,2	0,0	21,6
V81	Män	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,4
	Kvinnor	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	1,3	0,6	0,3
V82	Män	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,1	0,1
V83	Män	0,0	0,0	0,7	0,5	0,6	0,1	0,2	0,3	0,4
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
V84	Män	0,1	0,6	0,9	0,5	1,4	2,2	2,2	1,6	1,0
	Kvinnor	0,4	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
V85	Män	0,1	0,8	1,1	0,7	0,7	0,1	0,5	0,0	0,7
	Kvinnor	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2
V86	Män	0,5	1,8	8,6	5,1	2,4	2,0	0,9	0,0	3,6
	Kvinnor	0,2	0,7	2,0	1,1	0,7	0,2	0,1	0,0	0,8
V87	Män	0,0	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,6	0,3	0,3
	Kvinnor	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
V88	Män	0,4	0,5	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,3
	Kvinnor	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
V89	Män	1,5	3,0	6,3	3,0	2,4	2,1	3,3	2,5	3,1
	Kvinnor	0,9	1,6	2,5	1,2	1,3	1,1	1,9	0,7	1,4
V90	Män	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
V91	Män	0,3	0,5	1,7	1,2	0,6	0,6	0,2	0,6	0,8
	Kvinnor	0,3	0,1	0,5	0,5	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4
V92	Män	1,2	0,2	0,2	1,5	8,8	23,8	32,2	45,0	7,1
	Kvinnor	1,6	0,2	0,2	1,1	5,5	13,9	19,5	28,3	5,4
V93	Män	12,8	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,9
	Kvinnor	10,4	0,0	1,3	2,2	0,1	0,1	0,1	0,3	1,3
V94	Män	0,1	0,0	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2
V95	Män	0,3	0,2	0,0	0,2	0,5	0,6	1,1	0,6	0,4
	Kvinnor	0,3	0,1	6,7	10,2	0,3	0,3	0,6	0,3	3,6
V96	Män	0,0	0,0	0,4	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
V97	Män	0,0	0,0	0,8	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	Kvinnor	0,0	0,0	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
V98	Män	0,2	0,6	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3
	Kvinnor	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2
V99	Män	0,7	0,3	0,9	0,8	0,4	0,3	0,3	0,6	0,6
	Kvinnor	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,4

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
W00	Män	5,4	24,8	18,9	19,6	34,4	62,8	95,5	123,1	32,3
	Kvinnor	5,4	16,6	12,0	18,0	47,4	91,1	115,9	110,6	40,7
W01	Män	121,6	157,8	137,0	122,8	198,9	505,3	1423,4	3887,1	304,3
	Kvinnor	88,2	101,4	80,6	76,5	230,1	830,4	2550,4	6045,8	562,5
W02	Män	7,8	106,8	63,6	16,5	10,6	6,2	4,2	4,1	30,8
	Kvinnor	4,2	36,4	20,5	9,7	8,4	4,8	3,1	3,3	12,5
W03	Män	8,3	34,3	36,4	13,8	4,2	4,3	7,1	14,9	15,4
	Kvinnor	4,8	14,1	14,3	3,6	3,2	7,6	16,6	24,9	8,1
W04	Män	17,1	2,1	0,7	0,3	0,3	0,3	1,6	4,8	1,7
	Kvinnor	14,9	2,0	1,3	0,3	0,5	1,2	3,2	6,8	1,9
W05	Män	0,7	0,9	0,5	0,8	2,6	8,9	22,5	53,0	3,8
	Kvinnor	0,8	0,4	0,3	0,6	2,5	10,6	26,5	72,3	6,2
W06	Män	34,0	5,8	0,5	0,8	2,5	12,3	50,0	156,7	9,5
	Kvinnor	35,5	5,5	0,9	0,7	2,3	13,5	63,4	198,0	15,6
W07	Män	35,6	3,6	1,1	1,1	3,1	10,1	26,6	66,3	6,9
	Kvinnor	36,6	3,5	0,6	1,8	5,6	20,8	52,8	104,5	13,4
W08	Män	51,2	6,5	0,7	0,7	1,1	3,3	5,5	11,4	5,0
	Kvinnor	44,1	5,8	0,9	0,6	1,7	6,2	9,4	18,9	5,5
W09	Män	45,0	66,8	4,2	1,8	1,1	1,7	3,4	6,7	13,2
	Kvinnor	35,4	51,0	1,6	1,2	1,2	1,8	4,1	6,8	9,7
W10	Män	52,6	11,8	12,1	15,8	30,9	57,8	105,0	168,1	31,1
	Kvinnor	41,7	10,3	10,4	13,5	32,9	71,2	141,5	158,4	38,5
W11	Män	3,4	4,2	2,8	12,4	34,5	48,1	34,3	25,4	19,6
	Kvinnor	2,5	2,3	1,0	2,4	6,9	13,5	14,4	9,2	5,5
W12	Män	1,0	2,5	2,7	5,9	10,1	5,0	1,9	0,3	5,5
	Kvinnor	1,0	0,7	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
W13	Män	9,9	14,8	14,4	12,3	15,4	15,4	10,7	8,9	13,7
	Kvinnor	5,5	6,3	5,7	2,6	2,2	2,0	2,1	1,7	3,3
W14	Män	8,5	40,5	1,7	1,0	3,0	6,6	5,0	5,1	8,1
	Kvinnor	3,7	15,3	0,1	0,2	0,6	0,7	0,9	0,6	2,5
W15	Män	0,8	3,4	1,3	1,2	1,0	0,7	0,7	1,3	1,4
	Kvinnor	0,5	1,0	0,3	0,4	0,3	0,5	0,2	0,1	0,4
W16	Män	0,6	3,8	4,3	2,6	1,1	0,6	0,2	0,3	2,2
	Kvinnor	0,5	1,6	1,1	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,6
W17	Män	32,0	28,7	9,8	9,8	14,3	12,7	14,8	19,7	15,4
	Kvinnor	27,2	19,8	7,0	3,9	4,8	6,1	10,4	18,2	8,8
W18	Män	16,1	15,8	9,3	7,8	15,4	42,5	110,0	263,9	23,5
	Kvinnor	11,4	10,3	7,3	5,6	12,1	40,7	131,0	301,8	30,3
W19	Män	118,3	120,3	90,0	72,9	103,6	187,4	411,0	1005,2	132,7
	Kvinnor	95,3	81,5	52,5	39,1	76,7	213,3	609,6	1362,8	158,8

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
W20	Män	6,9	6,7	6,7	7,7	8,9	9,2	5,3	3,8	7,6
	Kvinnor	5,2	3,9	2,5	1,7	1,1	1,1	1,5	2,0	2,0
W21	Män	0,9	15,9	17,3	5,5	1,6	0,4	0,7	0,3	6,3
	Kvinnor	1,0	7,1	5,3	1,3	0,6	0,3	0,2	0,1	2,1
W22	Män	25,2	24,4	23,1	15,2	13,4	13,1	14,5	20,6	17,4
	Kvinnor	15,2	13,5	7,2	4,2	4,2	5,3	14,6	22,9	7,8
W23	Män	21,2	11,9	12,6	13,0	15,0	8,6	7,0	7,3	13,0
	Kvinnor	19,0	6,9	2,9	2,9	2,7	2,7	4,5	6,2	4,4
W24	Män	0,1	0,3	0,9	1,5	1,0	0,9	0,6	0,0	1,0
	Kvinnor	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
W25	Män	6,8	10,3	27,9	12,0	4,7	2,9	1,8	2,9	10,1
	Kvinnor	6,2	4,6	6,8	4,1	2,7	1,4	0,9	0,3	3,6
W26	Män	2,7	8,2	21,9	17,1	9,5	3,9	2,7	2,5	11,7
	Kvinnor	2,5	2,0	5,3	5,3	3,2	1,0	0,6	0,7	3,3
W27	Män	1,2	1,7	2,9	3,7	4,6	4,7	2,5	1,9	3,4
	Kvinnor	0,6	0,8	0,4	0,5	0,6	0,7	0,3	0,4	0,5
W28	Män	0,7	1,8	3,1	1,6	2,1	2,1	1,8	2,5	1,9
	Kvinnor	0,3	0,4	0,7	0,2	0,6	0,5	0,3	0,0	0,4
W29	Män	1,9	3,0	9,5	11,4	15,3	19,4	13,5	4,8	11,2
	Kvinnor	1,3	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	0,6	0,3	1,1
W30	Män	0,3	0,5	1,0	1,2	1,9	1,9	1,7	0,3	1,3
	Kvinnor	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,0	0,3	0,2
W31	Män	6,2	6,3	13,1	15,3	18,3	15,2	7,4	5,7	13,5
	Kvinnor	4,9	2,6	2,2	2,2	2,3	2,0	2,4	3,3	2,4
W32	Män	0,0	0,3	1,2	0,9	0,5	0,2	0,2	0,6	0,6
	Kvinnor	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
W33	Män	0,0	0,2	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,0	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
W34	Män	0,1	1,2	1,6	1,2	0,7	0,2	0,3	0,0	0,9
	Kvinnor	0,0	0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
W35	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W36	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,3	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W37	Män	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W38	Män	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2
	Kvinnor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
W39	Män	0,3	2,0	1,5	0,9	0,5	0,2	0,2	0,3	0,9
	Kvinnor	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
W40	Män	0,2	0,6	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,7
	Kvinnor	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2
W41	Män	0,1	0,0	0,6	1,0	0,5	0,2	0,1	0,0	0,5
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
W42	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
W43	Män	0,3	0,1	0,9	0,7	0,6	0,5	0,7	0,3	0,6
	Kvinnor	0,1	0,2	0,6	0,6	0,5	0,4	0,8	0,3	0,5
W44	Män	42,6	14,0	8,7	10,8	15,6	22,2	34,5	64,7	16,9
	Kvinnor	39,0	8,7	4,2	5,2	8,7	14,1	24,9	46,8	11,7
W45	Män	5,0	5,4	3,6	4,1	4,0	2,5	2,0	2,9	4,0
	Kvinnor	3,4	2,7	0,6	1,0	0,8	0,9	1,1	0,7	1,2
W46	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
W47	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W48	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W49	Män	1,3	1,6	5,8	4,2	2,9	3,2	5,3	5,4	3,6
	Kvinnor	0,9	0,8	2,2	1,8	1,8	2,3	2,2	4,1	1,8
W50	Män	1,7	9,7	47,8	19,0	7,1	2,5	1,9	1,6	14,7
	Kvinnor	1,0	2,8	6,7	3,5	2,3	1,3	1,5	2,7	3,0
W51	Män	2,4	13,0	28,5	8,1	1,1	0,3	0,5	0,3	7,9
	Kvinnor	1,5	5,4	6,1	1,0	0,5	0,2	0,5	1,3	1,9
W52	Män	1,3	4,2	9,3	4,0	1,9	0,5	1,1	0,6	3,5
	Kvinnor	1,1	1,4	2,0	0,9	0,9	0,8	1,2	1,6	1,1
W53	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W54	Män	6,0	2,5	1,3	1,5	2,5	2,2	1,8	1,6	2,2
	Kvinnor	8,4	4,1	1,4	1,8	2,5	2,6	2,2	2,4	2,7
W55	Män	3,0	1,4	1,4	3,4	5,7	5,1	5,7	2,9	3,7
	Kvinnor	3,1	8,8	9,8	6,0	4,7	3,6	4,2	2,1	5,9
W56	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
W57	Män	1,8	0,6	0,2	0,4	0,6	0,8	0,2	0,0	0,6
	Kvinnor	1,1	0,5	0,1	0,4	0,5	0,6	0,2	0,7	0,4
W58	Män	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
W59	Män	1,5	0,9	0,9	1,4	1,7	1,8	0,8	0,6	1,3
	Kvinnor	0,7	2,5	2,7	1,6	1,5	1,6	1,1	1,1	1,7

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
W60	Män	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,5	0,1	0,1
W64	Män	9,1	6,1	10,6	8,7	8,7	8,9	7,1	5,4	8,5
	Kvinnor	6,8	4,7	4,6	2,8	2,6	2,9	3,8	5,4	3,5
W65	Män	1,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W66	Män	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W67	Män	1,8	0,8	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3
	Kvinnor	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
W68	Män	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W69	Män	0,6	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3	0,3	1,0	0,4
	Kvinnor	0,5	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2
W70	Män	0,6	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,0	0,3
	Kvinnor	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
W73	Män	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
W74	Män	1,6	0,4	0,5	0,3	0,5	0,7	0,3	0,0	0,5
	Kvinnor	1,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2
W75	Män	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W76	Män	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
	Kvinnor	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W77	Män	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
W78	Män	0,7	0,1	0,0	0,1	0,1	0,5	0,5	0,6	0,2
	Kvinnor	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1
W79	Män	11,1	1,3	0,5	0,8	1,8	3,7	7,3	11,4	2,4
	Kvinnor	5,6	0,7	0,6	0,8	1,3	2,5	5,2	11,2	1,9

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
W80	Män	8,6	2,6	0,5	0,6	0,8	1,2	2,2	3,2	1,5
	Kvinnor	7,2	3,3	2,5	1,2	0,9	1,3	1,5	3,5	1,9
W81	Män	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1
	Kvinnor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
W83	Män	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1
	Kvinnor	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1
W84	Män	0,8	0,3	0,2	0,1	0,1	0,4	0,5	1,3	0,2
	Kvinnor	1,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,7	0,2
W85	Män	0,4	0,2	0,6	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4
	Kvinnor	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
W86	Män	2,5	1,1	2,7	2,8	1,3	0,3	0,4	0,0	1,8
	Kvinnor	1,3	0,4	0,7	0,7	0,5	0,3	0,2	0,0	0,6
W87	Män	3,3	0,9	2,3	2,9	1,4	0,3	0,7	0,3	1,8
	Kvinnor	1,6	0,7	0,6	0,8	0,4	0,1	0,2	0,0	0,6
W88	Män	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1
W89	Män	0,4	0,3	0,5	0,5	0,4	0,2	0,4	1,3	0,4
	Kvinnor	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
W90	Män	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
W91	Män	0,1	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	1,0	0,2
	Kvinnor	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,3	0,6	1,0	0,2
W92	Män	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,6	1,5	1,9	0,3
	Kvinnor	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	1,6	0,2
W93	Män	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	1,3	0,1
	Kvinnor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
W94	Män	0,0	0,0	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3
	Kvinnor	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
W98	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W99	Män	0,6	0,5	0,8	0,8	0,8	1,3	1,9	2,9	0,9
	Kvinnor	0,5	0,4	0,8	0,4	0,6	1,2	1,8	3,8	0,8

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
X00	Män	1,7	1,8	5,6	4,0	3,2	2,8	4,5	5,7	3,5
	Kvinnor	1,8	1,2	3,5	1,7	1,9	1,9	2,4	4,9	2,1
X01	Män	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,7	0,3	0,3	0,3
	Kvinnor	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,3	0,8	0,1
X02	Män	0,6	0,3	0,8	0,5	0,4	0,4	0,9	1,6	0,5
	Kvinnor	1,3	0,2	0,6	0,2	0,4	0,1	0,7	0,6	0,4
X03	Män	0,4	0,6	1,0	0,4	0,5	0,3	0,2	0,0	0,5
	Kvinnor	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2
X04	Män	0,4	1,8	3,5	2,9	1,7	1,6	1,2	1,0	2,2
	Kvinnor	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,3
X05	Män	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	0,1
	Kvinnor	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	0,8	0,1
X06	Män	0,1	0,5	0,2	0,5	0,6	0,9	1,2	1,9	0,6
	Kvinnor	0,6	0,1	0,1	0,1	0,5	0,7	0,9	0,7	0,4
X08	Män	0,6	0,4	1,1	1,3	1,1	0,8	1,1	1,6	1,0
	Kvinnor	0,4	0,3	0,9	0,6	0,6	0,5	0,8	1,0	0,6
X09	Män	0,9	0,7	2,8	3,0	2,6	2,2	2,6	4,4	2,4
	Kvinnor	1,0	0,4	1,3	1,1	1,4	1,2	2,0	2,8	1,2
X10	Män	25,5	2,1	0,9	0,7	0,7	0,5	1,6	0,3	2,3
	Kvinnor	20,5	1,8	1,1	0,6	0,6	1,0	1,5	1,6	1,9
X11	Män	2,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,6	0,6	1,3	0,5
	Kvinnor	1,9	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,7	1,1	0,4
X12	Män	25,1	2,0	1,7	1,6	1,2	0,7	0,9	2,5	2,7
	Kvinnor	16,5	1,9	1,0	1,0	0,6	1,1	1,4	2,3	1,9
X13	Män	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,3	0,2
	Kvinnor	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
X14	Män	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,2
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
X15	Män	6,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	2,5	0,6
	Kvinnor	3,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	1,0	1,4	0,4
X16	Män	1,3	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5	1,2	1,9	0,4
	Kvinnor	1,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,7	0,6	0,2
X17	Män	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,6	0,2
	Kvinnor	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
X18	Män	0,3	0,1	0,3	0,3	0,4	0,0	0,2	0,3	0,3
	Kvinnor	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,1
X19	Män	4,4	0,4	0,9	1,2	0,7	0,5	0,9	1,6	1,0
	Kvinnor	1,8	0,2	0,3	0,3	0,3	0,6	0,8	0,7	0,5

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
X20	Män	7,4	5,5	1,8	1,4	1,0	0,9	0,9	1,0	2,2
	Kvinnor	5,2	3,7	0,8	0,8	1,2	1,7	0,9	0,3	1,5
X21	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
X22	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	Kvinnor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X23	Män	3,1	3,5	1,9	3,4	4,1	3,9	3,2	1,6	3,4
	Kvinnor	1,4	1,7	1,4	2,0	3,5	2,6	1,9	1,4	2,3
X24	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
X25	Män	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
X26	Män	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X27	Män	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1
X28	Män	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
X29	Män	4,8	1,5	0,7	0,5	0,7	0,4	0,7	0,6	0,9
	Kvinnor	3,4	0,9	0,5	0,4	0,5	1,0	0,3	0,1	0,7
X30	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,5	1,3	1,9	0,2
	Kvinnor	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,4	0,6	1,1	0,2
X31	Män	0,0	0,2	1,0	0,9	1,6	1,9	4,2	9,2	1,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,1	0,5	0,5	2,0	3,7	0,5
X32	Män	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
X33	Män	0,0	0,1	0,4	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3
	Kvinnor	0,0	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2
X34	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X36	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X37	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
X38	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X39	Män	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
X40	Män	6,0	0,5	1,2	1,3	1,4	1,6	2,2	5,4	1,6
	Kvinnor	4,3	0,7	2,7	1,3	1,2	1,1	2,0	5,9	1,7
X41	Män	5,5	0,3	1,2	1,0	1,5	2,1	2,7	6,0	1,5
	Kvinnor	4,4	0,9	1,4	1,5	1,7	2,8	5,8	4,0	2,1
X42	Män	1,0	0,1	1,6	0,8	0,3	0,3	0,5	1,9	0,7
	Kvinnor	0,6	0,1	1,3	0,4	0,3	0,5	0,8	1,4	0,5
X43	Män	3,8	0,1	0,3	0,1	0,1	0,8	1,0	2,2	0,5
	Kvinnor	2,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,6	1,0	2,7	0,4
X44	Män	29,9	2,5	5,2	3,0	3,3	6,5	18,5	34,6	6,3
	Kvinnor	22,9	2,4	6,8	3,4	3,3	7,9	19,6	37,5	7,3
X45	Män	1,3	1,8	5,4	1,3	1,2	1,0	0,2	0,3	1,8
	Kvinnor	0,8	1,3	5,4	0,8	0,4	0,4	0,2	0,4	1,2
X46	Män	25,5	0,6	0,8	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6	1,8
	Kvinnor	13,5	0,3	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6	0,9
X47	Män	0,7	4,5	3,2	1,8	1,2	0,9	0,7	1,3	2,0
	Kvinnor	0,7	1,1	1,8	0,5	0,4	0,3	0,6	1,3	0,7
X48	Män	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
X49	Män	31,0	3,9	5,3	5,1	3,8	2,9	3,3	11,1	5,9
	Kvinnor	21,4	2,8	4,0	2,4	1,8	2,0	3,2	5,4	3,6
X50	Män	0,3	1,9	15,0	17,8	11,5	9,9	17,4	20,3	12,1
	Kvinnor	0,5	1,6	7,5	6,3	6,2	14,0	27,3	32,4	8,6
X51	Män	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
X52	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
X53	Män	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1
	Kvinnor	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
X54	Män	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,4	0,6	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
X56	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
X57	Män	0,3	0,1	0,3	0,5	0,8	1,6	1,7	4,1	0,7
	Kvinnor	0,2	0,1	0,3	0,2	0,5	0,8	2,7	3,5	0,6
X58	Män	16,8	6,9	8,2	7,0	5,4	4,1	5,4	5,7	6,9
	Kvinnor	10,5	4,9	7,4	4,3	3,6	3,5	4,6	4,9	4,8
X59	Män	9,3	5,4	8,7	7,0	8,5	12,8	16,5	29,2	8,8
	Kvinnor	7,7	4,3	6,4	5,6	7,1	11,7	19,9	29,4	8,4

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
X60	Män	0,3	0,6	10,7	8,8	5,4	2,5	2,7	3,8	5,7
	Kvinnor	0,2	8,5	60,3	17,8	9,0	3,9	3,8	3,3	15,6
X61	Män	0,1	0,7	16,0	19,1	13,2	9,3	9,1	14,0	12,3
	Kvinnor	0,0	4,1	46,9	38,8	26,7	13,3	14,3	13,9	25,4
X62	Män	0,0	0,2	4,5	3,0	1,1	0,3	0,4	0,0	1,8
	Kvinnor	0,0	0,3	4,5	2,1	1,0	0,5	0,3	0,3	1,4
X63	Män	0,0	0,1	1,0	0,7	0,5	0,1	0,6	0,3	0,5
	Kvinnor	0,1	0,4	3,0	1,6	0,9	0,3	0,5	0,1	1,1
X64	Män	0,4	2,6	29,1	30,3	19,0	12,5	12,3	17,1	19,3
	Kvinnor	0,3	11,0	96,0	57,1	34,1	14,3	16,0	12,4	38,7
X65	Män	0,1	2,4	9,8	4,1	5,1	2,1	1,1	0,3	4,2
	Kvinnor	0,0	3,0	9,1	3,6	2,3	0,7	0,1	0,4	3,0
X66	Män	0,1	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
	Kvinnor	0,0	0,2	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3
X67	Män	0,0	0,0	0,6	1,1	0,9	0,5	0,3	0,3	0,7
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
X68	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
X69	Män	0,1	0,2	1,2	1,1	0,7	0,5	0,3	0,3	0,7
	Kvinnor	0,0	0,3	3,0	1,3	0,6	0,2	0,1	0,4	0,9
X70	Män	0,0	0,3	1,5	2,4	1,7	1,4	1,7	2,5	1,6
	Kvinnor	0,0	0,2	1,5	1,3	0,6	0,4	0,4	0,1	0,8
X71	Män	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,3	0,3
	Kvinnor	0,0	0,1	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	0,1	0,3
X72	Män	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
X73	Män	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4	0,5	0,3	0,0	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
X74	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X75	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X76	Män	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2
X77	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X78	Män	0,2	0,5	6,5	6,2	3,7	2,6	4,7	7,9	4,1
	Kvinnor	0,3	0,8	13,7	6,0	2,6	1,3	1,8	1,8	4,2
X79	Män	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1
	Kvinnor	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1

Tabell 14. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
X80	Män	0,0	0,0	1,6	1,5	0,8	0,5	0,7	1,6	0,9
	Kvinnor	0,0	0,4	2,4	1,3	0,6	0,6	0,4	0,0	0,9
X81	Män	0,0	0,0	0,3	0,4	0,2	0,1	0,0	0,3	0,2
	Kvinnor	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2
X82	Män	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
X83	Män	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,6	0,2
	Kvinnor	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
X84	Män	0,1	0,1	3,3	3,7	2,7	1,4	1,7	1,3	2,4
	Kvinnor	0,0	0,4	9,3	6,1	4,3	1,6	1,9	2,1	4,1
X85	Män	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
X86	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X87	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
X88	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
X89	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
X90	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
X91	Män	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
X92	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X93	Män	0,0	0,0	0,6	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
X94	Män	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
X95	Män	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
X96	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X97	Män	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X98	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X99	Män	0,0	0,1	13,7	8,6	3,4	0,9	0,7	0,3	5,1
	Kvinnor	0,1	0,3	0,8	1,6	0,7	0,2	0,3	0,3	0,8

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
Y00	Män	0,2	0,4	8,7	4,9	2,6	1,4	0,5	1,3	3,3
	Kvinnor	0,1	0,1	0,6	0,7	0,6	0,3	0,1	0,6	0,5
Y01	Män	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,6	0,1
	Kvinnor	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Y02	Män	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Y03	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Y04	Män	0,3	3,5	46,9	19,4	9,2	2,4	1,7	0,6	14,3
	Kvinnor	0,3	0,8	6,9	4,3	2,7	1,1	0,9	1,3	2,9
Y05	Män	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	1,1	2,1	3,5	1,3	0,3	0,1	0,0	0,0	1,1
Y06	Män	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
	Kvinnor	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Y07	Män	2,9	3,3	41,2	19,9	9,9	3,8	2,2	2,9	14,2
	Kvinnor	1,8	1,6	10,6	9,3	6,0	2,0	2,0	1,6	5,8
Y08	Män	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Y09	Män	0,1	0,2	3,0	1,6	0,8	0,4	0,2	0,0	1,1
	Kvinnor	0,3	0,1	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,3
Y10	Män	0,5	0,0	0,9	0,7	0,6	0,4	0,5	0,3	0,5
	Kvinnor	1,1	0,7	3,1	1,1	0,6	0,6	0,9	1,3	1,1
Y11	Män	0,8	0,1	1,8	1,8	1,6	0,9	1,2	0,6	1,4
	Kvinnor	0,6	0,5	2,6	2,1	1,8	1,1	1,5	2,4	1,7
Y12	Män	0,0	0,0	1,9	1,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,6
	Kvinnor	0,1	0,0	1,1	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3
Y13	Män	0,6	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,6	0,1
	Kvinnor	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
Y14	Män	2,7	0,6	4,3	2,5	1,7	1,6	3,1	5,4	2,3
	Kvinnor	1,7	0,8	5,3	3,5	2,6	2,0	3,4	4,4	2,9
Y15	Män	0,0	0,6	2,5	0,9	1,3	0,7	0,3	0,0	1,1
	Kvinnor	0,1	0,9	1,5	0,5	0,3	0,2	0,1	0,4	0,5
Y16	Män	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
	Kvinnor	1,4	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Y17	Män	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Y18	Män	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Y19	Män	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	3,2	0,3
	Kvinnor	0,5	0,1	0,5	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
Y20	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Y21	Män	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1
	Kvinnor	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Y22	Män	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Y23	Män	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Y24	Män	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Y25	Män	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Y26	Män	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1
Y27	Män	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Y28	Män	0,3	0,2	1,1	0,9	0,4	0,2	0,5	0,3	0,6
	Kvinnor	0,3	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Y29	Män	0,3	0,5	0,7	0,4	0,4	0,3	0,2	0,6	0,4
	Kvinnor	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,7	0,1
Y30	Män	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	1,9	0,2
	Kvinnor	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,7	0,2
Y31	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,6	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,1
Y32	Män	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Y33	Män	1,1	0,4	0,9	0,8	0,4	0,8	1,6	2,9	0,7
	Kvinnor	1,1	0,4	0,8	0,4	0,4	0,5	0,9	1,0	0,5
Y34	Män	1,3	0,8	2,2	2,0	2,9	3,0	4,7	8,6	2,4
	Kvinnor	1,6	0,6	1,3	1,0	1,6	2,6	5,7	8,3	1,9
Y35	Män	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Y36	Män	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
Y40	Män	1,8	1,0	1,5	1,5	2,0	5,8	9,5	12,4	2,5
	Kvinnor	1,8	0,8	2,5	3,1	3,0	6,0	11,3	17,4	4,0
Y41	Män	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,9	1,7	2,5	0,3
	Kvinnor	0,3	0,1	0,2	0,4	0,4	1,0	1,3	2,5	0,5
Y42	Män	0,3	0,5	0,4	0,2	0,6	1,6	2,7	3,2	0,6
	Kvinnor	0,4	0,5	0,8	0,7	0,9	1,9	3,8	4,9	1,2
Y43	Män	0,4	0,5	0,8	0,7	1,6	2,6	2,6	1,6	1,2
	Kvinnor	0,8	0,2	0,4	0,9	2,5	3,8	1,7	1,4	1,5
Y44	Män	0,1	0,2	0,3	0,5	2,3	10,2	16,0	15,2	2,7
	Kvinnor	0,4	0,2	0,5	0,6	1,6	7,1	15,9	14,1	3,0
Y45	Män	0,5	0,3	0,6	1,3	1,8	3,6	6,5	8,9	1,7
	Kvinnor	0,3	0,4	2,4	1,7	2,2	5,1	7,8	9,1	2,6
Y46	Män	0,0	0,1	0,5	0,4	1,1	2,8	3,4	3,2	0,9
	Kvinnor	0,4	0,4	0,5	0,5	0,9	2,0	3,1	2,7	1,0
Y47	Män	0,2	0,1	0,6	0,3	0,6	1,2	1,5	1,9	0,5
	Kvinnor	0,2	0,1	0,6	0,8	0,6	0,9	2,0	3,5	0,8
Y48	Män	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,5	0,3	0,3	0,2
	Kvinnor	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
Y49	Män	0,3	0,1	0,3	0,7	0,7	1,8	3,2	3,5	0,8
	Kvinnor	0,1	0,1	0,6	1,0	1,3	2,7	4,0	4,9	1,4
Y50	Män	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	1,0	0,1
	Kvinnor	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,9	1,7	0,2
Y51	Män	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	1,4	3,7	3,5	0,5
	Kvinnor	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	1,7	4,2	3,7	0,7
Y52	Män	0,1	0,0	0,0	0,1	1,5	7,3	24,2	50,1	3,0
	Kvinnor	0,1	0,0	0,1	0,2	1,0	6,9	29,0	61,8	5,1
Y53	Män	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,5	0,7	0,6	0,2
	Kvinnor	0,1	0,0	0,3	0,1	0,3	0,5	0,7	0,4	0,3
Y54	Män	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	2,5	4,8	0,4
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,2	4,3	7,4	0,8
Y55	Män	0,5	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,6	1,3	0,1
	Kvinnor	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,8	0,8	1,0	0,3
Y56	Män	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,9	0,6	0,2
	Kvinnor	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,5	1,0	0,2
Y57	Män	2,8	1,7	5,0	7,2	16,3	50,6	110,0	168,1	19,7
	Kvinnor	3,5	2,0	10,8	13,8	20,0	54,3	126,4	185,3	30,6
Y58	Män	0,9	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1
	Kvinnor	1,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2
Y59	Män	2,0	0,5	0,0	0,0	0,2	0,6	0,7	0,6	0,3
	Kvinnor	0,8	0,3	0,5	0,3	0,2	0,7	0,6	0,7	0,4

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
Y60	Män	3,0	2,1	3,1	4,2	10,4	30,8	49,5	56,5	10,6
	Kvinnor	2,6	1,5	7,5	31,9	40,1	50,6	67,2	78,5	31,7
Y61	Män	0,3	0,0	0,2	0,2	0,3	1,3	2,2	1,6	0,4
	Kvinnor	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,7	1,0	0,8	0,4
Y62	Män	1,5	0,6	0,3	0,7	1,4	3,4	3,2	2,2	1,2
	Kvinnor	0,5	0,2	0,7	0,5	0,9	1,6	1,9	2,5	0,8
Y63	Män	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	1,0	2,9	2,9	0,4
	Kvinnor	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,9	2,1	0,4
Y64	Män	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,7	0,2
Y65	Män	1,8	0,6	0,5	0,8	2,5	6,2	10,8	13,0	2,4
	Kvinnor	1,0	0,2	0,3	1,2	2,4	4,7	9,4	8,8	2,4
Y66	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1
Y69	Män	1,8	0,3	0,8	0,8	1,8	5,2	9,3	7,3	2,0
	Kvinnor	1,7	0,4	0,4	1,2	1,8	3,6	5,2	4,5	1,8
Y70	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,2
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,4	0,2
Y71	Män	0,2	0,0	0,1	0,3	1,2	3,4	2,7	2,9	0,9
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,2	0,7	1,7	2,6	2,0	0,7
Y72	Män	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,6	0,1
	Kvinnor	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Y73	Män	0,3	0,0	0,1	0,3	1,1	4,3	12,3	16,5	1,7
	Kvinnor	0,3	0,1	0,1	0,2	0,7	1,4	2,6	2,7	0,7
Y74	Män	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,5	0,6	0,2
	Kvinnor	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2
Y75	Män	0,8	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2
	Kvinnor	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
Y76	Män	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,8	2,6	0,9	0,8	0,3	0,4	1,1
Y77	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,8	0,1
Y78	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	1,7	0,3	0,3
	Kvinnor	0,1	0,0	0,1	0,1	0,6	1,2	1,5	0,7	0,4
Y79	Män	0,0	0,3	1,0	1,7	3,3	8,9	14,2	20,0	3,3
	Kvinnor	0,0	0,2	0,9	1,3	4,5	12,8	27,8	35,5	5,9

Tabell 14. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsakskod (tre-ställig nivå), kön och ålder, summerat för hela perioden
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by external cause, sex and age, summed for the whole period

Yttre orsak	Kön	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+	Totalt
Y80	Män	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,0	0,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1
Y81	Män	0,2	0,0	0,0	0,1	0,5	1,2	1,5	1,0	0,4
	Kvinnor	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,7	0,8	1,3	0,3
Y82	Män	0,4	0,1	0,2	0,3	0,7	1,2	1,7	1,6	0,5
	Kvinnor	0,4	0,0	0,5	0,6	0,6	1,1	1,7	1,6	0,7
Y83	Män	26,9	21,5	39,2	46,8	126,2	345,7	449,7	354,0	112,0
	Kvinnor	18,4	18,2	34,9	64,7	127,6	242,7	340,1	309,4	113,3
Y84	Män	2,3	1,3	1,9	2,5	9,8	31,8	55,6	90,1	10,6
	Kvinnor	2,0	1,6	1,5	3,7	7,5	14,3	18,7	17,0	6,5
Y85	Män	0,7	0,2	2,2	3,2	1,9	1,1	1,2	1,3	1,9
	Kvinnor	0,0	0,1	1,0	1,4	1,2	0,8	0,8	0,4	0,9
Y86	Män	0,6	2,3	13,6	14,1	12,3	15,2	29,2	47,6	12,6
	Kvinnor	0,6	1,3	8,7	7,1	11,3	27,6	60,1	94,6	15,9
Y87	Män	0,1	0,1	0,5	0,5	0,2	0,2	0,3	1,6	0,3
	Kvinnor	0,1	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,5	0,1	0,3
Y88	Män	3,2	3,8	10,3	12,0	31,6	111,1	184,2	193,5	35,2
	Kvinnor	2,3	3,5	8,0	10,9	33,3	109,2	194,6	221,7	44,1
Y89	Män	0,1	0,1	2,7	2,7	1,7	3,5	5,3	5,1	2,2
	Kvinnor	0,6	0,2	2,1	1,9	2,0	2,4	4,4	7,4	2,1
Y90	Män	0,0	1,7	4,2	0,6	0,9	0,5	0,1	0,3	1,2
	Kvinnor	0,0	2,0	4,9	0,3	0,5	0,3	0,1	0,0	1,1
Y91	Män	0,0	0,7	2,3	0,9	1,2	0,8	0,4	0,3	1,0
	Kvinnor	0,0	0,8	2,2	0,6	0,4	0,5	0,1	0,0	0,7
Y95	Män	0,2	0,2	0,8	1,2	2,3	5,7	8,6	8,9	2,1
	Kvinnor	0,0	0,0	0,4	0,4	1,9	3,9	6,6	9,6	1,8
Y96	Män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0
	Kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Y97	Män	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1
	Kvinnor	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1
Y98	Män	0,2	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,1	1,3	0,2
	Kvinnor	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik</i>							
Män	0-4	49,6	61,6	44,3	49,9	45,5	50,2
	5-14	144,7	176,4	175,5	181,1	192,5	174,0
	15-24	273,4	318,2	332,2	364,7	363,7	330,5
	25-44	148,7	176,5	181,0	176,1	193,2	175,1
	45-64	113,0	120,9	129,0	132,9	133,2	125,9
	65-74	108,9	127,1	119,7	125,5	116,5	119,5
	75-84	153,8	180,6	162,7	165,1	165,4	165,5
	85+	148,4	167,6	190,5	180,5	179,1	173,5
	Totalt	145,6	169,1	171,8	176,9	182,3	169,2
Kvinnor	0-4	32,1	39,9	33,2	28,4	35,1	33,8
	5-14	135,0	156,3	153,7	140,4	163,3	149,7
	15-24	170,6	196,9	197,0	222,3	213,6	200,1
	25-44	98,9	110,2	113,7	117,4	116,1	111,3
	45-64	82,0	92,2	98,0	96,2	95,6	92,9
	65-74	93,9	100,2	96,1	98,0	99,4	97,5
	75-84	109,2	117,9	100,6	107,2	113,2	109,6
	85+	67,1	67,2	70,4	59,2	71,9	67,2
	Totalt	103,2	116,1	116,2	118,0	120,7	114,9
Båda könen		124,2	142,3	143,7	147,2	151,2	141,7
<i>Andra transportolyckor</i>							
Män	0-4	12,3	12,1	12,8	31,2	22,3	18,0
	5-14	9,8	10,7	6,8	9,5	9,0	9,2
	15-24	21,5	25,8	25,7	23,6	25,0	24,3
	25-44	17,2	15,6	14,2	18,0	18,5	16,7
	45-64	35,8	13,1	13,0	16,6	22,4	20,1
	65-74	60,1	16,1	19,7	26,9	43,6	33,4
	75-84	33,1	26,7	35,2	53,3	65,3	42,8
	85+	16,5	30,6	47,6	62,2	110,2	54,2
	Totalt	25,4	16,2	16,3	21,1	25,1	20,8
Kvinnor	0-4	15,0	6,6	6,7	21,7	25,8	15,1
	5-14	3,2	3,3	4,9	5,1	3,9	4,1
	15-24	11,8	13,8	32,0	10,3	12,9	16,1
	25-44	17,7	14,5	37,5	9,2	12,0	18,2
	45-64	17,5	4,9	7,8	8,6	11,4	10,0
	65-74	27,8	9,0	11,1	20,9	21,2	18,0
	75-84	18,6	14,6	17,4	33,5	45,2	25,8
	85+	6,6	21,4	19,0	36,9	76,1	32,4
	Totalt	15,7	10,0	19,3	13,0	17,0	15,0
Båda könen		20,5	13,0	17,8	17,0	21,0	17,9

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Fallolyckor</i>							
Män	0-4	517,0	601,4	562,4	574,2	553,9	561,3
	5-14	656,0	635,4	622,7	647,4	665,2	645,2
	15-24	411,8	422,1	407,5	407,2	383,8	406,4
	25-44	325,1	324,9	308,9	306,5	294,4	312,0
	45-64	463,0	467,2	464,5	480,1	469,7	469,0
	65-74	925,4	946,5	937,7	956,3	948,2	942,8
	75-84	2212,8	2214,3	2183,8	2259,7	2255,2	2225,2
	85+	5441,9	5615,4	5344,9	5726,2	5699,1	5567,9
Kvinnor	Totalt	648,5	658,4	642,2	661,7	653,1	652,8
	0-4	458,9	475,7	462,9	430,6	439,3	453,7
	5-14	389,9	389,0	387,2	373,2	363,2	380,6
	15-24	224,5	231,4	210,1	217,4	201,5	216,9
	25-44	190,7	185,0	173,8	177,7	168,6	179,2
	45-64	438,0	438,6	410,5	438,3	431,0	431,2
	65-74	1333,1	1307,4	1256,2	1282,2	1275,9	1291,3
	75-84	3643,3	3636,2	3571,8	3696,5	3604,2	3630,4
Båda könen	85+	8252,4	8095,5	8142,5	8396,7	8250,5	8228,2
	Totalt	909,7	905,4	886,1	911,8	891,4	900,9
		780,6	783,3	765,5	788,1	773,4	778,2
<i>Exponering för icke levande mekaniska krafter</i>							
Män	0-4	108,8	125,6	127,7	132,3	123,3	123,4
	5-14	111,9	121,3	121,0	112,2	114,0	116,1
	15-24	170,3	177,4	167,0	159,0	152,6	165,2
	25-44	130,6	137,7	131,9	131,0	118,7	130,0
	45-64	120,9	124,8	126,6	121,5	118,4	122,4
	65-74	104,6	114,2	123,7	103,8	112,4	111,7
	75-84	86,8	107,6	98,9	102,8	118,7	103,0
	85+	94,0	125,7	136,6	136,9	147,0	128,5
Kvinnor	Totalt	124,2	132,6	130,6	125,8	122,2	127,1
	0-4	97,7	116,5	103,2	97,5	87,1	100,4
	5-14	55,6	55,4	56,4	59,6	54,3	56,3
	15-24	39,3	41,7	48,7	47,5	39,6	43,3
	25-44	33,8	35,2	34,7	33,5	29,1	33,3
	45-64	32,0	32,6	34,8	30,6	30,5	32,1
	65-74	35,6	30,7	42,0	32,8	33,6	35,0
	75-84	48,6	64,0	55,2	54,5	54,5	55,4
Båda könen	85+	97,7	96,5	88,7	80,9	81,6	89,0
	Totalt	43,4	45,7	46,4	43,8	40,7	44,0
		83,3	88,6	88,0	84,4	81,1	85,1

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Exponering för levande mekaniska krafter</i>							
Män	0-4	31,4	25,4	26,4	26,0	26,9	27,3
	5-14	37,7	39,1	36,1	36,8	43,8	38,7
	15-24	92,2	99,0	105,0	95,9	107,9	100,0
	25-44	43,6	48,0	47,0	47,1	47,1	46,5
	45-64	27,2	26,8	29,6	31,3	31,6	29,3
	65-74	20,8	26,8	20,6	21,1	20,7	22,0
	75-84	17,6	18,8	20,3	23,1	17,0	19,4
	85+	11,5	16,1	7,9	15,6	13,8	13,0
	Totalt	40,1	42,5	42,7	42,5	44,6	42,5
Kvinnor	0-4	22,5	25,4	22,4	23,0	24,5	23,6
	5-14	27,9	27,0	31,7	30,1	34,5	30,2
	15-24	34,1	33,9	31,8	35,2	34,3	33,9
	25-44	15,2	17,6	18,2	19,4	19,8	18,0
	45-64	14,0	15,0	16,3	15,6	16,6	15,5
	65-74	13,8	14,7	12,1	14,3	12,7	13,5
	75-84	16,0	15,7	13,4	17,2	15,0	15,4
	85+	16,0	15,0	19,7	18,8	17,3	17,4
	Totalt	19,0	19,9	20,3	21,1	21,6	20,4
Båda könen		29,4	31,1	31,4	31,7	33,0	31,3
<i>Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse</i>							
Män	0-4	5,6	10,0	5,1	5,5	7,6	6,8
	5-14	2,0	1,7	1,7	1,8	2,7	2,0
	15-24	2,3	1,5	1,7	1,1	2,6	1,9
	25-44	0,8	0,7	0,6	1,3	1,3	1,0
	45-64	1,5	2,3	1,4	1,5	1,1	1,6
	65-74	2,0	1,2	2,0	2,6	1,1	1,8
	75-84	1,3	1,7	1,2	2,1	0,8	1,4
	85+	0,0	1,6	1,6	0,0	1,5	1,0
	Totalt	1,7	2,0	1,5	1,7	1,9	1,8
Kvinnor	0-4	2,1	3,5	2,7	4,1	2,7	3,0
	5-14	1,1	0,5	0,7	1,2	0,9	0,9
	15-24	0,4	0,6	0,4	1,0	1,4	0,8
	25-44	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3
	45-64	0,3	0,7	0,1	0,4	0,2	0,3
	65-74	0,0	0,5	0,3	0,8	1,3	0,6
	75-84	0,3	0,6	1,5	0,3	0,3	0,6
	85+	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
	Totalt	0,5	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6
Båda könen		1,1	1,3	1,0	1,2	1,3	1,2

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse</i>							
Män	0-4	20,3	30,8	23,8	16,2	20,2	22,3
	5-14	6,9	4,0	5,2	3,9	3,6	4,7
	15-24	1,9	1,1	1,1	1,5	1,7	1,5
	25-44	1,6	1,7	1,8	2,3	1,6	1,8
	45-64	4,7	2,8	2,4	2,6	2,2	2,9
	65-74	6,0	7,2	4,1	7,5	6,0	6,2
	75-84	11,7	10,8	10,8	11,1	10,8	11,0
	85+	11,5	22,6	11,1	14,0	26,0	17,1
	Totalt	5,3	5,0	4,3	4,3	4,2	4,6
Kvinnor	0-4	19,2	14,5	10,8	14,4	15,6	14,9
	5-14	4,6	4,9	4,4	4,4	4,1	4,5
	15-24	5,1	3,6	2,6	2,4	3,5	3,4
	25-44	2,8	2,2	2,3	1,8	1,6	2,1
	45-64	3,0	2,7	1,5	3,0	2,0	2,4
	65-74	5,2	4,7	4,3	3,8	3,8	4,4
	75-84	7,9	7,3	7,0	7,9	7,9	7,6
	85+	16,0	17,9	14,1	15,3	15,9	15,8
	Totalt	5,2	4,6	3,7	4,2	4,1	4,3
Båda könen		5,2	4,8	4,0	4,2	4,1	4,5

Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen

Män	0-4	6,4	7,9	6,8	9,0	6,3	7,3
	5-14	3,5	2,3	2,8	4,0	2,9	3,1
	15-24	7,5	7,4	7,6	8,7	9,9	8,2
	25-44	9,4	8,8	7,6	8,1	8,6	8,5
	45-64	5,7	3,8	5,5	4,4	5,9	5,1
	65-74	4,3	2,3	4,1	2,6	4,3	3,5
	75-84	4,2	3,8	8,7	6,6	5,4	5,7
	85+	8,2	3,2	11,1	15,6	4,6	8,6
	Totalt	6,5	5,5	6,2	6,3	6,6	6,2
Kvinnor	0-4	5,0	3,9	4,5	3,6	3,1	4,0
	5-14	2,1	2,1	1,8	2,3	2,0	2,0
	15-24	3,0	3,0	2,6	3,0	3,7	3,0
	25-44	2,9	1,8	2,5	2,4	2,5	2,4
	45-64	1,8	2,4	2,1	1,4	1,7	1,9
	65-74	2,2	2,5	2,5	1,8	2,8	2,4
	75-84	3,5	4,4	4,1	3,8	4,1	4,0
	85+	8,7	6,4	4,2	7,0	6,9	6,6
	Totalt	2,8	2,6	2,6	2,5	2,7	2,6
Båda könen		4,7	4,1	4,4	4,4	4,6	4,4

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Exponering för rök och öppen eld</i>							
Män	0-4	4,0	3,7	4,3	6,4	5,9	4,8
	5-14	7,7	6,2	5,5	4,5	8,1	6,4
	15-24	24,9	15,8	12,8	11,5	11,2	15,2
	25-44	13,7	12,3	12,6	13,0	11,9	12,7
	45-64	10,0	11,2	9,0	9,8	10,5	10,1
	65-74	11,4	12,1	7,2	6,9	9,5	9,4
	75-84	15,1	15,0	10,8	11,6	8,3	12,1
	85+	13,2	20,9	9,5	18,7	18,4	16,2
	Totalt	12,6	11,4	9,7	10,0	10,3	10,8
Kvinnor	0-4	6,3	3,5	4,9	6,3	8,0	5,8
	5-14	5,3	3,9	1,6	3,5	2,7	3,4
	15-24	12,2	8,6	4,4	4,2	5,7	7,0
	25-44	4,9	3,9	4,5	3,8	4,5	4,3
	45-64	4,9	4,6	5,1	4,2	6,2	5,0
	65-74	5,4	4,5	3,3	5,1	4,6	4,6
	75-84	10,2	8,4	8,4	5,2	5,6	7,6
	85+	10,9	12,2	11,3	9,1	13,8	11,5
	Totalt	6,5	5,2	4,7	4,4	5,4	5,2
Båda könen		9,5	8,3	7,2	7,2	7,8	8,0
<i>Kontakt med heta föremål och heta ämnen</i>							
Män	0-4	63,1	74,9	59,2	62,8	59,3	63,9
	5-14	4,5	6,2	5,3	4,7	7,3	5,6
	15-24	5,1	5,2	5,0	4,0	4,3	4,7
	25-44	5,9	5,7	5,6	6,1	4,2	5,5
	45-64	4,7	3,3	5,1	4,1	4,5	4,3
	65-74	1,7	3,7	5,2	3,5	2,9	3,4
	75-84	6,3	4,2	5,0	7,8	3,7	5,4
	85+	4,9	6,4	14,3	10,9	19,9	11,4
	Totalt	8,3	8,7	8,3	8,1	7,7	8,2
Kvinnor	0-4	39,7	40,7	45,3	49,7	51,1	45,2
	5-14	6,6	4,2	4,4	4,2	5,2	4,9
	15-24	3,0	3,0	4,2	3,0	4,1	3,4
	25-44	1,9	2,8	2,4	1,7	3,9	2,5
	45-64	1,7	2,2	1,8	1,8	2,4	2,0
	65-74	4,7	2,7	3,0	3,8	4,1	3,7
	75-84	6,1	5,8	4,9	6,4	6,7	6,0
	85+	8,0	11,4	3,5	9,1	7,6	7,9
	Totalt	5,3	5,3	5,1	5,3	6,4	5,5
Båda könen		6,8	6,9	6,7	6,7	7,1	6,8

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Kontakt med giftiga djur och växter</i>							
Män	0-4	14,3	12,5	19,2	11,1	21,0	15,6
	5-14	8,2	10,5	14,8	8,9	12,2	10,9
	15-24	4,1	4,8	5,3	2,1	6,5	4,6
	25-44	3,6	5,8	6,0	5,2	7,3	5,6
	45-64	5,3	5,8	7,0	5,4	7,4	6,2
	65-74	5,4	5,5	3,5	4,6	8,3	5,5
	75-84	5,0	6,3	3,3	3,3	7,4	5,1
	85+	0,0	6,4	0,0	1,6	7,7	3,2
	Totalt	5,5	6,7	7,7	5,5	8,7	6,8
Kvinnor	0-4	9,2	11,8	13,0	10,4	10,7	11,0
	5-14	3,7	6,5	7,4	5,8	8,4	6,4
	15-24	2,4	3,0	4,0	1,6	3,1	2,8
	25-44	2,2	3,4	3,6	2,7	4,7	3,3
	45-64	4,4	6,7	5,3	3,9	6,6	5,4
	65-74	4,4	7,0	4,8	5,1	7,1	5,7
	75-84	3,2	3,8	3,2	1,7	3,5	3,1
	85+	2,9	2,1	2,1	2,1	2,8	2,4
	Totalt	3,6	5,3	5,0	3,8	5,8	4,7
Båda könen		4,6	6,0	6,3	4,6	7,2	5,8
<i>Exponering för naturkrafter</i>							
Män	0-4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,3
	5-14	0,7	0,3	0,5	0,2	0,5	0,4
	15-24	0,2	1,9	1,5	2,5	2,0	1,6
	25-44	1,3	1,1	1,8	1,9	1,7	1,6
	45-64	2,0	1,7	1,7	2,3	3,3	2,2
	65-74	1,4	1,7	2,9	4,0	2,9	2,6
	75-84	7,5	7,9	2,1	5,0	7,4	6,0
	85+	8,2	11,3	9,5	12,4	13,8	11,1
	Totalt	1,6	1,8	1,7	2,3	2,5	2,0
Kvinnor	0-4	0,0	0,0	0,4	0,9	0,0	0,3
	5-14	0,0	0,2	0,4	0,2	0,7	0,3
	15-24	0,0	1,0	0,2	1,8	1,2	0,8
	25-44	0,3	0,7	0,2	0,6	0,8	0,5
	45-64	0,5	0,7	0,7	1,2	1,2	0,9
	65-74	1,0	1,5	0,5	1,0	1,0	1,0
	75-84	2,6	2,9	2,3	3,5	3,5	3,0
	85+	5,8	5,0	2,8	7,0	6,2	5,4
	Totalt	0,7	1,0	0,6	1,3	1,3	1,0
Båda könen		1,2	1,4	1,1	1,8	1,9	1,5

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse</i>							
Män	0-4	114,4	115,2	103,0	100,3	92,6	105,3
	5-14	21,9	12,3	16,8	12,9	8,6	14,5
	15-24	27,7	24,6	23,8	24,6	21,4	24,4
	25-44	13,9	14,6	16,1	17,1	12,5	14,8
	45-64	13,5	13,2	14,8	13,1	12,0	13,3
	65-74	16,0	17,0	19,4	15,3	14,9	16,5
	75-84	28,5	33,8	25,3	31,0	28,5	29,4
	85+	61,0	56,4	73,0	66,9	58,2	63,1
	Totalt	24,0	22,5	23,0	22,1	19,0	22,1
Kvinnor	0-4	76,8	90,2	66,8	56,0	63,1	70,8
	5-14	10,1	11,9	9,3	9,9	7,9	9,8
	15-24	22,5	26,0	25,0	24,0	23,2	24,1
	25-44	11,2	10,5	10,6	11,2	9,6	10,6
	45-64	8,5	7,9	10,8	10,3	8,7	9,2
	65-74	13,8	16,0	16,7	16,5	15,5	15,7
	75-84	34,7	34,6	32,6	32,0	31,7	33,1
	85+	51,8	54,3	69,7	54,4	62,9	58,7
	Totalt	18,5	19,5	19,0	17,9	17,3	18,4
Båda könen		21,2	21,0	21,0	20,0	18,1	20,2
<i>Överansträngning och umbäranden</i>							
Män	0-4	0,8	0,8	0,9	0,4	0,8	0,8
	5-14	1,7	2,0	3,0	2,5	1,5	2,1
	15-24	16,8	17,0	16,4	13,2	14,7	15,6
	25-44	20,2	20,5	17,3	16,8	18,4	18,6
	45-64	13,2	13,1	13,4	10,0	12,9	12,5
	65-74	14,0	10,1	12,7	11,6	10,0	11,7
	75-84	22,6	20,4	20,3	20,2	19,0	20,5
	85+	33,0	25,8	23,8	24,9	21,4	25,7
	Totalt	14,2	13,8	13,2	11,7	12,7	13,1
Kvinnor	0-4	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,8
	5-14	0,5	1,8	1,9	2,6	1,8	1,7
	15-24	10,8	9,2	5,4	7,1	7,8	8,1
	25-44	7,4	8,0	5,7	5,1	6,8	6,6
	45-64	8,3	6,9	6,4	6,3	6,4	6,9
	65-74	18,7	13,0	18,2	13,0	15,3	15,6
	75-84	41,1	35,2	27,0	24,8	26,1	30,8
	85+	48,1	49,3	35,9	27,9	24,9	37,1
	Totalt	11,7	10,5	8,8	8,0	8,7	9,5
Båda könen		12,9	12,1	11,0	9,8	10,7	11,3

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer</i>							
Män	0-4	16,7	22,9	24,3	33,7	34,5	26,3
	5-14	10,1	11,3	14,0	12,1	13,9	12,3
	15-24	9,4	16,0	18,1	20,4	20,5	16,9
	25-44	10,1	12,1	15,4	14,5	18,8	14,2
	45-64	10,1	12,2	13,1	15,9	18,4	14,0
	65-74	14,5	11,8	19,1	17,6	22,7	17,2
	75-84	18,0	17,9	18,6	24,4	31,4	22,1
	85+	28,0	32,2	46,0	35,8	36,7	35,8
Kvinnor	Totalt	11,4	13,7	16,3	17,4	20,4	15,8
	0-4	15,0	14,5	23,3	19,4	18,7	18,1
	5-14	6,2	8,6	8,1	12,3	11,1	9,3
	15-24	9,7	13,2	14,4	12,7	18,9	13,8
	25-44	7,8	9,6	9,1	9,7	13,5	9,9
	45-64	6,3	7,7	10,5	11,3	17,3	10,7
	65-74	11,6	9,5	13,2	18,3	24,5	15,3
	75-84	15,7	21,5	27,6	22,7	36,9	24,9
Båda könen	85+	17,5	25,7	36,6	25,8	65,0	34,4
	Totalt	9,1	11,0	13,3	13,5	19,4	13,3
		10,2	12,3	14,8	15,4	19,9	14,5

Avsiktligt självdestruktiv handling

Män	0-4	2,0	1,2	1,3	2,1	0,8	1,5
	5-14	5,2	9,0	8,5	9,7	5,8	7,6
	15-24	63,9	82,4	86,0	97,1	94,1	84,7
	25-44	74,0	79,8	76,5	83,3	83,4	79,4
	45-64	46,2	49,9	49,5	59,4	62,0	53,5
	65-74	33,1	32,6	31,3	36,4	36,4	34,0
	75-84	31,0	29,6	35,2	39,6	37,6	34,6
	85+	28,0	54,8	63,5	57,6	45,9	50,1
Kvinnor	Totalt	46,0	51,6	51,3	58,0	57,5	52,9
	0-4	0,8	0,0	1,3	0,9	1,3	0,9
	5-14	27,4	26,7	27,8	31,4	28,9	28,4
	15-24	196,7	220,8	226,1	251,8	262,0	231,6
	25-44	116,8	121,9	123,3	138,4	134,8	127,1
	45-64	72,8	73,4	77,9	86,8	81,4	78,5
	65-74	33,7	33,0	35,2	36,9	40,8	35,9
	75-84	34,4	34,6	43,3	38,4	36,4	37,4
Båda könen	85+	29,2	31,4	31,0	40,4	33,2	33,1
	Totalt	81,1	85,2	88,4	98,3	97,0	90,0
		63,7	68,6	70,0	78,3	77,5	71,7

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Övergrep av annan person</i>							
Män	0-4	3,6	4,6	3,4	3,0	5,9	4,1
	5-14	9,1	9,0	8,6	8,2	6,6	8,3
	15-24	103,7	110,3	120,5	119,9	116,1	114,1
	25-44	54,0	57,8	56,1	56,3	53,2	55,5
	45-64	25,9	25,7	26,6	25,0	27,3	26,1
	65-74	9,7	10,1	7,8	9,8	10,6	9,6
	75-84	5,4	5,8	4,1	3,7	11,6	6,1
	85+	1,6	14,5	4,8	1,6	13,8	7,3
	Totalt	37,0	39,0	39,4	39,1	39,1	38,7
Kvinnor	0-4	5,4	3,9	4,0	2,7	3,6	4,0
	5-14	4,4	5,8	6,1	5,1	5,7	5,4
	15-24	23,9	23,0	23,2	23,6	23,4	23,4
	25-44	15,6	19,5	18,8	17,1	18,2	17,8
	45-64	9,9	12,3	9,5	12,2	12,4	11,3
	65-74	3,9	4,7	4,8	3,1	4,3	4,2
	75-84	5,0	3,2	3,8	7,0	4,1	4,6
	85+	4,4	5,7	4,2	3,5	5,5	4,7
	Totalt	11,0	12,6	11,8	11,9	12,4	11,9
Båda könen		23,8	25,6	25,5	25,4	25,6	25,2
<i>Skadehändelser med oklar avsikt</i>							
Män	0-4	6,0	14,1	11,9	14,1	13,5	11,8
	5-14	3,7	5,8	4,5	3,0	3,1	4,0
	15-24	18,1	19,6	20,2	17,2	16,8	18,4
	25-44	11,4	13,9	13,4	13,3	10,3	12,5
	45-64	10,1	11,4	10,5	10,5	12,3	11,0
	65-74	8,6	8,6	7,5	11,0	9,8	9,1
	75-84	11,3	13,3	16,1	12,0	15,3	13,6
	85+	24,7	24,2	28,6	31,1	24,5	26,6
	Totalt	10,5	12,6	12,1	11,7	11,2	11,6
Kvinnor	0-4	5,8	13,6	11,2	9,5	7,6	9,5
	5-14	2,8	5,3	4,7	5,5	5,2	4,7
	15-24	14,0	22,2	20,2	20,0	15,8	18,4
	25-44	9,8	9,9	12,1	10,5	9,6	10,4
	45-64	8,1	8,5	9,5	8,4	7,8	8,5
	65-74	8,8	9,0	8,9	7,6	6,6	8,2
	75-84	10,2	15,1	17,1	14,6	16,7	14,7
	85+	13,1	25,7	26,8	23,0	16,6	21,1
	Totalt	8,8	11,3	11,9	10,8	9,7	10,5
Båda könen		9,7	11,9	12,0	11,2	10,5	11,1

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Polisingripande och krigshandling</i>							
Män	0-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5-14	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	0,2	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
	25-44	1,1	0,6	0,7	0,3	0,6	0,7
	45-64	0,4	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1
	65-74	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
	75-84	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2
	85+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Totalt	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Kvinnor	0-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5-14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	0,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2
	25-44	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
	45-64	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1
	65-74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75-84	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	85+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Totalt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Båda könen		0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2

Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk

Män	0-4	8,3	12,5	10,2	11,1	11,4	10,7
	5-14	5,7	6,2	5,0	5,4	6,3	5,7
	15-24	9,2	12,2	9,7	12,5	9,9	10,7
	25-44	16,4	13,0	13,0	13,0	12,8	13,6
	45-64	29,6	28,3	25,7	31,6	34,5	30,0
	65-74	83,5	94,6	80,3	101,5	100,7	92,1
	75-84	186,5	182,3	185,1	184,1	213,4	190,3
	85+	237,4	290,0	290,6	291,0	312,4	284,8
	Totalt	34,7	35,5	33,4	37,0	39,5	36,0
Kvinnor	0-4	8,4	14,5	11,2	11,3	9,3	10,9
	5-14	6,4	5,1	6,5	4,4	5,5	5,6
	15-24	20,5	19,0	19,2	24,3	21,7	20,9
	25-44	24,8	24,5	24,6	24,7	25,4	24,8
	45-64	35,7	35,2	32,7	35,3	40,4	35,9
	65-74	91,9	93,7	96,9	95,7	105,8	96,7
	75-84	192,8	218,8	206,7	236,8	228,4	216,7
	85+	314,1	306,6	300,7	347,8	340,3	322,1
	Totalt	51,6	53,4	52,1	56,8	57,9	54,4
Båda könen		43,2	44,6	42,8	47,0	48,8	45,3

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård</i>							
Män	0-4	6,4	9,1	7,7	10,2	8,8	8,4
	5-14	4,2	4,5	3,2	3,2	3,9	3,8
	15-24	4,7	5,5	5,1	6,4	4,3	5,2
	25-44	6,8	6,9	8,0	5,4	7,3	6,9
	45-64	14,3	16,3	16,7	16,6	19,9	16,8
	65-74	43,9	46,4	50,1	47,4	53,3	48,2
	75-84	71,7	74,2	70,0	87,5	89,3	78,6
	85+	46,2	74,1	84,2	94,9	114,8	83,4
	Totalt	15,1	16,7	17,1	17,5	19,6	17,2
Kvinnor	0-4	4,6	5,3	7,2	7,2	5,8	6,0
	5-14	2,0	2,8	2,3	3,3	2,1	2,5
	15-24	10,1	8,0	11,0	10,5	7,0	9,3
	25-44	32,4	34,6	36,4	37,6	36,5	35,5
	45-64	46,9	45,5	44,3	46,1	48,1	46,2
	65-74	60,2	59,9	56,9	65,2	68,3	62,1
	75-84	75,1	75,4	79,9	100,5	104,4	87,0
	85+	55,4	60,0	71,8	127,6	171,6	98,0
	Totalt	34,6	34,9	36,0	40,9	42,5	37,8
Båda könen		25,0	25,9	26,6	29,4	31,2	27,6

Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk

Män	0-4	3,2	2,1	1,7	2,6	1,3	2,2
	5-14	0,3	1,2	1,3	0,7	0,8	0,9
	15-24	0,9	2,9	2,1	1,7	1,1	1,7
	25-44	3,2	3,7	3,3	3,1	3,3	3,3
	45-64	8,1	7,1	10,5	9,0	7,2	8,4
	65-74	19,1	21,9	25,2	20,8	22,1	21,8
	75-84	31,4	31,7	37,3	39,2	42,6	36,5
	85+	39,6	56,4	49,2	51,3	30,6	45,4
	Totalt	7,1	7,8	8,9	8,2	7,7	7,9
Kvinnor	0-4	0,4	0,4	1,3	2,3	1,8	1,2
	5-14	0,5	1,1	1,6	0,4	0,5	0,8
	15-24	3,4	5,0	2,2	2,0	4,3	3,4
	25-44	5,2	6,1	5,4	5,1	6,5	5,7
	45-64	8,4	10,9	8,9	9,4	8,9	9,3
	65-74	21,6	20,2	22,5	23,7	18,9	21,4
	75-84	45,7	40,5	34,9	40,5	36,1	39,5
	85+	59,0	47,9	40,8	43,2	47,0	47,5
	Totalt	11,2	11,4	10,1	10,6	10,5	10,8
Båda könen		9,2	9,6	9,5	9,4	9,1	9,4

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
Män	0-4	19,5	29,9	27,2	29,9	42,5	29,7
	5-14	20,5	19,1	20,9	25,8	29,0	23,1
	15-24	33,9	40,6	41,4	45,1	48,8	42,0
	25-44	47,6	48,7	46,8	48,6	60,5	50,4
	45-64	123,2	129,5	134,8	146,2	160,4	139,0
	65-74	341,1	373,9	379,3	401,1	427,9	384,6
	75-84	437,5	479,6	477,7	555,6	609,9	512,4
	85+	417,1	399,6	398,6	477,7	539,0	447,6
	Totalt	109,7	117,7	119,2	131,4	146,2	124,9
Kvinnor	0-4	17,1	23,7	17,5	23,5	25,3	21,4
	5-14	14,6	17,2	20,7	21,9	26,3	20,1
	15-24	34,1	34,1	37,0	37,6	42,7	37,1
	25-44	67,1	65,8	66,7	68,9	79,1	69,5
	45-64	130,5	128,2	132,8	138,3	156,9	137,5
	65-74	258,9	263,8	252,0	260,9	278,1	262,7
	75-84	356,2	373,1	322,4	369,0	407,5	365,6
	85+	333,1	333,8	316,2	327,6	345,2	331,2
	Totalt	117,3	118,9	115,4	122,6	136,1	122,1
Båda könen		113,6	118,3	117,3	127,0	141,1	123,5

Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död

Män	0-4	5,6	5,0	3,0	6,8	4,2	4,9
	5-14	6,6	5,5	7,0	5,2	9,0	6,6
	15-24	33,0	32,4	23,6	31,5	27,8	29,7
	25-44	31,8	32,1	33,4	32,2	35,4	33,0
	45-64	38,0	48,8	49,2	52,0	55,5	48,8
	65-74	77,0	136,7	141,7	143,7	172,7	134,2
	75-84	135,4	223,6	241,4	255,9	258,4	223,2
	85+	166,5	262,6	287,4	283,2	263,4	253,4
	Totalt	39,7	53,3	54,7	57,0	60,9	53,1
Kvinnor	0-4	3,3	3,9	3,6	3,2	4,4	3,7
	5-14	5,3	7,2	5,3	5,1	5,5	5,7
	15-24	19,7	22,0	17,2	20,2	23,4	20,5
	25-44	20,1	25,5	23,1	20,8	21,2	22,2
	45-64	34,9	45,6	50,4	51,1	60,6	48,6
	65-74	98,3	148,4	157,9	161,9	155,0	144,0
	75-84	158,2	265,7	296,2	291,5	308,7	264,0
	85+	196,1	331,6	391,6	354,8	357,6	327,4
	Totalt	44,0	65,6	70,5	69,1	72,8	64,4
Båda könen		41,9	59,5	62,6	63,1	66,9	58,8

Tabell 15. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per yttre orsaksgrupp, kön, ålder och år
 Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes, sex, age and year

Yttre orsak	Ålder	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes</i>							
Män	0-4	0,0	0,4	0,9	0,9	0,0	0,4
	5-14	1,5	2,8	3,0	3,7	2,0	2,6
	15-24	8,1	7,2	7,4	8,1	7,6	7,7
	25-44	3,9	3,3	2,9	2,4	2,4	3,0
	45-64	5,2	4,8	5,2	5,2	4,7	5,0
	65-74	8,8	8,4	7,2	6,1	7,2	7,5
	75-84	14,7	8,8	11,2	3,7	10,3	9,7
	85+	11,5	9,7	7,9	10,9	15,3	11,1
Kvinnor	Totalt	5,3	4,7	4,8	4,4	4,5	4,7
	0-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5-14	2,7	2,5	3,0	3,9	3,0	3,0
	15-24	5,9	5,6	6,2	9,3	10,9	7,6
	25-44	1,6	2,1	1,7	1,7	1,0	1,6
	45-64	4,1	2,8	3,5	3,6	2,7	3,3
	65-74	5,2	6,0	5,1	6,1	4,1	5,3
	75-84	7,9	4,9	9,0	6,4	9,4	7,5
Båda könen	85+	12,4	12,2	7,7	11,8	8,3	10,5
	Totalt	3,9	3,5	3,8	4,3	3,9	3,9
		4,6	4,1	4,3	4,3	4,2	4,3

Tabell 16. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per kön och år, 1987–2002
 Number of patients with external cause of injury and death by sex and year, 1987–2002

Yttre orsak	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<i>Olycksfall</i>																
Män	50097	49571	49397	48741	48237	48821	50124	52112	53044	51978	54485	50936	52464	51864	53446	53556
Kvinnor	50753	50926	50224	51060	52375	52388	55008	57118	57733	57037	59932	57862	57449	56803	57966	57308
Båda könen	100850	100497	99621	99801	100612	101209	105132	109230	110777	109015	114417	108798	109913	108667	111412	110864
<i>- Därav transportolycksfall</i>																
Män	9597	9800	10155	9330	8908	9004	8321	8332	8436	7972	8817	8164	8953	9071	9618	10156
Kvinnor	5523	5656	5920	5886	5367	5451	5269	5529	5639	5084	6030	5696	6050	6512	6300	6616
Båda könen	15120	15456	16075	15216	14275	14455	13590	13861	14075	13056	14847	13860	15003	15583	15918	16772
<i>- Därav fallolyckor</i>																
Män	25839	25512	25163	25279	25590	25740	27585	28488	29576	29474	32399	31276	31575	30879	32133	31573
Kvinnor	37577	37741	37105	37630	39502	39155	41538	42620	43464	43487	47201	46371	45393	44361	45856	44520
Båda könen	63416	63253	62268	62909	65092	64895	69123	71108	73040	72961	79600	77647	76968	75240	77989	76093

Tabell 16. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per kön och år, 1987–2002
Number of patients with external cause of injury and death by sex and year, 1987–2002

Yttre orsak	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
- Därav förgiftningsolyckor																
Män	1650	1771	1651	1690	1569	1607	1725	1832	1873	1612	1217	1059	993	1020	986	848
Kvinnor	1372	1449	1337	1422	1423	1431	1499	1548	1512	1389	1010	844	880	862	815	783
Båda könen	3022	3220	2988	3112	2992	3038	3224	3380	3385	3001	2227	1903	1873	1882	1801	1631
Övriga olycksfall																
Män	13011	12488	12428	12442	12170	12470	12493	13460	13159	12920	12052	10437	10943	10894	10709	10979
Kvinnor	6281	6080	5862	6122	6083	6351	6702	7421	7118	7077	5691	4951	5126	5068	4995	5389
Båda könen	19292	18568	18290	18564	18253	18821	19195	20881	20277	19997	17743	15388	16069	15962	15704	16368
Avsiktligt självdestruktiv handling																
Män	2711	2504	2591	2481	2398	2294	2370	2594	2617	2577	2678	2320	2580	2559	2872	2890
Kvinnor	4105	3939	4127	3869	3810	3674	3819	4150	4450	4355	4571	4306	4622	4701	5186	5173
Båda könen	6816	6443	6718	6350	6208	5968	6189	6744	7067	6932	7249	6626	7202	7260	8058	8063

Tabell 16. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per kön och år, 1987–2002
Number of patients with external cause of injury and death by sex and year, 1987–2002

Yttre orsak	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<i>Övergrepp av annan person</i>																
Män	1929	1912	1959	1974	1945	2116	2142	2421	2159	2174	1996	1679	1797	1798	1803	1816
Kvinnor	535	545	536	554	557	525	586	662	623	557	606	513	582	554	558	581
Båda könen	2464	2457	2495	2528	2502	2641	2728	3083	2782	2731	2602	2192	2379	2352	2361	2397
<i>Skadehändelse med oklar avsikt</i>																
Män	1219	1131	1077	982	927	979	1012	1085	1071	1039	622	467	564	535	525	504
Kvinnor	1045	1004	935	847	776	833	896	931	988	965	571	400	514	541	493	445
Båda könen	2264	2135	2012	1829	1703	1812	1908	2016	2059	2004	1193	867	1078	1076	1018	949
<i>Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder</i>																
Män	6879	7133	7170	7583	8136	9772	10361	10960	10930	10854	8501	7498	8021	8051	8809	9689
Kvinnor	8377	8517	8617	9009	10027	11461	12702	13333	13412	13659	10860	9847	9987	9807	10593	11384
Båda könen	15256	15650	15787	16592	18163	21233	23063	24293	24342	24513	19361	17345	18008	17858	19402	21073

Tabell 16. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per kön och år, 1987–2002
Number of patients with external cause of injury and death by sex and year, 1987–2002

Yttre orsak	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
- Därav ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk																
Män	1866	1796	1736	1703	1655	1965	2039	2391	2180	2074	1777	1533	1583	1481	1657	1775
Kvinnor	2786	2630	2510	2474	2616	2775	3073	3426	3315	3378	2662	2346	2428	2383	2584	2643
Båda könen	4652	4426	4246	4177	4271	4740	5112	5817	5495	5452	4439	3879	4011	3864	4241	4418
- Därav missöden under kirurgisk och medicinsk vård																
Män	1310	1033	1045	1094	1078	1278	1312	1305	1169	1049	1218	984	1079	1148	1143	1213
Kvinnor	1625	1568	1590	1567	1613	1883	2031	2069	1910	1769	2131	2066	2091	2085	2336	2406
Båda könen	2935	2601	2635	2661	2691	3161	3343	3374	3079	2818	3349	3050	3170	3233	3479	3619
- Därav komplikationer																
Män	3703	4304	4389	4786	5403	6529	7010	7264	7581	7731	5506	4981	5359	5422	6009	6701
Kvinnor	3966	4319	4517	4968	5798	6803	7598	7838	8187	8512	6067	5435	5468	5339	5673	6335
Båda könen	7669	8623	8906	9754	11201	13332	14608	15102	15768	16243	11573	10416	10827	10761	11682	13036

Tabell 16. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per kön och år, 1987–2002
 Number of patients with external cause of injury and death by sex and year, 1987–2002

Yttre orsak	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<i>Annan yttre orsak</i>																
Män	2334	2095	1950	1995	2020	2168	2175	2057	1808	1807	1723	2005	2594	2652	2749	2948
Kvinnor	2247	2108	1950	2022	2123	2179	2069	2108	1834	1840	1689	2166	3138	3391	3363	3536
Båda könen	4581	4203	3900	4017	4143	4347	4244	4165	3642	3647	3412	4171	5732	6043	6112	6484

Tabell 17. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per kön och år, 1987–2002
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by sex and year, 1987–2002

Yttre orsak	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Olycksfall</i>																	
Män	1206,4	1187,1	1172,7	1148,5	1129,5	1136,8	1160,0	1196,3	1214,9	1189,5	1246,3	1164,1	1197,8	1180,7	1212,4	1209,7	1184,7
Kvinnor	1191,0	1189,0	1164,0	1174,7	1197,6	1191,3	1243,4	1280,6	1291,2	1274,6	1339,0	1292,0	1282,0	1265,1	1287,9	1269,7	1246,6
Båda könen	1198,6	1188,1	1168,3	1161,7	1163,9	1164,4	1202,2	1238,9	1253,5	1232,6	1293,2	1228,8	1240,4	1223,3	1250,5	1240,0	1216,0
<i>- Därav transportolycksfall</i>																	
Män	231,1	234,7	241,1	219,8	208,6	209,7	192,6	191,3	193,2	182,4	201,7	186,6	204,4	206,5	218,2	229,4	209,3
Kvinnor	129,6	132,1	137,2	135,4	122,7	124,0	119,1	124,0	126,1	113,6	134,7	127,2	135,0	145,0	140,0	146,6	130,8
Båda könen	179,7	182,7	188,5	177,1	165,1	166,3	155,4	157,2	159,3	147,6	167,8	156,5	169,3	175,4	178,7	187,6	169,6
<i>- Därav fallolyckor</i>																	
Män	622,2	610,9	597,4	595,6	599,2	599,4	638,4	654,0	677,4	674,5	741,1	714,8	720,9	703,0	728,9	713,2	662,7
Kvinnor	881,8	881,2	859,9	865,7	903,2	890,4	938,9	955,6	972,0	971,8	1054,6	1035,4	1012,9	988,0	1018,9	986,3	952,0
Båda könen	753,7	747,8	730,2	732,3	753,0	746,6	790,4	806,5	826,5	824,9	899,7	877,0	868,6	847,0	875,4	851,1	809,1

Tabell 17. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per kön och år, 1987–2002
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by sex and year, 1987–2002

Yttre orsak	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
- Därav förgiftningsolyckor																	
Män	39,7	42,4	39,2	39,8	36,7	37,4	39,9	42,1	42,9	36,9	27,8	24,2	22,7	23,2	22,4	19,2	33,4
Kvinnor	32,2	33,8	31,0	32,7	32,5	32,5	33,9	34,7	33,8	31,0	22,6	18,8	19,6	19,2	18,1	17,3	27,7
Båda könen	35,9	38,1	35,0	36,2	34,6	35,0	36,9	38,3	38,3	33,9	25,2	21,5	21,1	21,2	20,2	18,2	30,5
- Övriga olycksfall																	
Män	313,3	299,1	295,1	293,2	285,0	290,4	289,1	309,0	301,4	295,7	275,7	238,5	249,8	248,0	242,9	248,0	279,3
Kvinnor	147,4	142,0	135,9	140,8	139,1	144,4	151,5	166,4	159,2	158,2	127,2	110,6	114,4	112,9	111,0	119,4	136,1
Båda könen	229,3	219,5	214,5	216,1	211,2	216,5	219,5	236,8	229,4	226,1	200,5	173,8	181,3	179,7	176,3	183,1	206,9
Avsiktligt självdestruktiv handling																	
Män	65,3	60,0	61,5	58,5	56,2	53,4	54,8	59,5	59,9	59,0	61,3	53,0	58,9	58,3	65,1	65,3	59,4
Kvinnor	96,3	92,0	95,6	89,0	87,1	83,5	86,3	93,0	99,5	97,3	102,1	96,1	103,1	104,7	115,2	114,6	97,3
Båda könen	81,0	76,2	78,8	73,9	71,8	68,7	70,8	76,5	80,0	78,4	81,9	74,8	81,3	81,7	90,4	90,2	78,6

Tabell 17. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per kön och år, 1987–2002
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by sex and year, 1987–2002

Yttre orsak	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Övergrepp av annan person</i>																	
Män	46,5	45,8	46,5	46,5	45,5	49,3	49,6	55,6	49,4	49,8	45,7	38,4	41,0	40,9	40,9	41,0	45,7
Kvinnor	12,6	12,7	12,4	12,7	12,7	11,9	13,2	14,8	13,9	12,4	13,5	11,5	13,0	12,3	12,4	12,9	12,8
Båda könen	29,3	29,0	29,3	29,4	28,9	30,4	31,2	35,0	31,5	30,9	29,4	24,8	26,8	26,5	26,5	26,8	29,1
<i>Skadehändelse med oklar avsikt</i>																	
Män	29,4	27,1	25,6	23,1	21,7	22,8	23,4	24,9	24,5	23,8	14,2	10,7	12,9	12,2	11,9	11,4	19,9
Kvinnor	24,5	23,4	21,7	19,5	17,7	18,9	20,3	20,9	22,1	21,6	12,8	8,9	11,5	12,0	11,0	9,9	17,2
Båda könen	26,9	25,2	23,6	21,3	19,7	20,8	21,8	22,9	23,3	22,7	13,5	9,8	12,2	12,1	11,4	10,6	18,5
<i>Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder</i>																	
Män	165,7	170,8	170,2	178,7	190,5	227,5	239,8	251,6	250,3	248,4	194,4	171,4	183,1	183,3	199,8	218,9	203,1
Kvinnor	196,6	198,9	199,7	207,3	229,3	260,6	287,1	298,9	299,9	305,2	242,6	219,9	222,9	218,4	235,4	252,2	242,5
Båda könen	181,3	185,0	185,1	193,1	210,1	244,3	263,7	275,5	275,4	277,2	218,8	195,9	203,2	201,0	217,8	235,7	223,0

Tabell 17. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per kön och år, 1987–2002
Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by sex and year, 1987–2002

Yttre orsak	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
- Därav ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk																	
Män	44,9	43,0	41,2	40,1	38,8	45,8	47,2	54,9	49,9	47,5	40,6	35,0	36,1	33,7	37,6	40,1	42,3
Kvinnor	65,4	61,4	58,2	56,9	59,8	63,1	69,5	76,8	74,1	75,5	59,5	52,4	54,2	53,1	57,4	58,6	62,2
Båda könen	55,3	52,3	49,8	48,6	49,4	54,5	58,5	66,0	62,2	61,6	50,2	43,8	45,3	43,5	47,6	49,4	52,4
- Därav missöden under kirurgisk och medicinsk vård																	
Män	31,5	24,7	24,8	25,8	25,2	29,8	30,4	30,0	26,8	24,0	27,9	22,5	24,6	26,1	25,9	27,4	26,7
Kvinnor	38,1	36,6	36,8	36,1	36,9	42,8	45,9	46,4	42,7	39,5	47,6	46,1	46,7	46,4	51,9	53,3	43,5
Båda könen	34,9	30,7	30,9	31,0	31,1	36,4	38,2	38,3	34,8	31,9	37,9	34,4	35,8	36,4	39,0	40,5	35,2
- Därav komplikationer																	
Män	89,2	103,1	104,2	112,8	126,5	152,0	162,2	166,7	173,6	176,9	125,9	113,8	122,3	123,4	136,3	151,4	134,1
Kvinnor	93,1	100,8	104,7	114,3	132,6	154,7	171,7	175,7	183,1	190,2	135,6	121,4	122,0	118,9	126,0	140,4	136,9
Båda könen	91,1	101,9	104,4	113,5	129,6	153,4	167,0	171,3	178,4	183,7	130,8	117,6	122,2	121,1	131,1	145,8	135,5

Tabell 17. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per kön och år, 1987–2002
 Number of patients with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by sex and year, 1987–2002

Yttre orsak	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Totalt
<i>Annan yttre orsak</i>																	
Män	56,2	50,2	46,3	47,0	47,3	50,5	50,3	47,2	41,4	41,4	39,4	45,8	59,2	60,4	62,4	66,6	50,8
Kvinnor	52,7	49,2	45,2	46,5	48,5	49,6	46,8	47,3	41,0	41,1	37,7	48,4	70,0	75,5	74,7	78,3	53,4
Båda könen	54,4	49,7	45,7	46,8	47,9	50,0	48,5	47,2	41,2	41,2	38,6	47,1	64,7	68,0	68,6	72,5	52,1

Bilaga 1

Gruppering av diagnoser

Skallfrakturer	S02
Frakturer på halsens och bålens ben	S12, S22, S32, T020-T021, T08
Frakturer på övre extremitet	S42, S52, S62, T022, T024, T10
Frakturer på nedre extremitet	S72, S82, S92, T023, T025, T12
Hjärnskakning	S060
Annan intrakraniell skada utan fraktur	S061-S0699

Bilaga 2

Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död 1998–2002

- V01-V8099 Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
- V81-V9999 Andra transportolyckor
- W00-W1999 Fallolyckor
- W20-W4999 Exponering för icke levande mekaniska krafter
- W50-W6499 Exponering för levande mekaniska krafter
- W65-W7499 Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
- W75-W8499 Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse
- W85-W9999 Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
- X00-X0999 Exponering för rök och öppen eld
- X10-X1999 Kontakt med heta föremål och heta ämnen
- X20-X2999 Kontakt med giftiga djur och växter
- X30-X3999 Exponering för naturkrafter
- X40-X4999 Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse
- X50-X5799 Överansträngning och umbäranden
- X58-X5999 Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer
- X60-X8499 Avsiktligt självdestruktiv handling
- X85-Y0999 Övergrepp av annan person
- Y10-Y3499 Skadehändelser med oklar avsikt
- Y35-Y3699 Polisingripande och krigshandling
- Y40-Y5999 Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk
- Y60-Y6999 Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård
- Y70-Y8299 Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk
- Y83-Y8499 Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället
- Y85-Y8999 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död

Y90-Y9899 Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes

Bilaga 3

Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död 1987–2002

Gruppering av yttre orsaker (e-kod)		1987-1996	1997	1998-2002
Olycksfall		800-928	800-928, V01-X59	V01-X59
	- därav transport-olycksfall	800-849	800-849, V01-V99	V01-V99
	- därav fall-olyckor	880-886, 888	880-886, 888, W00-W19	W00-W19
	- därav för-giftnings-olyckor	859, 866	859, 866, X40-X49	X40-X49
Avsiktligt självdestruktiv handling		950-958	950-958, X60-X84	X60-X84
Övergrepp av annan person		960-968	960-968	X85-Y09
Skadehändelse med oklar avsikt		980-988	980-988, Y10-Y34	Y10-Y34

Bilaga 4

Diagnosförteckning

Diagnoser har i tabellerna presenterats dels efter diagnosavsnitt och dels efter diagnoskategori (treställig diagnoskod) enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10). I tabellerna har diagnosavsnitt angivits i klartext men för de tabeller som redovisar diagnoskategori har av utrymmesskäl endast den treställiga diagnoskoden använts. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive diagnoskod hänvisas till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (ICD).

Kod	Benämning
-----	-----------

Skador på huvudet (S00-S09)

S00	Ytlig skada på huvudet
S01	Sårskada på huvudet
S02	Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
S03	Luxation och distorsion i huvudets leder och ligament
S04	Skada på kranialnerver
S05	Skada på ögat och ögonhålan
S06	Intrakraniell skada
S07	Klämskada på huvudet
S08	Traumatisk amputation av del av huvudet
S09	Andra och icke specificerade skador på huvudet

Skador på halsen (S10-S19)

S10	Ytlig skada på halsen
S11	Sårskada på halsen
S12	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben
S13	Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare
S14	Skada på nerver och på ryggmärgen i halsregionen
S15	Skada på blodkärl i halsregionen
S16	Skada på muskel och sena i halsregionen

Bilaga 4

Kod	Benämning
S17	Klämskada på halsen
S18	Traumatisk amputation på halsnivå
S19	Andra och icke specificerade skador i halsregionen

Skador i bröstregionen (S20-S29)

S20	Ytlig skada i bröstregionen
S21	Sårskada på bröstregionen
S22	Fraktur på revben, bröstbenet och bröstkotpelaren
S23	Luxation och distorsion av bröstkorgens leder och ligament
S24	Skada på nerver och ryggmärg i bröstregionen
S25	Skada på blodkärl i bröstkorgen
S26	Skada på hjärtat
S27	Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan
S28	Klämskada på bröstkorgen och traumatisk amputation av del av bröstkorgen
S29	Andra och icke specificerade skador på bröstkorgen

Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)

S30	Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S31	Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S32	Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
S33	Luxation och distorsion i leder och ligament i lumbalkotpelaren och bäckenet
S34	Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35	Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S36	Skada på organ i bukhålan
S37	Skada på urin- och bäckenorganen
S38	Klämskador och traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39	Andra och icke specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Kod	Benämning
-----	-----------

Skador på skuldra och överarm (S40-S49)

S40	Ytlig skada på skuldra och överarm
S41	Sårskada på skuldra och överarm
S42	Fraktur på skuldra och överarm
S43	Luxation och distorsion i skuldergördels leder och ligament
S44	Skada på nerver på skulder- och överarmsnivå
S45	Skada på blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S46	Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå
S47	Klämskada på skuldra och överarm
S48	Traumatisk amputation av skuldra och överarm
S49	Andra och icke specificerade skador på skuldra och överarm

Skador på armbåge och underarm (S50-S59)

S50	Ytlig skada på underarm
S51	Sårskada på underarm
S52	Fraktur på underarm
S53	Luxation och distorsion i armbågens leder och ligament
S54	Skada på nerver på underarmsnivå
S55	Skada på blodkärl på underarmsnivå
S56	Skada på muskel och sena på underarmsnivå
S57	Klämskada på underarm
S58	Traumatisk amputation av underarm
S59	Andra och icke specificerade skador på underarm

Skador på handled och hand (S60-S69)

S60	Ytlig skada på handled och hand
S61	Sårskada på handled och hand
S62	Fraktur på handled och hand
S63	Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå
S64	Skada på nerver på handleds- och handnivå
S65	Skada på blodkärl på handleds- och handnivå
S66	Skada på muskel och sena på handleds- och handnivå
S67	Klämskada på handled och hand
S68	Traumatisk amputation av handled och hand

Bilaga 4

Kod	Benämning
S69	Andra och icke specificerade skador på handled och hand
Skador på höft och lår (S70-S79)	
S70	Ytlig skada på höft och lår
S71	Sårskada på höft och lår
S72	Fraktur på lårben
S73	Luxation och distorsion i höftled och höftligament
S74	Skada på nerver på höft- och lårnivå
S75	Skada på blodkärl på höft- och lårnivå
S76	Skada på muskel och sena på höft- och lårnivå
S77	Klämskador på höft och lår
S78	Traumatisk amputation av höft och lår
S79	Andra och icke specificerade skador på höft och lår
Skador på knä och underben (S80-S89)	
S80	Ytlig skada på underben
S81	Sårskada på underben
S82	Fraktur på underben inklusive fotled
S83	Luxation och distorsion i knäets leder och ligament
S84	Skada på nerver på underbensnivå
S85	Skada på blodkärl på underbensnivå
S86	Skada på muskel och sena på underbensnivå
S87	Klämskada på underben
S88	Traumatisk amputation av underben
S89	Andra och icke specificerade skador på underben
Skador på fotled och fot (S90-S99)	
S90	Ytlig skada på fotled och fot
S91	Sårskada på fotled och fot
S92	Fraktur på fot med undantag för fotled
S93	Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå
S94	Skada på nerver på fotleds- och fotnivå
S95	Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå
S96	Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå

Kod	Benämning
S97	Klämskada på fotled och fot
S98	Traumatisk amputation av fotled och fot
S99	Andra och icke specificerade skador på fotled och fot

Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)

T00	Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner
T01	Sårskador som engagerar flera kroppsregioner
T02	Frakturer som engagerar flera kroppsregioner
T03	Luxationer och distorsioner som engagerar flera kroppsregioner
T04	Klämskador som engagerar flera kroppsregioner
T05	Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner
T06	Andra skador som engagerar flera kroppsregioner som ej klassificeras annorstädes
T07	Icke specificerade multipla skador

Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)

T08	Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå
T09	Andra skador på ryggraden och bålen på icke specificerad nivå
T10	Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå
T11	Andra skador på övre extremitet på icke specificerad nivå
T12	Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå
T13	Andra skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå
T14	Skada på icke specificerad kroppsregion

Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)

T15	Främmande kropp i ögats yttre delar
T16	Främmande kropp i örat
T17	Främmande kropp i andningsvägarna
T18	Främmande kropp i matsmältningskanalen
T19	Främmande kropp i urinorganen och könsorganen

Bilaga 4

Kod	Benämning
-----	-----------

Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation (T20-T25)

T20	Brännskada och frätskada på huvudet och halsen
T21	Brännskada och frätskada på bålen
T22	Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T23	Brännskada och frätskada på handled och hand
T24	Brännskada och frätskada på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T25	Brännskada och frätskada på fotled och fot

Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)

T26	Brännskada och frätskada begränsad till ögat och närliggande organ
T27	Brännskada och frätskada i andningsvägarna
T28	Brännskada och frätskada i andra inre organ

Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)

T29	Brännskador och frätskador på flera kroppsregioner
T30	Brännskada och frätskada på icke specificerad kroppsregion
T31	Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytta som engagerats
T32	Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytta som engagerats

Köldskada (T33-T35)

T33	Ytlig köldskada
T34	Köldskada med vävnadsnekros
T35	Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada

Kod	Benämning
Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)	
T36	Förgiftning med systemiska antibiotika
T37	Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
T38	Förgiftning med hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes
T39	Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
T40	Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel [hallucinogener]
T41	Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
T42	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel
T43	Förgiftning med psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes
T44	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
T45	Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras annorstädes
T46	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärtkärlsystemet
T47	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar magtarmkanalen
T48	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen
T49	Förgiftningar med medel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar
T50	Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser

Bilaga 4

Kod	Benämning
-----	-----------

Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)

T51	Toxisk effekt av alkohol
T52	Toxisk effekt av organiska lösningsmedel
T53	Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten
T54	Toxisk effekt av frätande substanser
T55	Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel
T56	Toxisk effekt av metaller
T57	Toxisk effekt av andra oorganiska substanser
T58	Toxisk effekt av kolmonoxid
T59	Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor
T60	Toxisk effekt av pesticider
T61	Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur
T62	Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen
T63	Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur
T64	Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföreningar i föda
T65	Toxisk effekt av andra och icke specificerade substanser

Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)

T66	Icke specificerade effekter av strålning
T67	Effekter av värme och ljus
T68	Hypotermi
T69	Andra effekter av nedsatt temperatur
T70	Effekter av lufttryck och vattentryck
T71	Kvävning
T73	Effekter av annan bristsituation
T74	Misshandelssyndrom
T75	Effekter av andra yttre orsaker
T78	Ogynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes

Kod	Benämning
Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79)	
T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassificeras annorstädes
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T80-T88)	
T80	Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
T81	Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
T82	Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplanterat
T83	Komplikationer av proteser, implantat och transplanterat i urinorganen och könsorganen
T84	Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat
T85	Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplanterat
T86	Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader
T87	Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation
T88	Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

Bilaga 4

Kod	Benämning
Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)	
T90	Sena besvär av skador på huvudet
T91	Sena besvär av skada på hals och bål
T92	Sena besvär av skador på övre extremitet
T93	Sena besvär av skador på nedre extremitet
T94	Sena besvär av skador som engagerar flera och icke specificerade kroppsregioner
T95	Sena besvär av brännskador, frätskador och köldskador
T96	Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser
T97	Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning
T98	Sena besvär av andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

Bilaga 5

Yttre orsaker till sjukdom och död har i tabellerna presenterats dels efter avsnitt och dels efter kategorinivå (treställig kod) enligt Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. I tabellerna har avsnitten angivits i klartext men för de tabeller som redovisar kategorinivåer har av utrymmesskäl endast kodnummer redovisats. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive Yttre orsakskod hänvisas till Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Kod	Benämning
-----	-----------

Transportolyckor (V01-V99)

V01	Fotgängare skadad i kollision med cykel
V02	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V03	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V04	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V05	Fotgängare skadad i kollision med tåg
V06	Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V09	Fotgängare skadad i transportolycka
V10	Cyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V11	Cyklist skadad i kollision med annan cykel
V12	Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V13	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V14	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V15	Cyklist skadad i kollision med tåg
V16	Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V17	Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V18	Cyklist i transportolycka, ej kollision
V19	Cyklist skadad i transportolycka
V20	Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V21	Motorcyklist skadad i kollision med cykel
V22	Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

Bilaga 5

Kod	Benämning
V23	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V24	Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V25	Motorcyklist skadad i kollision med tåg
V26	Motorcyklist skadad i kollision med annat ej motordrivet fordon
V27	Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V28	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision
V29	Motorcyklist skadad i transportolycka
V30	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon i kollision med fotgängare eller djur
V31	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med cykel
V32	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat två- eller trehjuligt motorfordon
V33	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V34	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V35	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tåg
V36	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V37	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V38	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka, ej kollision
V39	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka
V40	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V41	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med cykel
V42	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V43	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V44	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss

Kod	Benämning
V45	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg
V46	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V47	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V48	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision
V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka
V50	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V51	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med cykel
V52	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V53	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V54	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V55	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tåg
V56	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V57	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V58	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka
V60	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V61	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med cykel
V62	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V63	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V64	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V65	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg

Bilaga 5

Kod	Benämning
V66	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V67	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V68	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka
V70	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fotgängare eller djur
V71	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med cykel
V72	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V73	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V74	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V75	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tåg
V76	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V77	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V78	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka, ej kollision
V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka
V80	Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka
V81	Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka
V82	Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka
V83	Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka
V84	Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka
V85	Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka
V86	Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka
V87	Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycks-offrets transportsätt är okänt

Kod	Benämning
V88	Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt
V89	Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordons- typ ej specificerad
V90	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunk- ningstillbud
V91	Olycka med vattenfarkost som leder till annan skada
V92	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan
V93	Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost
V94	Andra och icke specificerade transportolyckor på vatten
V95	Olycka med motordriven luftfarkost med skada på ombordva- rande
V96	Olycka med ej motordriven luftfarkost med skada på ombord- varande
V97	Andra specificerade olyckor vid lufttransport
V98	Andra specificerade transportolyckor
V99	Transportolycka, ospecificerad

Fallolyckor (W00-W19)

W00	Fall i samma plan i samband med is och snö
W01	Fall i samma plan genom halkning, snävning eller snubbling
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskrid- skor, skateboard (rullbräda) eller snowboard
W03	Annat fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person
W04	Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer
W05	Fall från rullstol
W06	Fall från säng
W07	Fall från stol
W08	Fall från andra möbler
W09	Fall från lekredskap på lekplats
W10	Fall i och från trappa och trappsteg
W11	Fall på och från stege
W12	Fall på och från byggnadsställning
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruk- tion

Bilaga 5

Kod	Benämning
W14	Fall från träd
W15	Fall från stup
W16	Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning eller drunkningstillbud
W17	Annat fall från ett plan till ett annat
W18	Annat fall i samma plan
W19	Fall, ospecificerat

Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)

W20	Träffad av kastat eller fallande föremål
W21	Slagit sig mot eller träffad av sportredskap
W22	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål
W23	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål
W24	Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som ej klassificeras annorstädes
W25	Kontakt med vasst glasföremål
W26	Kontakt med dolk, kniv eller svärd
W27	Kontakt med ej motordrivet handverktyg
W28	Kontakt med motordriven gräsklippare
W29	Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin
W30	Kontakt med jordbruksmaskin
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin
W32	Skott från pistol och revolver
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen
W34	Skott från andra och icke specificerade skjutvapen
W35	Explosion i ångpanna
W36	Explosion av gascylinder
W37	Explosion av däck, rör eller slang (under övertryck)
W38	Explosion av andra specificerade föremål under övertryck
W39	Explosion av fyrverkeripjä
W40	Explosion av andra sprängämnen
W41	Exponering för högtrycksstråle
W42	Exponering för buller
W43	Exponering för vibrationer
W44	Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning
W45	Främmande kropp som trängt in genom huden

Kod	Benämning
W49	Exponerad för andra och icke specificerade icke levande mekaniska krafter

Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)

W50	Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person
W51	Slagit sig mot eller törnat emot annan person
W52	Klämd, knuffad eller nedtrampad av folkmassa
W53	Biten av råtta
W54	Biten eller angripen av hund
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur
W56	Biten eller angripen av vattendjur
W57	Bett och stick av icke giftig insekt och andra icke giftiga leddjur
W58	Biten eller angripen av krokodil eller alligator
W59	Biten eller angripen av andra kräldjur
W60	Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad
W64	Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter

Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)

W65	Drunkning och drunkningstillbud i badkar
W66	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i badkar
W67	Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng
W68	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i simbassäng
W69	Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag
W70	Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag
W73	Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud
W74	Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat

Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)

W75	Kvävning, kvävningstillbud och strypning i sängen
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse
W77	Kvävning och kvävningstillbud av jord- eller sandmassor

Bilaga 5

Kod	Benämning
W78	Inhalation av maginnehåll
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder
W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt
W83	Annan specificerad kvävning och annat specificerat kvävningstillbud
W84	Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat

Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)

W85	Exponering för kraftledningar
W86	Exponering för annan specificerad elektrisk ström
W87	Exponering för icke specificerad elektrisk ström
W88	Exponering för joniserande strålning
W89	Exponering för av människa framställt synligt och ultraviolett ljus
W90	Exponering för annan icke joniserande strålning
W91	Exponering för icke specificerad strålning
W92	Exponering för av människa framställd extrem hetta
W93	Exponering för av människa framställd extrem kyla
W94	Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck
W99	Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer

Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)

X00	Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X01	Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X02	Exponering för kontrollerad eld i byggnad och byggnadskonstruktion
X03	Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X04	Exponering för plötslig antändning av mycket eldfångt material eller ämne

Kod	Benämning
X05	Antändning av nattdräkter
X06	Antändning av andra klädesplagg
X08	Exponering för annan specificerad rök och öppen eld
X09	Exponering för icke specificerad rök och öppen eld
Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)	
X10	Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja
X11	Kontakt med hett kranvatten
X12	Kontakt med andra heta vätskor
X13	Kontakt med vattenånga och andra heta ångor
X14	Kontakt med het luft och heta gaser
X15	Kontakt med heta hushållsredskap
X16	Kontakt med utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmeelement och rörledningar
X17	Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg
X18	Kontakt med andra heta metallföremål
X19	Kontakt med andra och icke specificerade heta föremål och heta ämnen
Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)	
X20	Kontakt med giftiga ormar och ödlor
X21	Kontakt med giftiga spindlar
X22	Kontakt med skorpioner
X23	Kontakt med bålgetingar, getingar och bin
X24	Kontakt med giftiga tusenfotingar (tropiska)
X25	Kontakt med andra specificerade giftiga leddjur
X26	Kontakt med giftiga vattendjur och vattenväxter
X27	Kontakt med andra specificerade giftiga djur
X28	Kontakt med andra specificerade giftiga växter
X29	Kontakt med giftigt djur eller giftig växt, ospecificerat
Exponering för naturkrafter (X30-X39)	
X30	Exponering för extrem naturlig värme
X31	Exponering för extrem naturlig köld
X32	Exponering för solljus
X33	Blixtnedslag

Bilaga 5

Kod	Benämning
X34	Jordbävning
X35	Vulkanutbrott
X36	Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan
X37	Katastrofartat oväder
X38	Översvämning
X39	Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter

Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)

X40	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism
X41	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X43	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer
X46	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X48	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser

Överansträngning och umbäranden (X50-X57)

X50	Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser
X51	Resor och förflyttningar med överansträngning och umbäranden
X52	Utdragen vistelse i tyngdlös miljö
X53	Brist på föda
X54	Brist på vatten
X57	Umbäranden, ospecificerade

Kod	Benämning
Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)	
X58	Exponering för andra specificerade faktorer
X59	Exponering för icke specificerad faktor
Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)	
X60	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism
X61	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
X62	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X63	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X64	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X65	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer
X66	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerande kolväten och deras ångor
X67	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X68	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider
X69	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X70	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning
X71	Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning

Bilaga 5

Kod	Benämning
X72	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver
X73	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X74	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
X75	Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen
X76	Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld
X77	Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X78	Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål
X79	Avsiktligt självdestruktiv handling med trubbigt föremål
X80	Avsiktlig självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd
X81	Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse
X82	Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon
X83	Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder
X84	Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder

Övergrepp av annan person (X85-Y09)

X85	Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser
X86	Övergrepp med frätande ämnen
X87	Övergrepp med pesticider
X88	Övergrepp med gaser eller ångor
X89	Övergrepp med andra specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X90	övergrepp med icke specificerade kemiska ämnen
X91	Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning
X92	Övergrepp genom dränkning
X93	Övergrepp genom skott från pistol och revolver
X94	Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X95	Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen

Kod	Benämning
X96	Övergrepp med sprängämnen
X97	Övergrepp med rök och öppen eld
X98	Övergrepp med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X99	Övergrepp med skärande eller stickande föremål
Y00	Övergrepp med trubbigt föremål
Y01	Övergrepp genom knuff från höjd
Y02	Övergrepp genom att offret placerats eller knuffats framför föremål i rörelse
Y03	Övergrepp med motorfordon
Y04	Övergrepp genom obehärdat våld
Y05	Sexuellt övergrepp av obehärdad person
Y06	Försummelse och vanvård
Y07	Andra misshandelssyndrom
Y08	övergrepp med andra specificerade metoder
Y09	Övergrepp med icke specificerade metoder

Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)

Y10	Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt
Y11	Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y12	Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y13	Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt
Y16	Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt

Bilaga 5

Kod	Benämning
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt
Y18	Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar avsikt
Y19	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt
Y22	Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt
Y24	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt
Y25	Skadehändelse med sprängämne, med oklar avsikt
Y26	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt
Y27	Exponering för vattenånga, andra heta ångor och heta föremål, med oklar avsikt
Y28	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt
Y29	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt
Y30	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt
Y31	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt
Y32	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt
Y33	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt
Y34	Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt

Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)

Y35	Polisingripande och annat legalt ingripande
Y36	Krigshandling

Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (Y40-Y59)

Y40	Antibiotika för systemiskt bruk
Y41	Andra medel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk
Y42	Hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes
Y43	Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan
Y44	Läkemedel som företrädesvis påverkar blodets komponenter

Kod	Benämning
Y45	Smärtstillande och febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
Y46	Läkemedel mot epilepsi och vid parkinsonism
Y47	Lugnande medel, sömnmedel och läkemedel mot oro
Y48	Anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
Y49	Psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes
Y50	Medel som stimulerar centrala nervsystemet, som ej klassificeras annorstädes
Y51	Medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
Y52	Medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
Y53	Medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
Y54	Medel som företrädesvis påverkar vattenbalansen och mineral- och urinsyraomsättningen
Y55	Medel som företrädesvis påverkar den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen samt andningsorganen
Y56	Läkemedel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och tandsjukdomar
Y57	Andra och icke specificerade läkemedel och droger
Y58	Bakterievacciner
Y59	Andra och icke specificerade vacciner och biologiska substanser

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)

Y60	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under kirurgisk och medicinsk behandling
Y61	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y62	Bristande sterilitet vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y63	Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y64	Förorenade medicinska och biologiska substanser
Y65	Annat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y66	Kirurgisk och medicinsk behandling ej utförd
Y69	Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling

Bilaga 5

Kod	Benämning
-----	-----------

Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)

Y70	Anestesiutrustning som orsakat missöden
Y71	Instrument och materiel använda vid kardiovaskulära tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y72	Instrument och materiel använda vid oto-rino-laryngologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y73	Instrument och materiel vid gastroenterologiska och urologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y74	Instrument och materiel använda i annan sjukvård och egenvård som orsakat missöden
Y75	Instrument och materiel använda vid neurologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y76	Instrument och materiel använda vid obstetriska och gynekologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y77	Instrument och materiel använda vid oftalmologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y78	Instrument och materiel använda vid radiologiska undersökningar som orsakat missöden
Y79	Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y80	Instrument och materiel använda i fysikalisk medicin som orsakat missöden
Y81	Instrument och materiel använda i allmänskirurgi och plastikkirurgi som orsakat missöden
Y82	Andra och icke specificerade medicinska instrument och annan och icke specificerad materiel som orsakat missöden

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)

Y83	Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden
Y84	Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Kod	Benämning
-----	-----------

Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)

Y85	Sena effekter av transportolyckor
Y86	Sena effekter av andra olyckor
Y87	Sena effekter av avsiktligt självdestruktiv handling, övergrepp och skadehändelse med oklar avsikt
Y88	Sena effekter av kirurgisk och medicinsk behandling som yttre orsak
Y89	Sena effekter av andra yttre orsaker

Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)

Y90	Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt
Y91	Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad
Y95	Nosokomial infektion
Y96	Arbetsmiljö som orsak till sjukdom
Y97	Förorening i yttre miljön som orsak till sjukdom
Y98	Livsstil som orsak till sjukdom