

Bilaga. Metod, diagram och tabeller


Metod

För att kartlägga antalet öppen- och slutenvårdstillfällen bland kvinnor som fött barn, länkades information i det Medicinska födelseregistret med information i Patientregistret (öppen och sluten vård). Vårdtillfällen redovisas som inträffat 0–7 dagar (0–1 vecka), 8–60 dagar (ca 1–8 veckor), 61–120 dagar (ca 8–17 veckor), samt 121–365 dagar (ca 17–52 veckor) efter förlossning. Ofta är dock endast vårdtillfällen som inträffat de första 60 dagarna efter förlossning medräknade. Ibland är slutenvårds- och öppenvårdstillfällen särredovisade, ibland är de hopslagna.

Inledningsvis delades ICD-koderna upp i z-koder (i regel använda vid rutinbesök och uppföljningar) och övriga koder (som vanligtvis relaterar till ett sjukdomstillstånd). I tabell 3 i tabellbilagan redovisas de 20 vanligaste z-koder som rapporterats till Patientregistret under de första 8 veckorna efter förlossning. Motsvarande 25 vanligaste ICD-10 koder som används för sjukdomsbeskrivning redovisas i tabell 4 i tabellbilagan. Planerat kejsarsnitt på kvinnans önskan har definierats med ICD-koden O828.


Modifierade Poissonregressionsanalyser utfördes för att detektera tidstrender och beräkna relativa risker. Konfidensintervall (95 %) beräknades med normalapproximation, och redovisas i figurerna som vertikala linjer.

Figur 1. Andel kvinnor med något vårdtillfälle per ålder, paritet, BMI och rökning, 2019–2021




Källa: Medicinska födelseregistret och Patientregistret

Figur 2. Andel kvinnor med något vårdtillfälle per kvinnans utbildningsnivå




Källa: Medicinska födelseregistret och Patientregistret

Figur 3. Andel kvinnor som haft något vårdtillfälle per kvinnans födelseland, 2019–2021



Källa: Medicinska födelseregistret och Patientregistret

Figur 4. Andel kvinnor med något vårdtillfälle inom åtta veckor efter förlossning, beroende på förekomst av bristningar rapporterade till MFR



Källa: Medicinska födelseregistret och Patientregistret

Tabell 1. Antal vårdtillfällen per huvuddiagnos per typ av vårdtillfälle (sluten eller öppenvård) och tidpunkt

Antal förlösta: 338 397

Diagnos	Sluten vård 1–14 dagar efter förlossning	Sluten vård 15–60 dagar efter förlossning	Sluten vård 61–180 dagar efter förlossning	Öppen vård 1–14 dagar efter förlossning	Öppen vård 15–60 dagar efter förlossning	Öppen vård 61–180 dagar efter förlossning
Infektion						
Feber/endometrit	2 083	323	25	6 631	2 108	265
Buksmärtor uns	62	97	95	1 879	2 990	2 872
Sårinfektion	345	97	12	2 754	2 034	120
Urinvägsinfektion	262	90	16	1 181	570	131
Blödning						
Blödning postpartum	446	398	21	1 162	1 641	370
Blödning i sår postpartum	193	46	<5	1 266	620	97
Övriga komplikationer efter förlossning						
Sårruptur	25	7	0	62	87	9
Bristning grad II–IV	20	<5	<5	362	330	207
Kvarhållen moderkaka	59	51	<5	149	313	100
Vaginit/vulvit	<5	<5	0	54	431	449
Annan obstetrisk komplikation	289	82	<5	2 836	1 852	338

Diagnos	Sluten vård 1-14 dagar efter förlossning	Sluten vård 15-60 dagar efter förlossning	Sluten vård 61-180 dagar efter förlossning	Öppen vård 1-14 dagar efter förlossning	Öppen vård 15-60 dagar efter förlossning	Öppen vård 61-180 dagar efter förlossning
Hjärta-kärl						
Preeklampsi	616	17	0	3 393	1 463	115
Trombos	14	25	<5	285	210	105
Djup ventrombos	10	28	<5	35	53	31
Cerebral trombos	10	12	6	5	13	10
Lungemboli	32	53	7	45	150	66
Kardiomyopati	92	35	15	51	78	58
Essentiell hypertoni	90	14	<5	426	275	114
Mastit/ amningsproblem						
Mastit	336	399	68	1 451	4 196	1 420
Mjölckstockning	228	113	13	1 744	1 780	397
Amnings-komplikation	392	<5	0	177	328	146
Postpartum depression/psykos						
Postpartum depression	150	136	139	847	2 787	2 849
Postpartum psykos	23	27	16	10	53	68

Diagnos	Sluten vård 1-14 dagar efter förlossning	Sluten vård 15-60 dagar efter förlossning	Sluten vård 61-180 dagar efter förlossning	Öppen vård 1-14 dagar efter förlossning	Öppen vård 15-60 dagar efter förlossning	Öppen vård 61-180 dagar efter förlossning
Övriga vanliga huvud- indikationer för besök						
ADHD	<5	<5	<5	152	725	960
Bipolär	9	15	19	309	660	657
Gallsten	20	144	167	60	647	743
Huvudvärk	303	22	17	667	297	275
Diabetes (alla typer)	9	<5	11	653	782	930
Anemi	63	<5	0	150	22	<5
Matsmältning	59	86	<5	84	60	7
Nefrit	19	60	40	44	123	82
Någon av ovan- stående indikationer	6 158	2 230	654	26 853	24 570	12 990
Totalt antal vårdtillfälle (ej z)	7 664	3 723	2 245	36 168	48 513	45 394
Z-koder (oftast rutinbesök)	3 189	69	78	34 425	21 325	16 909

Källa: Medicinska födelseregistret och Patientregistret 2019-2021

Tabell 2. Huvuddiagnoser (stora grupper) för vårdtillfällen 0–8 veckor efter förlossning (både sluten- och öppenvård)

Antal förlösta: 338 397

Diagnos	Antal vårdtillfällen	Medelantal per förlöst	Antal kvinnor med minst ett vtf (per grupp)
Infektion	11 145	0,033	7 939
Blödning	10 800	0,032	7 656
Annan obstetrisk komplikation	12 247	0,036	8 606
Hjärta/kärl	9 633	0,028	6 424
Amning/Mastit	11 147	0,033	6 737
Postpartum depression	4 033	0,012	2 642
Något vårdtillfälle (ej Z)	96 068	0,284	55 060
Z-diagnos (ofta kontroll/rutin)	59 008	0,174	46 433

Källa: Medicinska födelseregistret och Patientregistret 2019–2021

Tabell 3. De 20 vanligaste z-diagnoserna vid vårdtillfälle 0–8 veckor efter förlossning. 2019–2022

ICD-Kod	Slutenvård eller öppenvård	Slutenvård	Öppenvård	Klartext
Z392	40 265	225	40 040	Rutinmässig uppföljning efter förlossning
Z390	3 342	2 376	966	Vård och undersökning omedelbart efter förlossningen
Z090	1 502	<5	1 500	Kontrollundersökning efter kirurgi för andra tillstånd
Z391	1 488	368	1 120	Vård och undersökning av ammande moder
Z875	1 259	5	1 254	Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid i den egna sjukhistorien
Z227	1 231	0	1 231	Latent tuberkulos
Z098	999	<5	998	Kontrollundersökning efter annan behandling för andra tillstånd
Z014	935	0	935	Gynekologisk undersökning (allmän) (rutin)
Z718	646	<5	645	Annan specificerad rådgivning
Z719	639	0	639	Rådgivning, ospecificerad
Z038	604	11	593	Observation för andra misstänkta sjukdomar och tillstånd som uteslutits och avskrivits
Z711	503	<5	500	Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs
Z032	428	29	399	Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar som uteslutits och avskrivits
Z013	424	0	424	Undersökning av blodtryck
Z004	404	8	396	Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras på annan plats
Z099	312	0	312	Kontrollundersökning efter ospecificerad behandling för andra tillstånd

ICD-Kod	Slutenvård eller öppenvård	Slutenvård	Öppenvård	Klartext
Z349	255	<5	252	Övervakning av normal graviditet, ospecificerad
Z738	228	<5	227	Andra specificerade problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen
Z480	176	<5	173	Tillsyn av förband och suturer
Z918	175	0	175	Andra specificerade riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej klassificeras på annan plats

Källa: Medicinska födelseregistret och Patientregistret

Tabell 4. De 25 vanligaste diagnoserna (z-diagnoser undantagna) vid vårdtillfälle 0–8 veckor efter förlossning, 2019–2022

ICD-Kod	Slutenvård eller öppenvård	Slutenvård	Öppenvård	Klartext
O859	7 786	1 983	5 803	Barnsängsfeber
O911	5 967	705	5 262	Abscess i bröst i samband med barnsbörd
R104	4 729	150	4 579	Andra och ospecificerade smärtor i buken
O860	4 656	378	4 278	Infektion i sår efter obstetriskt ingrepp
O912	3 865	341	3 524	Icke varig mastit i samband med barnsbörd
O909	3 273	196	3 077	Komplikation under barnsängstiden, ospecificerad
O722	3 135	713	2 422	Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen
O139	2 564	288	2 276	Graviditetshypertoni
O901	1 711	170	1 541	Ruptur av obstetriskt sår i perineum
O862	1 550	291	1 259	Urinvägsinfektion efter förlossning
O864	1 437	181	1 256	Feber av okänd orsak efter förlossning
O140	1 287	142	1 145	Lätt till måttlig preeklampsi
O908	1 019	75	944	Andra specificerade komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras på annan plats
F900	872	<5	870	Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning
K802	871	164	707	Gallsten utan kolecystit
O141	818	102	716	Svår preeklampsi
O998	767	100	667	Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-Kod	Slutenvård eller öppenvård	Slutenvård	Öppenvård	Klartext
R519	723	56	667	Huvudvärk
O149	722	85	637	Preeklampsi, ospecificerad
R509	664	35	629	Feber, ospecificerad
O927	601	311	290	Andra och ospecificerade laktationssjukdomar
T814	574	64	510	Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras på annan plats
O731	572	110	462	Kvarhållna delar av moderkaka och hinnor utan blödning
O868	542	140	402	Andra specificerade infektioner under barnsängstiden
O701	512	14	498	Perinealbristning av andra graden

Tabell 5. Lista över de koder som använts för att klassificera huvudindikationerna i grupper

Diagnos	ICD-kod
Infektion	
Feber/endometrit	O85, O864–O868, O861, R50, N710
Buksmärtor uns	R103–R104
Sårinfektion	O860, T814
Urinvägsinfektion	O862, N390
Blödning	
Blödning postpartum	O72, O717
Blödning i sår postpartum	O901, O902
Övriga komplikationer efter förlossning	
Sårruptur	O900
Bristning grad II-IV	O701–O703
Kvarhållen moderkaka	O731
Vaginit/vulvit	N76
Annan obstetrisk komplikation	O908–O909, O998
Hjärta-kärl	
Preeklampsi	O13–O14
Trombos	O870, O878, I80
Djup ventrombos	O871, I822
Cerebral trombos	O873, I63
Lungemboli	O92
Kardiomyopati	O908
Essentiell hypertoni	O10, I109
Mastit/amningsproblem	
Mastit	O910, N61
Mjölkstockning	O912
Amningskomplikation	O92, O908–O909
Postpartum depression/psykos	
Postpartum depression	F530, F4, F32–F33, O993
Postpartum psykos	F531

Diagnos	ICD-kod
Övriga vanliga huvudindikationer för besök	
ADHD	F90
Bipolär	F31
Gallsten	K802
Huvudvärk	O745, O894, R519
Diabetes (alla typer)	O24,E10–E11, E13–E14
Anemi	O990
Matsmältning	O996
Nefrit	N10

**Tabell 6. Vårdtillfälle (sluten och öppen vård), 0–8 veckor efter förlossning) per diagnosgrupp per karakteristika.
Varje kvinna endast en gång per grupp**

	Infektion antal och procent	Blödning antal och procent	Annan obstetrisk komplikation antal och procent	Hjärta/kärl antal och procent	Amning/Mastit antal och procent	Postpartum depression antal och procent	Något akut vårdtillfälle antal och procent	Z-diagnos antal och procent	Förlösta, totalt
Ålder (år)									
<20	79; 3,1 %	67; 2,6 %	59; 2,3 %	27; 1,1 %	37; 1,5 %	28; 1,1 %	427; 16,8 %	270; 10,6 %	2 547
20–34	6 170; 2,4 %	5 802; 2,2 %	6 427; 2,5 %	4 350; 1,7 %	5 217; 2,0 %	1 905; 0,7 %	40 846; 15,8 %	33 578; 13,0 %	258 555
35–39	1 374; 2,2 %	1 414; 2,3 %	1 689; 2,7 %	1 513; 2,4 %	1 224; 2,0 %	541; 0,9 %	10 794; 17,4 %	9 991; 16,1 %	62 070
40+	316; 2,1 %	373; 2,4 %	431; 2,8 %	534; 3,5 %	259; 1,7 %	168; 1,1 %	2 993; 19,7 %	2 594; 17,0 %	15 225
Paritet									
1 para	3 823; 2,7 %	3 831; 2,7 %	5 097; 3,6 %	3 427; 2,4 %	3 496; 2,5 %	1 308; 0,9 %	27 217; 19,1 %	19 362; 13,6 %	142 388
2 para	2 723; 2,2 %	2 537; 2,0 %	2 442; 1,9 %	1 919; 1,5 %	2 341; 1,9 %	844; 0,7 %	18 142; 14,5 %	17 832; 14,2 %	125 481
3+ para	1 393; 2,0 %	1 288; 1,8 %	1 067; 1,5 %	1 078; 1,5 %	900; 1,3 %	490; 0,7 %	9 701; 13,8 %	9 239; 13,1 %	70 374
BMI (kg/m2)									
<18,5	174; 2,3 %	216; 2,9 %	201; 2,7 %	101; 1,3 %	184; 2,4 %	61; 0,8 %	1 251; 16,5 %	1 075; 14,2 %	7 569
18,5–24,9	3 935; 2,3 %	3 862; 2,2 %	4 419; 2,5 %	2 733; 1,6 %	3 975; 2,3 %	1 191; 0,7 %	27 197; 15,6 %	24 305; 14,0 %	173 858
25–29,9	2 132; 2,4 %	1 967; 2,2 %	2 197; 2,4 %	1 896; 2,1 %	1 647; 1,8 %	714; 0,8 %	14 793; 16,4 %	12 062; 13,4 %	90 009
30–34,9	920; 2,5 %	860; 2,4 %	906; 2,5 %	923; 2,6 %	493; 1,4 %	330; 0,9 %	6 272; 17,4 %	4 974; 13,8 %	36 112
35+	443; 2,6 %	434; 2,6 %	520; 3,1 %	499; 3,0 %	178; 1,1 %	226; 1,3 %	3 261; 19,3 %	2 255; 13,4 %	16 857
Uppgift saknas	335; 2,4 %	317; 2,3 %	363; 2,6 %	272; 1,9 %	260; 1,9 %	120; 0,9 %	2 286; 16,3 %	1 762; 12,6 %	13 992

	Infektion antal och procent	Blödning antal och procent	Annan obstetrisk komplikation antal och procent	Hjärta/kärl antal och procent	Amning/Mastit antal och procent	Postpartum depression antal och procent	Något akut vårdtillfälle antal och procent	Z-diagnos antal och procent	Förlösta, totalt
Rökning									
Ej rökare	7 322; 2,4 %	6 989; 2,2 %	7 959; 2,6 %	5 944; 1,9 %	6 355; 2,0 %	2 295; 0,7 %	50 428; 16,2 %	43 151; 13,9 %	311 453
Rökare	268; 2,3 %	329; 2,8 %	302; 2,6 %	206; 1,7 %	113; 1,0 %	188; 1,6 %	2 196; 18,6 %	1 493; 12,6 %	11 831
Uppgift saknas	349; 2,3 %	338; 2,2 %	345; 2,3 %	274; 1,8 %	269; 1,8 %	159; 1,1 %	2 436; 16,1 %	1 789; 11,8 %	15 113
Längd (cm)									
<155	302; 2,3 %	298; 2,3 %	373; 2,8 %	233; 1,8 %	185; 1,4 %	92; 0,7 %	2 068; 15,7 %	1 817; 13,8 %	13 164
155–164	2 915; 2,4 %	2 784; 2,3 %	3 067; 2,5 %	2 264; 1,8 %	2 368; 1,9 %	946; 0,8 %	19 858; 16,1 %	16 894; 13,7 %	123 683
165–174	3 733; 2,3 %	3 593; 2,2 %	4 148; 2,6 %	3 086; 1,9 %	3 335; 2,1 %	1 260; 0,8 %	26 264; 16,4 %	22 294; 13,9 %	160 300
175+	781; 2,4 %	793; 2,4 %	828; 2,5 %	669; 2,0 %	701; 2,1 %	278; 0,9 %	5 550; 17,0 %	4 442; 13,6 %	32 636
Uppgift saknas	208; 2,4 %	188; 2,2 %	190; 2,2 %	172; 2,0 %	148; 1,7 %	66; 0,8 %	1 320; 15,3 %	986; 11,4 %	8 614
Kvinnans födelseland									
Nordiskt	6 578; 2,4 %	6 323; 2,3 %	6 969; 2,5 %	5 478; 2,0 %	5 723; 2,1 %	2 352; 0,9 %	45 876; 16,6 %	37 868; 13,7 %	276 074
Utanför Norden	1 361; 2,2 %	1 333; 2,1 %	1 637; 2,6 %	946; 1,5 %	1 014; 1,6 %	290; 0,5 %	9 184; 14,7 %	8 565; 13,7 %	62 323

	Infektion antal och procent	Blödning antal och procent	Annan obstetrisk komplikation antal och procent	Hjärta/kärl antal och procent	Amning/Mastit antal och procent	Postpartum depression antal och procent	Något akut vårdtillfälle antal och procent	Z-diagnos antal och procent	Förlösta, totalt
Sjukvårdsregion									
Stockholm	2 531; 3,0 %	2 291; 2,7 %	3 506; 4,1 %	2 245; 2,6 %	2 305; 2,7 %	1 054; 1,2 %	18 075; 21,1 %	18 809; 22,0 %	85 475
Uppsala/Örebro	1 423; 2,2 %	1 433; 2,2 %	1 252; 1,9 %	964; 1,5 %	870; 1,3 %	475; 0,7 %	9 513; 14,5 %	4 631; 7,1 %	65 400
Sydöst	595; 1,7 %	662; 1,9 %	722; 2,1 %	501; 1,4 %	625; 1,8 %	339; 1,0 %	4 975; 14,4 %	3 445; 9,9 %	34 653
Södra	1 483; 2,4 %	1 283; 2,1 %	982; 1,6 %	798; 1,3 %	1 218; 1,9 %	299; 0,5 %	9 226; 14,8 %	4 748; 7,6 %	62 513
Väst	1 397; 2,2 %	1 452; 2,3 %	1 754; 2,8 %	1 548; 2,4 %	1 309; 2,1 %	281; 0,4 %	9 740; 15,4 %	13 067; 20,6 %	63 450
Norr	510; 1,9 %	535; 2,0 %	390; 1,4 %	368; 1,4 %	410; 1,5 %	194; 0,7 %	3 531; 13,1 %	1 733; 6,4 %	26 906
Utbildningsnivå									
Grundskola	675; 2,3 %	698; 2,3 %	623; 2,1 %	439; 1,5 %	326; 1,1 %	289; 1,0 %	4 742; 15,9 %	3 767; 12,6 %	29 914
Gymnasium	2 511; 2,3 %	2 410; 2,3 %	2 495; 2,3 %	1 897; 1,8 %	1 791; 1,7 %	900; 0,8 %	17 066; 15,9 %	13 198; 12,3 %	107 024
<3år post gymnasium	1 303; 2,6 %	1 161; 2,3 %	1 353; 2,7 %	978; 1,9 %	1 066; 2,1 %	388; 0,8 %	8 553; 16,8 %	7 246; 14,3 %	50 793
3+år post gymnasium	3 333; 2,4 %	3 265; 2,3 %	4 007; 2,8 %	3 028; 2,1 %	3 484; 2,5 %	1 040; 0,7 %	23 892; 16,9 %	21 405; 15,1 %	141 750
Uppgift saknas	117; 1,3 %	122; 1,4 %	128; 1,4 %	82; 0,9 %	70; 0,8 %	25; 0,3 %	807; 9,1 %	817; 9,2 %	8 916
Totalt förlösta	7 939; 2,3 %	7 656; 2,3 %	8 606; 2,5 %	6 424; 1,9 %	6 737; 2,0 %	2 642; 0,8 %	55 060; 16,3 %	46 433; 13,7 %	338 397

Tabell 7. Huvuddiagnoser (stora grupper) för vårdtillfällen 0–8 veckor efter förlossning (både sluten- och öppenvård), per förlossningssätt 2019–2021. Varje kvinna är medräknad endast en gång per grupp

Antal förlösta: 338 397

Diagnos	Vaginal, ej instrumentell (totalt 259 888) antal och procent	Planerat kejsarsnitt (totalt 26 307) antal och procent	Akut kejsarsnitt (totalt 34 830) antal och procent	Sugklocka/tång (totalt 17 252) antal och procent
Infektion	5 490; 2,1 %	670; 2,5 %	1 252; 3,6 %	525; 3,0 %
Blödning	5 121; 2,0 %	792; 3,0 %	1 111; 3,2 %	627; 3,6 %
Annan obstetrisk komplikation	4 902; 1,9 %	960; 3,6 %	1 717; 4,9 %	1 021; 5,9 %
Hjärta/kärl	3 937; 1,5 %	529; 2,0 %	1 508; 4,3 %	449; 2,6 %
Amning/Mastit	5 329; 2,1 %	429; 1,6 %	580; 1,7 %	399; 2,3 %
Postpartum depression	1 748; 0,7 %	320; 1,2 %	429; 1,2 %	144; 0,8 %
Något vårdtillfälle (ej Z)	37 549; 14,4 %	5 277; 20,1 %	8 382; 24,1 %	3 828; 22,2 %
Z-diagnos (ofta kontroll/rutin)	33 037; 12,7 %	3 000; 11,4 %	7 274; 20,9 %	3 099; 18,0 %

Tabell 8. Antal och andel kvinnor med något öppen- eller slutenvårdstillfälle 2012–2021 per huvudindikation (sammanslagna grupper)

År	Infektion antal och procent	Blödning antal och procent	Annan obstetrisk komplikation antal och procent	Hjärta/kärl antal och procent	Amning/Mastit antal och procent	Postpartum depression/psykos antal och procent	Något vårdtillfälle (ej rutin) antal och procent	Rutinuppföljning (Z-diagnos) antal och procent	Förlösta, totalt
2012	2 331; 2,1 %	2 084; 1,9 %	2 616; 2,4 %	1 459; 1,3 %	2 465; 2,2 %	818; 0,7 %	16 163; 14,6 %	13 169; 11,9 %	110 414
2013	2 376; 2,1 %	2 243; 2,0 %	2 721; 2,5 %	1 624; 1,5 %	2 432; 2,2 %	871; 0,8 %	16 859; 15,2 %	12 654; 11,4 %	110 994
2014	2 342; 2,1 %	2 304; 2,0 %	2 730; 2,4 %	1 795; 1,6 %	2 372; 2,1 %	870; 0,8 %	17 264; 15,2 %	13 343; 11,8 %	113 309
2015	2 357; 2,1 %	2 288; 2,0 %	2 671; 2,3 %	1 913; 1,7 %	2 438; 2,1 %	892; 0,8 %	17 225; 15,1 %	13 299; 11,6 %	114 386
2016	2 545; 2,1 %	2 336; 2,0 %	2 684; 2,3 %	1 903; 1,6 %	2 506; 2,1 %	885; 0,7 %	17 605; 14,9 %	14 529; 12,3 %	118 468
2017	2 498; 2,2 %	2 503; 2,2 %	2 602; 2,3 %	1 810; 1,6 %	2 453; 2,1 %	923; 0,8 %	17 725; 15,4 %	15 447; 13,4 %	114 949
2018	2 754; 2,4 %	2 544; 2,2 %	2 774; 2,4 %	1 900; 1,6 %	2 416; 2,1 %	971; 0,8 %	18 226; 15,8 %	15 549; 13,5 %	115 246
2019	2 821; 2,5 %	2 600; 2,3 %	2 891; 2,5 %	1 901; 1,7 %	2 460; 2,2 %	904; 0,8 %	18 628; 16,4 %	15 129; 13,3 %	113 719
2020	2 527; 2,3 %	2 446; 2,2 %	2 739; 2,4 %	2 194; 2,0 %	2 250; 2,0 %	868; 0,8 %	17 824; 15,9 %	15 454; 13,8 %	112 166
2021	2 591; 2,3 %	2 610; 2,3 %	2 976; 2,6 %	2 329; 2,1 %	2 027; 1,8 %	870; 0,8 %	18 608; 16,5 %	15 850; 14,1 %	112 512

Tabell 9. Antal och andel kvinnor med något slutenvårdstillfälle 2012–2021 per huvudindikation (sammanslagna grupper)

År	Infektion antal och procent	Blödning antal och procent	Annan obstetrisk komplikation antal och procent	Hjärta/kärl antal och procent	Amning/Mastit antal och procent	Postpartum depression/psykos antal och procent	Något vårdtillfälle (ej rutin) antal och procent	Rutinuppföljning (Z-diagnos) antal och procent	Förlösta, totalt
2012	705; 0,6 %	260; 0,2 %	334; 0,3 %	235; 0,2 %	461; 0,4 %	112; 0,1 %	3 053; 2,8 %	419; 0,4 %	110 414
2013	700; 0,6 %	289; 0,3 %	284; 0,3 %	237; 0,2 %	462; 0,4 %	109; 0,1 %	3 125; 2,8 %	364; 0,3 %	110 994
2014	731; 0,6 %	320; 0,3 %	304; 0,3 %	258; 0,2 %	469; 0,4 %	103; 0,1 %	3 123; 2,8 %	484; 0,4 %	113 309
2015	710; 0,6 %	296; 0,3 %	298; 0,3 %	283; 0,2 %	484; 0,4 %	87; 0,1 %	3 050; 2,7 %	480; 0,4 %	114 386
2016	811; 0,7 %	280; 0,2 %	328; 0,3 %	275; 0,2 %	516; 0,4 %	79; 0,1 %	3 251; 2,7 %	577; 0,5 %	118 468
2017	822; 0,7 %	348; 0,3 %	331; 0,3 %	310; 0,3 %	487; 0,4 %	107; 0,1 %	3 318; 2,9 %	608; 0,5 %	114 949
2018	928; 0,8 %	333; 0,3 %	325; 0,3 %	297; 0,3 %	503; 0,4 %	112; 0,1 %	3 432; 3,0 %	714; 0,6 %	115 246
2019	885; 0,8 %	379; 0,3 %	320; 0,3 %	358; 0,3 %	520; 0,5 %	88; 0,1 %	3 467; 3,0 %	793; 0,7 %	113 719
2020	700; 0,6 %	366; 0,3 %	272; 0,2 %	433; 0,4 %	452; 0,4 %	103; 0,1 %	3 128; 2,8 %	964; 0,9 %	112 166
2021	699; 0,6 %	380; 0,3 %	317; 0,3 %	443; 0,4 %	427; 0,4 %	90; 0,1 %	3 280; 2,9 %	1 323; 1,2 %	112 512

Tabell 10. Antal och andel kvinnor med något slutenvårdstillfälle 2012–2021 per huvudindikation (sammanslagna grupper)

År	Infektion antal och procent	Blödning antal och procent	Annan obstetrisk komplikation antal och procent	Hjärta/kärl antal och procent	Amning/Mastit antal och procent	Postpartum depression/psykos antal och procent	Något vårdtillfälle (ej rutin) antal och procent	Rutinuppföljning (Z-diagnos) antal och procent	Förlösta, totalt
2012	1 744; 1,6 %	1 880; 1,7 %	2 349; 2,1 %	1 297; 1,2 %	2 162; 2,0 %	761; 0,7 %	14 526; 13,2 %	12 874; 11,7 %	110 414
2013	1 799; 1,6 %	2 025; 1,8 %	2 529; 2,3 %	1 463; 1,3 %	2 142; 1,9 %	813; 0,7 %	15 257; 13,7 %	12 395; 11,2 %	110 994
2014	1 774; 1,6 %	2 067; 1,8 %	2 501; 2,2 %	1 623; 1,4 %	2 084; 1,8 %	820; 0,7 %	15 648; 13,8 %	13 000; 11,5 %	113 309
2015	2 032; 1,8 %	2 153; 1,9 %	2 521; 2,2 %	1 774; 1,6 %	2 223; 1,9 %	854; 0,7 %	16 365; 14,3 %	12 959; 11,3 %	114 386
2016	2 167; 1,8 %	2 214; 1,9 %	2 515; 2,1 %	1 764; 1,5 %	2 279; 1,9 %	857; 0,7 %	16 665; 14,1 %	14 123; 11,9 %	118 468
2017	2 178; 1,9 %	2 392; 2,1 %	2 434; 2,1 %	1 644; 1,4 %	2 223; 1,9 %	884; 0,8 %	16 873; 14,7 %	15 039; 13,1 %	114 949
2018	2 447; 2,1 %	2 424; 2,1 %	2 605; 2,3 %	1 740; 1,5 %	2 193; 1,9 %	927; 0,8 %	17 393; 15,1 %	15 034; 13,0 %	115 246
2019	2 529; 2,2 %	2 492; 2,2 %	2 746; 2,4 %	1 720; 1,5 %	2 226; 2,0 %	866; 0,8 %	17 838; 15,7 %	14 551; 12,8 %	113 719
2020	2 291; 2,0 %	2 332; 2,1 %	2 620; 2,3 %	1 985; 1,8 %	2 022; 1,8 %	824; 0,7 %	17 088; 15,2 %	14 738; 13,1 %	112 166
2021	2 379; 2,1 %	2 495; 2,2 %	2 833; 2,5 %	2 110; 1,9 %	1 828; 1,6 %	835; 0,7 %	17 870; 15,9 %	14 874; 13,2 %	112 512