

### 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Andel i befolkningen, 16–84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beskrivning</b> | <i>Täljare:</i> Antal individer i ett urval av befolkningen som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande.<br><i>Nämnare:</i> Totalt antal svarande i befolkningsurvalet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mätmetod</b>    | Uppgifterna är hämtade från en nationell folkhälsoenkät som skickas ut till ett slumpmässigt urval om 20 000 individer i befolkningen 16–84 år. Enkäten skickas ut på våren varje år. Rikets befolkning 2003 har använts för åldersstandardisering.<br><br>Frågeinstrumentet GHQ12 (General Health Questionnaire) består av 12 frågor. Ett summaindex beräknas utifrån frågorna. De två första svarsalternativen, på varje fråga, ges värdet 0. Det tredje och fjärde svarsalternativet ges värdet 1. Summa-variabeln kan ha värden mellan 0–12 poäng. En dikotom variabel skapas: Om summan är mindre än 3 ges värdet 0, om summan är 3 eller mer ges värdet 1. De som har värdet 1 definieras ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Rikets befolkning 2003 har använts för åldersstandardisering. |
| <b>Datakälla</b>   | Statens folkhälsoinstitut (FHI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Felkällor</b>   | Svarsfrekvens är runt 60 procent varje år. Urvalsförfarandet tar inte hänsyn till länsindelningen, varför det kan bli endast ett fåtal personer från vissa län under vissa år. Detta gör att regionala jämförelser ska göras med viss försiktighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.2 Självmod i befolkningen

|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Antal självmord och dödsfall med oklart uppsåt per 100 000 invånare.                                                                                |
| <b>Beskrivning</b> | I måttet ingår antal självmord och antal dödsfall med oklart uppsåt. Måttet redovisas per 100 000 invånare sammantaget för perioden, per landsting. |

#### Mätmetod

| Dödsorsak    | Diagnoskod - ICD 10 |
|--------------|---------------------|
| Självmod     | X60–X84             |
| Oklar avsikt | Y10–Y34             |

Ålderstandardisering har gjorts med rikets befolkning år 2000 som standardpopulation.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen                                                                      |
| <b>Felkällor</b> | Tolkningen bör ske med en viss försiktighet då sättet att sätta diagnoser kan variera mellan landstingen. |

### 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatri

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Antalet personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare bland de som tidigare vårdats inom psykiatri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beskrivning</b> | Måttet visar antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare år bland de som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatri.<br><i>Täljare:</i> Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatri.<br><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatri.<br><br>För befolkningen:<br><i>Täljare:</i> Samtliga personer med undvikbara slutenvårdstillfällen i åldersgruppen 20-59 år<br><i>Nämnare:</i> Sveriges medelbefolkning 20-59 år |

Måttet innefattas av vårdtillfällen orsakade av utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom slutenvården. Bland de diagnoser som valts ut finns först sådana som främst bedömts belysa hur väl den icke sjukhusbundna vården handlägger kroniska eller mer långvariga åkommor. Utöver detta ingår även en del mer akuta tillstånd där adekvat behandling given inom rimlig tid bedömts kunna förhindra inläggning på sjukhus. Måttet avser att mäta kvaliteten i den öppna vården.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mätmetod</b> | Korrigeringar har gjorts för skillnader i befolkningens åldersstruktur mellan olika landsting. Ålderstandardisering har gjorts med vårdade med psykiatrisk diagnos som standardpopulation.<br><br>Den geografiska fördelningen har gjorts på patienternas hemort. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Huvuddiagnos    | ICD 10                  |
|-----------------|-------------------------|
| Psykisk sjukdom | F00-F99 (exkl. F00-F03) |

Följande sjukdomstillstånd och koder enligt ICD-10 ingår i måttet:

| Huvuddiagnos       | ICD-10 |
|--------------------|--------|
| Kroniska tillstånd |        |

|                                                           |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anemi                                                     | D501, D508, D509                                                                                                                                        |
| Astma                                                     | J45, J46                                                                                                                                                |
| Diabetes                                                  | E101–E108 (huvud- eller bidiagnos)<br>E110–E118 (huvud- eller bidiagnos)<br>E130–E138 (huvud- eller bidiagnos)<br>E140–E148 (huvud- eller bidiagnos)    |
| Hjärtsvikt                                                | I50, I110, J81                                                                                                                                          |
| Högt blodtryck                                            | I10, I119                                                                                                                                               |
| Kroniskt obstruktiv<br>lungsjukdom                        | J41, J42, J43, J44, J47<br>J20 tillsammans med J41, J42, J43, J44, J47<br>som bidiagnos                                                                 |
| Kärlkramp                                                 | I20, I240, I248, I249                                                                                                                                   |
| Akuta tillstånd                                           |                                                                                                                                                         |
| Blödande magsår                                           | K250, K251, K252, K254, K255, K256, K260, K261,<br>K262, K264, K265, K266,<br>K270, K271, K272, K274, K275, K276, K280, K281,<br>K282, K284, K285, K286 |
| Diarré                                                    | E86, K522, K528, K529                                                                                                                                   |
| Epileptiska krampanfall                                   | O15, G40, G41, R56                                                                                                                                      |
| Inflammatoriska sjukdomar i de<br>kvinnliga bäckenorganen | N70, N73, N74                                                                                                                                           |
| Njurbäckeninflammation                                    | N390, N10, N11, N12, N136                                                                                                                               |
| Öra-näsa-halsinfektion                                    | H66, H67, J02, J03, J06, J312                                                                                                                           |
|                                                           | Vårdtillfällen med samtidig hjärtkirurgi (åtgärds-koder som<br>börjar på FN och FP) ingår inte                                                          |

**Datakälla** Patientregistret, Socialstyrelsen

**Felkällor** Skillnaderna i undvikbar slutenvård tolkas med en viss försiktighet, bland annat eftersom förekomsten av vissa sjukdomstillstånd skiljer sig åt mellan olika landsting och att sättet att sätta diagnoser kan variera mellan landstingen.

### 3.4 Dödlighet bland vårdade inom psykiatrin

**Mått** Antal avlidna per 10 000 invånare som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.

**Beskrivning** Måttet visar antalet döda per 10 000 invånare i åldrarna 20–79 år.

Dödligheten mäts med Dödsorsaksregistret där alla avlidna beaktas oavsett dödsorsak.

*Täljare:* Antal avlidna 20–79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.

*Nämnare:* Antal patienter 20–79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.

För befolkningen:

*Täljare:* Samtliga avlidna i åldersgruppen 20–79 år

*Nämnare:* Sveriges medelbefolkning 20–79 år

**Mätmetod** Åldersstandardiserat med patienter med en psykiatrisk diagnos som standardbefolkning. Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort. Uppgift om underliggande dödsorsak hämtas från Dödsorsaksregistret.

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Huvuddiagnos    | ICD 10                  |
| Psykisk sjukdom | F00-F99 (exkl. F00-F03) |

**Datakälla** Patientregistret och Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen

**Felkällor** Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig. Mycket litet bortfall av personnummer i både Patientregistrets slutenvårdsdel och i Dödsorsaksregistret.

### 3.5 Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Antalet dödsfall i sjukdomar som bedöms kunna åtgärdas hälsopolitiskt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beskrivning</b> | <p>Måttet visar antalet åtgärdbara dödsfall per 100 000 invånare i åldern 25–79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.</p> <p>Med hälsopolitiska åtgärdbara dödsfall avses dödsfall som orsakats av sjukdomar eller olyckor vilka bedöms kunna påverkas med hälsopolitiska insatser. I måttet ingår dödsfall orsakat av lungcancer, cancer i matstrupe, levercirros och motortrafikolyckor.</p> <p><i>Täljare:</i> Antal avlidna 25-79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.<br/><i>Nämnare:</i> Antal patienter 25–79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.</p> <p>För befolkningen:</p> <p><i>Täljare:</i> Samtliga avlidna i åldersgruppen 25-79 år<br/><i>Nämnare:</i> Sveriges medelbefolkning 25-79 år</p> |

**Mätmetod** Uppgifterna om antalet dödsfall under perioden har hämtats från dödsorsaksregistret genom följande koder:

| Dödsorsak          | ICD-9    | ICD-10                                                      | Ålder    |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Lungcancer         | 162      | C34                                                         | 25–79 år |
| Cancer i matstrupe | 150      | C15                                                         | ”        |
| Levercirros        | 571      | K70, K73–K74                                                | ”        |
| Motortrafikolyckor | E810–823 | V-koder under kap XX som avser motorfordonsolyckor i trafik | ”        |

| Huvuddiagnos    | ICD 10                  |
|-----------------|-------------------------|
| Psykisk sjukdom | F00-F99 (exkl. F00-F03) |

Åldersstandardiserat med patienter med en psykiatrisk diagnos som standardbefolkning. Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort. Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Antalet dödsfall redovisas sammantaget för flera år för att öka den statistiska säkerheten.

Måttet åtgärdbar dödlighet utarbetades i mitten av 1980-talet inom EU. Arbetet inom EU resulterade i två atlaser där de regionala skillnaderna mellan och inom EU-länderna redovisades. Måttet har senare modifierats och t.ex. har cancer i matstrupe lagts till bland de hälsopolitiska indikatorerna. Vidare har den åldersgrupp som studerats utökats till åldern 1–79 (mot tidigare 1–74 år).

|                  |                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.                                                                                                                             |
| <b>Felkällor</b> | Tolkningen bör ske med en viss försiktighet då sättet att sätta diagnoser kan variera mellan landstingen. Små landsting tenderar också att få instabilare värden. |

### 3.6 Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Antalet dödsfall i sjukdomar som bedöms kunna åtgärdas med medicinska insatser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beskrivning</b> | <p>Måttet visar antalet åtgärdbara dödsfall per 100 000 invånare i åldern 25–79 år.</p> <p>Med sjukvårdsrelaterade åtgärdbara dödsfall avses dödsfall som orsakats av sjukdomar vilka bedöms kunna påverkas genom medicinska insatser, tidig upptäckt och behandling. I måttet ingår dödsfall orsakade av t.ex. stroke, diabetes och cancer i livmoderhals (se nedan för fullständig lista).</p> <p><i>Täljare:</i> Antal avlidna 25-79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.<br/><i>Nämnare:</i> Antal patienter 25–79 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.</p> <p>För befolkningen:</p> <p><i>Täljare:</i> Samtliga avlidna i åldersgruppen 25-79 år<br/><i>Nämnare:</i> Sveriges medelbefolkning 25-79 år</p> |

**Mätmetod** Uppgifterna om antalet dödsfall under perioden har hämtats från Dödsorsaksregistret genom följande koder:

| Dödsorsak        | ICD-9        | ICD-10       | Ålder    |
|------------------|--------------|--------------|----------|
| Tuberkulos       | 010–018, 137 | A15–A19, B90 | 25–79 år |
| Cervixcancer     | 180          | C53          | ”        |
| Hodgkins sjukdom | 201          | C81          | ”        |

|                                                                 |                  |                |   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---|
| Kronisk reumatisk hjärtsjukdom                                  | 393–398          | I05–I09        | ” |
| Diabetes                                                        | 250              | E10–E14        | ” |
| Astma                                                           | 493              | J45–J46        | ” |
| Blindtarmsinflammation                                          | 540–543          | K35–K38        | ” |
| Bukbräck                                                        | 550–553          | K40–K46        | ” |
| Gallsten samt kolecystit och utan uppgift om gallsten           | 574–575.1, 576.1 | K80–K81, K83.0 | ” |
| Hypertonisjukdomar                                              | 401–405          | I10–I15        | ” |
| Stroke                                                          | 430–438          | I60–I69        | ” |
| Komplikationer vid graviditet och förlossning samt i puerperiet | 630–676          | O00–O99        | ” |
| Tyfoidfieber                                                    | 002.0            | A01.0          | ” |
| Tetanus                                                         | 037              | A35            | ” |
| Osteomyelit                                                     | 730              | M86–M87        | ” |

| Huvuddiagnos    | ICD 10                  |
|-----------------|-------------------------|
| Psykisk sjukdom | F00-F99 (exkl. F00-F03) |

Åldersstandardiserat med patienter med en psykiatrisk diagnos som standardbefolkning. Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort. Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

Antalet dödsfall redovisas sammantaget för flera år för att öka den statistiska säkerheten.

Måttet åtgärdbar dödlighet utarbetades i mitten av 1980-talet inom EU. Arbetet inom EU resulterade i två atlaser där de regionala skillnaderna mellan och inom EU-länderna redovisades. Måttet har senare modifierats och t.ex. har diabetes lagts till bland de sjuk--vårdspolitiska indikatorerna. Vidare har den åldersgrupp som studerats utökats till åldern 1–79 (mot tidigare 1–74 år).

**Datakälla** Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

**Felkällor** Tolkningen bör ske med en viss försiktighet då metoden att sätta diagnoser kan variera mellan landstingen. Särskilt kan detta gälla diabetes. Små landsting tenderar också att få instabilare värden.

### 3.7 Återskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för schizofreni

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Andel patienter med schizofreni som återinskrivits inom 14 respektive 28 dagar på psykiatrisk klinik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beskrivning</b> | Måttet avser att belysa allt för tidig utskrivning från den slutna vården, alternativt utskrivning där uppföljning och fortsatt omhändertagande via den öppna vården inte är tillräckligt samordnad. Återinskrivning räknas från första vårdtillfället under varje år.<br><i>Täljare:</i> Antal patienter 20–59 år som återinskrivits inom 14 respektive 28 dagar på psykiatrisk klinik.<br><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som vårdats för schizofreni. |
| <b>Mätmetod</b>    | Åldersstandardiserat med patienter med schizofreni som standardbefolkning.<br>Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Huvuddiagnos | ICD 10  |
|--------------|---------|
| Schizofreni  | F20–F29 |

**Datakälla** Patientregistret, Socialstyrelsen.

**Felkällor** Diagnostikeringen i Patientregistret är inte fullständig. Det är svårt att bedöma i vilken mån återinskrivning kan och bör undvikas, bland annat påverkar kriterier för inläggning utfallet.

### 3.8 Återskrivning inom 3 respektive 6 månader efter vård för schizofreni

**Mått** Andel patienter med schizofreni som återinskrivits inom 3 respektive 6 månader på psykiatrisk klinik

**Beskrivning** Måttet avser att belysa allt för tidig utskrivning från den slutna vården, alternativt utskrivning där uppföljning och fortsatt omhändertagande via den öppna vården inte är tillräckligt samordnad. Återinskrivning räknas från första vårdtillfället under varje år.

*Täljare:* Antal patienter 20–59 år som återinskrivits inom 3 respektive 6 månader på psykiatrisk klinik.

*Nämnare:* Antal patienter 20–59 år som vårdats för schizofreni

**Mätmetod** Åldersstandardiserat med patienter med schizofreni som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

| Huvuddiagnos | ICD 10  |
|--------------|---------|
| Schizofreni  | F20–F29 |

**Datakälla** Patientregistret, Socialstyrelsen

**Felkällor** Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig. Det är svårt att bedöma i vilken mån återinskrivning kan och bör undvikas, bland annat påverkar kriterier för inläggning utfallet.

### 3.9 Läkarkontakt i specialiserad öppenvård efter utskrivning för schizofreni

**Mått** Andel vårdade för schizofreni med läkarkontakt i öppenvården inom 4 respektive 8 veckor efter utskrivning.

**Beskrivning** Läkarkontakt räknas från första vårdtillfället under varje år.

*Täljare:* Antal vårdade för schizofreni 20–59 år med läkarkontakt i öppenvården inom 4 respektive 8 veckor.

*Nämnare:* Antal patienter 20–59 år som vårdats för schizofreni

**Mätmetod** Åldersstandardiserat med patienter med schizofreni som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

| Huvuddiagnos | ICD 10  |
|--------------|---------|
| Schizofreni  | F20–F29 |

**Datakälla** Patientregistret, Socialstyrelsen

**Felkällor** Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig. Mycket litet bortfall av personnummer i både Patientregistrets slutenvårdsdel.

### 3.10 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård för schizofreni

**Mått** Antalet personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare bland de som tidigare vårdats för schizofreni.

**Beskrivning** Måttet visar antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare år bland de som någon gång de senaste fem åren vårdats för schizofreni.

*Täljare:* Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen 20–59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för schizofreni.

*Nämnare:* Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för schizofreni.

För befolkningen:

*Täljare:* Samtliga personer med undvikbara slutenvårdstillfällen i åldersgruppen 20–59 år

*Nämnare:* Sveriges medelbefolkning 20–59 år

Måttet innefattas av vårdtillfällen orsakade av utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom slutenvården. Bland de diagnoser som valts ut finns först sådana som främst bedömts belysa hur väl den icke sjukhusbundna vården handlägger kroniska eller mer långvariga åkommor. Utöver detta ingår även en del mer akuta tillstånd där adekvat behandling given inom rimlig tid bedömts kunna förhindra inläggning på sjukhus. Måttet avser att mäta kvaliteten i den öppna vården.

**Mätmetod** Korrigeringar har gjorts för skillnader i befolkningens åldersstruktur mellan olika landsting. Ålderstandardisering har gjorts med vårdade för schizofreni som standardpopulation.

Den geografiska fördelningen har gjorts på patienternas hemort.

| Huvuddiagnos | ICD 10  |
|--------------|---------|
| Schizofreni  | F20–F29 |

Följande sjukdomstillstånd och koder enligt ICD-10 ingår i måttet undvikbar slutenvård:

| Huvuddiagnos       | ICD-10 |
|--------------------|--------|
| Kroniska tillstånd |        |

|                                                        |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anemi                                                  | D501, D508, D509                                                                                                                                     |
| Astma                                                  | J45, J46                                                                                                                                             |
| Diabetes                                               | E101–E108 (huvud- eller bidiagnos)<br>E110–E118 (huvud- eller bidiagnos)<br>E130–E138 (huvud- eller bidiagnos)<br>E140–E148 (huvud- eller bidiagnos) |
| Hjärtsvikt                                             | I50, I110, J81                                                                                                                                       |
| Högt blodtryck                                         | I10, I119                                                                                                                                            |
| Kroniskt obstruktiv lungsjukdom                        | J41, J42, J43, J44, J47<br>J20 tillsammans med J41, J42, J43, J44, J47 som bidiagnos                                                                 |
| Kärlkramp                                              | I20, I240, I248, I249                                                                                                                                |
| Akuta tillstånd                                        |                                                                                                                                                      |
| Blödande magsår                                        | K250, K251, K252, K254, K255, K256, K260, K261, K262, K264, K265, K266, K270, K271, K272, K274, K275, K276, K280, K281, K282, K284, K285, K286       |
| Diarré                                                 | E86, K522, K528, K529                                                                                                                                |
| Epileptiska krampanfall                                | O15, G40, G41, R56                                                                                                                                   |
| Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen | N70, N73, N74                                                                                                                                        |
| Njurbäckeninflammation                                 | N390, N10, N11, N12, N136                                                                                                                            |
| Öra-näsa-halsinfektion                                 | H66, H67, J02, J03, J06, J312                                                                                                                        |
|                                                        | Vårdtillfällen med samtidig hjärtkirurgi (åtgärds-koder som börjar på FN och FP) ingår inte                                                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Patientregistret, Socialstyrelsen                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Felkällor</b> | Skillnaderna i undvikbar slutenvård tolkas med en viss försiktighet, bland annat eftersom förekomsten av vissa sjukdomstillstånd skiljer sig åt mellan olika landsting och att sättet att sätta diagnoser kan variera mellan landstingen. |

### 3.11 Dödlighet bland vårdade för schizofreni

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Antal avlidna per 10 000 invånare som någon gång senaste fem åren vårdats för schizofreni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beskrivning</b> | <p>Måttet visar antalet döda per 10 000 invånare i åldrarna 20-59 år.</p> <p>Dödligheten mäts med Dödsorsaksregistret där alla avlidna beaktas oavsett dödsorsak.</p> <p><i>Täljare:</i> Antal avlidna 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för schizofreni.</p> <p><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för schizofreni.</p> <p>För befolkningen:</p> <p><i>Täljare:</i> Samtliga avlidna i åldersgruppen 20-59 år</p> <p><i>Nämnare:</i> Sveriges medelbefolkning 20-59 år</p> |
| <b>Mätmetod</b>    | Åldersstandardiserat med patienter med schizofreni som standardbefolkning. Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort. Uppgift om underliggande dödsorsak hämtas från Dödsorsaksregistret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Huvuddiagnos</b> | <b>ICD 10</b> |
| Schizofreni         | F20–F29       |

|                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Patientregistret och Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen                                                                                                           |
| <b>Felkällor</b> | Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig. Mycket litet bortfall av personnummer i både Patientregistrets slutenvårdsdel och i Dödsorsaksregistret. |

### 3.12 Återskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för bipolär sjukdom

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Andel patienter med bipolär sjukdom som återinskrivits inom 14 respektive 28 dagar på psykiatrisk klinik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beskrivning</b> | Måttet avser att belysa allt för tidig utskrivning från den slutna vården, alternativt utskrivning där uppföljning och fortsatt omhändertagande via den öppna vården inte är tillräckligt samordnad. Återinskrivning räknas från första vårdtillfället under varje år.<br><i>Täljare:</i> Antal patienter 20–29 år som återinskrivits inom 14 respektive 28 dagar på psykiatrisk klinik.<br><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som vårdats för bipolär sjukdom |
| <b>Mätmetod</b>    | Åldersstandardiserat med patienter med bipolär sjukdom som standardbefolkning.<br>Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Huvuddiagnos</b> | <b>ICD 10</b> |
| Bipolär sjukdom     | F30–F31       |

|                  |                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Patientregistret, Socialstyrelsen                                                                                                                                                            |
| <b>Felkällor</b> | Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig. Det är svårt att bedöma i vilken mån återinskrivning kan och bör undvikas, bland annat påverkar kriterier för inläggning utfallet. |

### 3.13 Återskrivning inom 3 respektive 6 månader efter vård för bipolär sjukdom

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Andel patienter med bipolär sjukdom som återinskrivits inom 3 respektive 6 månader på psykiatrisk klinik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beskrivning</b> | Måttet avser att belysa allt för tidig utskrivning från den slutna vården, alternativt utskrivning där uppföljning och fortsatt omhändertagande via den öppna vården inte är tillräckligt samordnad. Återinskrivning räknas från första vårdtillfället under varje år.<br><i>Täljare:</i> Antal patienter 20–59 år som återinskrivits inom 3 respektive 6 månader psykiatrisk klinik.<br><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som vårdats för bipolär sjukdom |
| <b>Mätmetod</b>    | Åldersstandardiserat med patienter med bipolär sjukdom som standardbefolkning.<br>Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Huvuddiagnos</b> | <b>ICD 10</b> |
| Bipolär sjukdom     | F30–F31       |

|                  |                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Patientregistret, Socialstyrelsen                                                                                                                                                            |
| <b>Felkällor</b> | Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig. Det är svårt att bedöma i vilken mån återinskrivning kan och bör undvikas, bland annat påverkar kriterier för inläggning utfallet. |

### 3.14 Läkarkontakt i specialiserad öppenvård efter utskrivning för bipolär sjukdom

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Andel vårdade för bipolär sjukdom med läkarkontakt i öppenvården inom 4 respektive 8 veckor efter utskrivning.                                                                                                                                                      |
| <b>Beskrivning</b> | Läkarkontakt räknas från första vårdtillfället under varje år.<br><i>Täljare:</i> Antal vårdade för bipolär sjukdom 20–59 år med läkarkontakt i öppenvården inom 4 respektive 8 veckor.<br><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som vårdats för bipolär sjukdom |
| <b>Mätmetod</b>    | Åldersstandardiserat med patienter med bipolär sjukdom som standardbefolkning.<br>Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.                                                                                                                    |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Huvuddiagnos</b> | <b>ICD 10</b> |
| Bipolär sjukdom     | F30–F31       |

|                  |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Patientregistret, Socialstyrelsen                                                                                                        |
| <b>Felkällor</b> | Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig. Mycket litet bortfall av personnummer i både Patientregistrets slutenvårdsdel. |

### 3.15 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård för bipolär sjukdom

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Antalet personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare bland de som tidigare vårdats för bipolär sjukdom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beskrivning</b> | Måttet visar antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare år bland de som någon gång de senaste fem åren vårdats för bipolär sjukdom.<br><i>Täljare:</i> Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen 20–59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för bipolär sjukdom.<br><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för bipolär sjukdom. |

För befolkningen:

*Täljare:* Samtliga personer med undvikbara slutenvårdstillfällen i åldersgruppen 20-59 år

*Nämnare:* Sveriges medelbefolkning 20-59 år

Måttet innefattas av vårdtillfällen orsakade av utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom slutenvården. Bland de diagnoser som valts ut finns först sådana som främst bedömts belysa hur väl den icke sjukhusbundna vården handlägger kroniska eller mer långvariga åkommor. Utöver detta ingår även en del mer akuta tillstånd där adekvat behandling given inom rimlig tid bedömts kunna förhindra inläggning på sjukhus. Måttet avser att mäta kvaliteten i den öppna vården.

**Mätmetod** Korrigeringar har gjorts för skillnader i befolkningens åldersstruktur mellan olika landsting. Ålderstandardisering har gjorts med vårdade för bipolär sjukdom som standardpopulation.

Den geografiska fördelningen har gjorts på patienternas hemort.

| Huvuddiagnos    | ICD 10  |
|-----------------|---------|
| Bipolär sjukdom | F30–F31 |

Följande sjukdomstillstånd och koder enligt ICD-10 ingår i måttet undvikbar slutenvård:

| Huvuddiagnos                                           | ICD-10                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroniska tillstånd                                     |                                                                                                                                                      |
| Anemi                                                  | D501, D508, D509                                                                                                                                     |
| Astma                                                  | J45, J46                                                                                                                                             |
| Diabetes                                               | E101–E108 (huvud- eller bidiagnos)<br>E110–E118 (huvud- eller bidiagnos)<br>E130–E138 (huvud- eller bidiagnos)<br>E140–E148 (huvud- eller bidiagnos) |
| Hjärtsvikt                                             | I50, I110, J81                                                                                                                                       |
| Högt blodtryck                                         | I10, I119                                                                                                                                            |
| Kroniskt obstruktiv lungsjukdom                        | J41, J42, J43, J44, J47<br>J20 tillsammans med J41, J42, J43, J44, J47 som bidiagnos                                                                 |
| Kärlkramp                                              | I20, I240, I248, I249                                                                                                                                |
| Akuta tillstånd                                        |                                                                                                                                                      |
| Blödande magsår                                        | K250, K251, K252, K254, K255, K256, K260, K261, K262, K264, K265, K266, K270, K271, K272, K274, K275, K276, K280, K281, K282, K284, K285, K286       |
| Diarré                                                 | E86, K522, K528, K529                                                                                                                                |
| Epileptiska krampanfall                                | O15, G40, G41, R56                                                                                                                                   |
| Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen | N70, N73, N74                                                                                                                                        |
| Njurbäckeninflammation                                 | N390, N10, N11, N12, N136                                                                                                                            |
| Öra-näsa-halsinfektion                                 | H66, H67, J02, J03, J06, J312                                                                                                                        |
|                                                        | Vårdtillfällen med samtidig hjärtkirurgi (åtgärds-koder som börjar på FN och FP) ingår inte                                                          |

**Datakälla** Patientregistret, Socialstyrelsen

**Felkällor** Skillnaderna i undvikbar slutenvård tolkas med en viss försiktighet, bland annat eftersom förekomsten av vissa sjukdomstillstånd skiljer sig åt mellan olika landsting och att sättet att sätta diagnoser kan variera mellan landstingen.

### 3.16 Dödlighet bland vårdade för bipolär sjukdom

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Antal avlidna per 10 000 invånare som någon gång senaste fem åren vårdats för bipolär sjukdom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beskrivning</b> | Måttet visar antalet döda per 10 000 invånare i åldrarna 20-59 år.<br>Dödligheten mäts med Dödsorsaksregistret där alla avlidna beaktas oavsett dödsorsak.<br><i>Täljare:</i> Antal avlidna 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för bipolär sjukdom.<br><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för schizofreni..<br>För befolkningen:<br><i>Täljare:</i> Samtliga avlidna i åldersgruppen 20-59 år<br><i>Nämnare:</i> Sveriges medelbefolkning 20-59 år |
| <b>Mätmetod</b>    | Åldersstandardiserat med patienter med bipolär sjukdom som standardbefolkning. Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort. Uppgift om underliggande dödsorsak hämtas från Dödsorsaksregistret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Huvuddiagnos    | ICD 10  |
|-----------------|---------|
| Bipolär sjukdom | F30-F31 |

|                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Patientregistret och Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen                                                                                                           |
| <b>Felkällor</b> | Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig. Mycket litet bortfall av personnummer i både Patientregistrets slutenvårdsdel och i Dödsorsaksregistret. |

### 3.17 Följsamhet till litiumbehandling vid bipolär sjukdom

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Antal personer med regelbunden litiumbehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beskrivning</b> | Litiumbehandling är högprioriterat vid behandling av bipolär sjukdom i den preliminära versionen av nationella riktlinjer för ångest och depression. Litiumbehandling som förebyggande åtgärd ska förhindra återfall i periodiska depressioner eller manodepressivitet.<br><i>Täljare:</i> Antal personer med fortsatt regelbunden litiumbehandling under nuvarande mätperiod<br><i>Nämnare:</i> Antal personer 18 år och äldre med regelbunden litiumbehandling under föregående mätperiod<br>Med regelbunden medicinering menas uttag av litium under månad 1-4 samt under månad 9-12 under mätperioden. |
| <b>Mätmetod</b>    | Åldersstandardiserat med patienter som hämtat ut litium som standardbefolkning.<br>Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Läkemedel | ATC-kod |
|-----------|---------|
| Litium    | N05AN01 |

|                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen                                                                                                                                                                   |
| <b>Felkällor</b> | Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård, dispenserade från läkemedelsförråd, eller receptfria läkemedel. Läkemedelsregistret saknar också uppgifter om förskrivningsorsak. |

### 3.18 Återskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för svår depression

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Andel patienter med svår depression som återinskrivits inom 14 respektive 28 dagar på psykiatrisk klinik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beskrivning</b> | Måttet avser att belysa allt för tidig utskrivning från den slutna vården, alternativt utskrivning där uppföljning och fortsatt omhändertagande via den öppna vården inte är tillräckligt samordnad. Återinskrivning räknas från första vårdtillfället under varje år.<br><i>Täljare:</i> Antal patienter 20-29 år som återinskrivits inom 14 respektive 28 dagar på psykiatrisk klinik.<br><i>Nämnare:</i> Antal patienter 20-59 år som vårdats för svår depression |
| <b>Mätmetod</b>    | Åldersstandardiserat med patienter med svår depression som standardbefolkning.<br>Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Huvuddiagnos    | ICD 10                                     |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Svår depression | F322, F323, F332, F333, F314, F315 och F34 |

|                  |                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Patientregistret, Socialstyrelsen                                                                                                                                                            |
| <b>Felkällor</b> | Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig. Det är svårt att bedöma i vilken mån återinskrivning kan och bör undvikas, bland annat påverkar kriterier för inläggning utfallet. |

### 3.19 Återskrivning inom 3 respektive 6 månader efter vård för svår depression

- Mått** Andel patienter med svår depression som återinskrivits inom 3 respektive 6 månader på psykiatrisk klinik
- Beskrivning** Måttet avser att belysa allt för tidig utskrivning från den slutna vården, alternativt utskrivning där uppföljning och fortsatt omhändertagande via den öppna vården inte är tillräckligt samordnad. Återinskrivning räknas från första vårdtillfället under varje år.  
*Täljare:* Antal patienter 20-59 år som återinskrivits inom 3 respektive 6 månader psykiatrisk klinik.  
*Nämnare:* Antal patienter 20-59 år som vårdats för svår depression
- Mätmetod** Åldersstandardiserat med patienter med svår depression som standardbefolkning.  
Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

| Huvuddiagnos    | ICD 10                                     |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Svår depression | F322, F323, F332, F333, F314, F315 och F34 |

- Datakälla** Patientregistret, Socialstyrelsen
- Felkällor** Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig. Det är svårt att bedöma i vilken mån återinskrivning kan och bör undvikas, bland annat påverkar kriterier för inläggning utfallet.

### 3.20 Läkarkontakt i specialiserad öppenvård efter utskrivning för svår depression

- Mått** Andel vårdade för svår depression med läkarkontakt i öppenvården inom 4 respektive 8 veckor efter utskrivning.
- Beskrivning** Läkarkontakt räknas från första vårdtillfället under varje år.  
*Täljare:* Antal vårdade för svår depression 20-59 år med läkarkontakt i öppenvården inom 4 respektive 8 veckor.  
*Nämnare:* Antal patienter 20-59 år som vårdats för svår depression
- Mätmetod** Åldersstandardiserat med patienter med svår depression som standardbefolkning.  
Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

| Huvuddiagnos    | ICD 10                                     |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Svår depression | F322, F323, F332, F333, F314, F315 och F34 |

- Datakälla** Patientregistret, Socialstyrelsen
- Felkällor** Diagnostäckningen i Patientregistret är inte fullständig. Mycket litet bortfall av personnummer i både Patientregistrets slutenvårdsdel.

### 3.21 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård för svår depression

- Mått** Antalet personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare bland de som tidigare vårdats för svår depression.
- Beskrivning** Måttet visar antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare år bland som någon gång de senaste fem åren vårdats för svår depression.  
*Täljare:* Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för svår depression.  
*Nämnare:* Antal patienter 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för svår depression.  
För befolkningen:  
*Täljare:* Samtliga personer med undvikbara slutenvårdstillfällen i åldersgruppen 20-59 år  
*Nämnare:* Sveriges medelbefolkning 20-59 år
- Måttet innefattas av vårdtillfällen orsakade av utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom slutenvården. Bland de diagnoser som valts ut finns först sådana som främst bedömts belysa hur väl den icke sjukhusbundna vården handlägger kroniska eller mer långvariga åkommor. Utöver detta ingår även en del mer akuta tillstånd där adekvat behandling given inom rimlig tid bedömts kunna förhindra inläggning på sjukhus. Måttet avser att mäta kvaliteten i den öppna vården.
- Mätmetod** Korrigeringar har gjorts för skillnader i befolkningens åldersstruktur mellan olika landsting. Ålderstandardisering har gjorts med vårdade för svår depression som standardpopulation.  
Den geografiska fördelningen har gjorts på patienternas hemort.

| Huvuddiagnos | ICD 10 |
|--------------|--------|
|--------------|--------|

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Svår depression | F322, F323, F332, F333, F314, F315 och F34 |
|-----------------|--------------------------------------------|

Följande sjukdomstillstånd och koder enligt ICD-10 ingår i måttet undvikbar slutenvård:

| Huvuddiagnos                                           | ICD-10                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroniska tillstånd                                     |                                                                                                                                                      |
| Anemi                                                  | D501, D508, D509                                                                                                                                     |
| Astma                                                  | J45, J46                                                                                                                                             |
| Diabetes                                               | E101–E108 (huvud- eller bidiagnos)<br>E110–E118 (huvud- eller bidiagnos)<br>E130–E138 (huvud- eller bidiagnos)<br>E140–E148 (huvud- eller bidiagnos) |
| Hjärtsvikt                                             | I50, I110, J81                                                                                                                                       |
| Högt blodtryck                                         | I10, I119                                                                                                                                            |
| Kroniskt obstruktiv lungsjukdom                        | J41, J42, J43, J44, J47<br>J20 tillsammans med J41, J42, J43, J44, J47 som bidiagnos                                                                 |
| Kärlkramp                                              | I20, I240, I248, I249                                                                                                                                |
| Akuta tillstånd                                        |                                                                                                                                                      |
| Blödande magsår                                        | K250, K251, K252, K254, K255, K256, K260, K261, K262, K264, K265, K266, K270, K271, K272, K274, K275, K276, K280, K281, K282, K284, K285, K286       |
| Diarré                                                 | E86, K522, K528, K529                                                                                                                                |
| Epileptiska krampanfall                                | O15, G40, G41, R56                                                                                                                                   |
| Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen | N70, N73, N74                                                                                                                                        |
| Njurbäckeninflammation                                 | N390, N10, N11, N12, N136                                                                                                                            |
| Öra-näsa-halsinfektion                                 | H66, H67, J02, J03, J06, J312                                                                                                                        |
|                                                        | Vårdtillfällen med samtidig hjärtkirurgi (åtgärds-koder som börjar på FN och FP) ingår inte                                                          |

**Datakälla** Patientregistret, Socialstyrelsen

**Felkällor** Skillnaderna i undvikbar slutenvård tolkas med en viss försiktighet, bland annat eftersom förekomsten av vissa sjukdomstillstånd skiljer sig åt mellan olika landsting och att sättet att sätta diagnoser kan variera mellan landstingen.

### 3.22 Dödlighet bland vårdade för svår depression

**Mått** Antal avlidna per 10 000 invånare som någon gång senaste fem vårdats för svår depression.

**Beskrivning** Måttet visar antalet döda per 10 000 invånare i åldrarna 20-59 år.

Dödligheten mäts med Dödsorsaksregistret där alla avlidna beaktas oavsett dödsorsak.

*Täljare:* Antal avlidna 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för svår depression.

*Nämnare:* Antal patienter 20-59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats för schizofreni..

För befolkningen:

*Täljare:* Samtliga avlidna i åldersgruppen 20-59 år

*Nämnare:* Sveriges medelbefolkning 20-59 år

**Mätmetod** Åldersstandardiserat med patienter med svår depression som standardbefolkning. Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort. Uppgift om underliggande dödsorsak hämtas från Dödsorsaksregistret.

|              |        |
|--------------|--------|
| Huvuddiagnos | ICD 10 |
|--------------|--------|

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Svår depression | F322, F323, F332, F333, F314, F315 och F34 |
|-----------------|--------------------------------------------|

**Datakälla** Patientregistret och Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen

**Felkällor** Diagnostikeringen i Patientregistret är inte fullständig. Mycket litet bortfall av personnummer i både Patientregistrets slutenvårdsdel och i Dödsorsaksregistret.

### 3.23 Följsamhet till behandling med antidepressiva läkemedel

**Mått** Antal personer 18 år och äldre på antidepressiv medicinering som har följsamhet till behandling av alla 18 år och äldre på antidepressiv medicinering.

**Beskrivning** Antidepressiv medicinering har hög prioritet vid depression. För att ha effekt måste behandlingen pågå i minst 6 månader.

*Täljare:* Antal personer 18 år och äldre på antidepressiv medicinering som hämtat ut ytterligare ett recept på antidepressiva 60 till 150 dagar efter det första uttaget.

*Nämnare:* Antal personer 18 år och äldre som hämtat ut minst ett recept på antidepressiv medicinering och som inte haft något uthämtat recept föregående 6 månader.

Måttet är beräknat på personer med ett uttag av först recept på antidepressiva under perioden 2009-01-01 till 2009-07-31 och som inte hade något uttag av antidepressiva de föregående 6 månaderna (2008-07-01 - 2008-12-31) med uppföljning av ytterligare recept 2009-12-31

**Mätmetod** Åldersstandardiserat med 2000 års befolkning som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

| Läkemedel      | ATC-kod |
|----------------|---------|
| Antidepressiva | N06A    |

**Datakälla** Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

**Felkällor** Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård, dispenserade från läkemedelsförråd, eller receptfria läkemedel. Läkemedelsregistret saknar också uppgifter om förskrivningsorsak

### 3.24 Regelbunden behandling med sömn-/lugnande medel

**Mått** Antal personer 20–79 år med regelbunden och hög användning av sömn-/lugnande medel, per 100 000 invånare.

**Beskrivning** Bensodiazepiner är accepterade läkemedel vid kortvarig behandling av sjukliga ångesttillstånd och tillfälliga sömnstörningar. De har även i varierande omfattning kommit att användas vid behandling av lindrigare former av oro och ångest. En överdriven förskrivning kan leda till biverkningar och ökad risk för missbruk och beroende.

I måttet anges antalet som hämtat ut recept på bensodiazepiner beräknat per 100 000 invånare.

Regelbundna användare:

*Täljare:* Antal personer 20–79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 0,5 dygnsdoser bensodiazepiner per dag,

*Nämnare:* Antal personer 20–79 år i befolkningen

Högkonsumenter:

*Täljare:* Antal personer 20–79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 1,5 dygnsdoser bensodiazepiner per dag

*Nämnare:* Antal personer 20–79 år i befolkningen.

**Mätmetod** Åldersstandardiserat med 2000 års befolkning som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

| Läkemedel                       | ATC-kod |
|---------------------------------|---------|
| Bensodiazepinderivat, lugnande  | N05BA   |
| Bensodiazepinderivat, sömnmedel | N05CD   |
| Bensodiazepinbesläktade medel   | N05CF   |

**Datakälla** Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

**Felkällor** Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel ordinerade i sluten vård, dispenserade från läkemedelsförråd, eller receptfria läkemedel. Läkemedelsregistret saknar också uppgifter om förskrivningsorsak.

### 3.25 Tre eller fler psykofarmaka bland äldre

**Mått** Andelen 80 år och äldre som använder tre eller fler psykofarmaka samtidigt.

**Beskrivning** I måttet redovisas samtidig behandling med tre eller fler psykofarmaka, regelbundet eller vid behov.

*Täljare:* Personer i ålderna 80 år och över, som den 31 december beräknas samtidigt ha använt tre eller flera psykofarmaka

*Nämnare:* Samtliga personer i ålderna 80 år och över i befolkningen.

**Mätmetod** En aktuell läkemedelslista konstrueras för varje individ. I ett datauttag från läkemedelsregistret, omfattande en tremånadersperiod bakåt i tiden från den studerade tidpunkten, uppskattas aktuell läkemedelsanvändning vid denna, utifrån uppgifter om tidpunkt för uttag, mängd uttaget läkemedel samt ordinerad dosering. Beräkning av ordinerad dos kräver tolkning av doseringsangivelser som idag endast är registrerad som fri text. Ibland måste vissa antaganden göras, då informationen om dosering är ofullständig eller saknas.

Läkemedelsregistret innehåller på individnivå uppgifter om alla uthämtade läkemedel i öppenvård.

Den geografiska indelningen per landsting baseras på personernas hemort.

**Datakälla** Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

**Felkällor** Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel ordinerade i sluten vård, dispenserade från läkemedelsförråd, eller köpta utan recept, vilket kan leda till en underskattning av läkemedelsanvändningen hos äldre. Vidare innehåller läkemedelsregistret endast information om läkemedel som är uthämtade från apoteket, vilket kan medföra en underskattning av mängden förskrivna läkemedel. Metoden att uppskatta aktuell läkemedelsanvändning innebär en viss osäkerhet, främst genom tolkningen av doseringsangivelser.

### 3.26 Långvarig användning av sömnmedel till äldre

**Mått** Andelen 80-84 år som använder sömnmedel regelbundet under minst tre år.

**Beskrivning** Bensodiazepiner är accepterade läkemedel vid kortvarig behandling av sjukliga ångesttillstånd och tillfälliga sömnstörningar. De har även i varierande omfattning kommit att användas vid behandling av lindrigare former av oro och ångest. En överdriven förskrivning kan leda till biverkningar och ökad risk för missbruk och beroende.

I måttet anges antalet personer använder sömnmedel regelbundet under minst tre år beräknat per 100 000 invånare.

Långvariga användare:

*Täljare:* Antal personer 80-84 år som hämtat ut recept på sömnmedel minst en gång var fjärde månad i tre års tid

*Nämnare:* Antal personer 80-84 år i befolkningen

**Mätmetod** Åldersstandardiserat med 2000 års befolkning som standardbefolkning.

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

| Läkemedel                       | ATC-kod |
|---------------------------------|---------|
| Bensodiazepinderivat, sömnmedel | N05CD   |
| Bensodiazepinbesläktade medel   | N05CF   |

**Datakälla** Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

**Felkällor** Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel ordinerade i sluten vård, dispenserade från läkemedelsförråd, eller receptfria läkemedel. Läkemedelsregistret saknar också uppgifter om förskrivningsorsak.

### 3.27 Lämpliga lugnande och sömnmedel till äldre

**Mått** Andelen 80 år och äldre som använder lämpligt sömnmedel.

**Beskrivning** I måttet redovisas samtidig lämplig sömnmedelsbehandling till äldre, regelbundet eller vid behov.

*Täljare:* Personer i ålderna 80 år och över, som den 31 december beräknas använda lämpligt sömnmedel

*Nämnare:* Samtliga personer i ålderna 80 år och över i befolkningen som står på något sömnmedel.

**Mätmetod** En aktuell läkemedelslista konstrueras för varje individ. I ett datauttag från läkemedelsregistret, omfattande en tremånadersperiod bakåt i tiden från den studerade tidpunkten, uppskattas aktuell läkemedelsanvändning vid denna, utifrån uppgifter om tidpunkt för uttag, mängd uttaget läkemedel samt ordinerad dosering. Beräkning av ordinerad dos kräver tolkning av doseringsangivelser som idag endast är registrerad som fri text. Ibland måste vissa antaganden göras, då informationen om dosering är ofullständig eller saknas.

Läkemedelsregistret innehåller på individnivå uppgifter om alla uthämtade läkemedel i öppenvård.

Den geografiska indelningen per landsting baseras på personernas hemort.

| Läkemedel          | ATC-kod          |
|--------------------|------------------|
| Samtliga sömnmedel | N05CD +<br>N05CF |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Lämpligt<br>Bensodiazepinbesläktade sömnmedel | N05CF01/02 |
|-----------------------------------------------|------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b>   | Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Felkällor</b>   | Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård, dispenserade från läkemedelsförråd, eller köpta utan recept, vilket kan leda till en underskattning av läkemedelsanvändningen hos äldre. Vidare innehåller läkemedelsregistret endast information om läkemedel som är uthämtade från apoteket, vilket kan medföra en underskattning av mängden förskrivna läkemedel. Metoden att uppskatta aktuell läkemedelsanvändning innebär en viss osäkerhet, främst genom tolkningen av doseringsangivelser                                                                                                                                                                                   |
| 3.28               | Väntat > 90 dagar – besök vuxenpsykiatri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mått</b>        | Andelen av det totala antalet väntande som väntat längre än 90 dagar på besök i planerad specialiserad somatisk vård                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beskrivning</b> | <p>Indikatorn visar andelen av det totala antalet väntande patienter som har väntat längre än 90 dagar på ett förstabesök inom planerad specialiserad vård, vid det aktuella mätillfället. Enbart läkarbesök ingår.</p> <p>Måtten avser patienter inom den planerade, specialiserade vården där beslut om besök enligt givna medicinska indikationer har fattats i överenskommelse med patienten. I måttet inkluderas patienter som fått en framflyttad tid på grund av att verksamheten ändrar avtalad tid för besök. Däremot exkluderas patienter som själva valt att vänta längre än erbjuden tid (patientvald väntetid) och patienter som av medicinska skäl måste vänta längre än erbjuden tid.</p> |
| <b>Mätmetod</b>    | <p>Landstingen rapporterar uppgifter om verksamheter inom den offentligt finansierade planerade specialiserade vården, det vill säga landstingsdrivna verksamheter och privata vårdgivare med avtal, vars vårdutbud omfattas av databasens urval.</p> <p>Databasen för den specialiserade vården innehåller inte uppgifter om enskilda patienter, utan består av aggregerade uppgifter huvudsakligen från patient- och vårdadministrativa system.</p> <p>Databasens vårdutbud täcker nästan all planerad verksamhet, men vårdgarantin gäller all planerad vård.</p>                                                                                                                                      |
| <b>Datakälla</b>   | Databasen "Väntetider i Vården", Sveriges Kommuner och Landsting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Felkällor</b>   | Kriterier och medicinska indikationer för att en patient skall bli uppsatt på en väntelista/planeringslista kan variera och minskar även jämförbarheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3.29 Blodfettssänkande läkemedelsbehandling

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Andel läkemedelsbehandlade diabetiker som behandlats med blodfettssänkande läkemedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beskrivning</b> | <p>Läkemedelsbehandling av blodfettssänkning är särskilt viktig hos diabetespatienter med flera riskfaktorer, som högt blodtryck, rökning och bukfetma. Läkemedelsbehandlade diabetiker har hämtats från Läkemedelsregistret, definierat som att man någon gång under året hämtat ut minst ett recept på något diabetesläkemedel. Av dessa har andelen som hämtat ut blodfettssänkande läkemedel studerats.</p> <p>Personer med psykiatrisk sjukdom definieras som vårdad någon gång de senaste fem åren med psykiatrisk sjukdom</p> <p><i>Täljare:</i> Läkemedelsbehandlade diabetiker 40 -79 år som hämtat ut minst ett recept på blodfettssänkande läkemedel.</p> <p><i>Nämnare:</i> Totalt antal läkemedelsbehandlade diabetiker 40 -79 år i läkemedelsregistret.</p> <p>Befolkningen:</p> <p><i>Täljare:</i> Läkemedelsbehandlade diabetiker 40 -79 år som hämtat ut minst ett recept på blodfettssänkande läkemedel.</p> <p><i>Nämnare:</i> Totalt antal läkemedelsbehandlade diabetiker 40 -79 år i läkemedelsregistret.</p> |
| <b>Mätmetod</b>    | <p>Åldersstandardiserade värden redovisas d.v.s. korrigeringar har gjorts för skillnader i befolkningens åldersstruktur mellan olika landsting.</p> <p>Ålderstandardisering har gjorts med diabetespopulationen som standardpopulation.</p> <p>Den geografiska fördelningen har gjorts på patienternas hemort.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Läkemedel         | ATC-kod |
|-------------------|---------|
| Diabetesläkemedel | A10     |
| Blodfettssänkande | C10     |

| Huvud- eller bidiagnos | ICD 10                  |
|------------------------|-------------------------|
| Psykisk sjukdom        | F00-F99 (exkl. F00-F03) |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Felkällor</b> | <p>Läkemedelsregistret fångar enbart de diabetiker som är tablett- eller insulinbehandlade, utöver dessa finns diabetiker med enbart kostbehandling.</p> <p>Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård, dispenserade från läkemedelsförråd, eller receptfria läkemedel.</p> <p>Läkemedelsregistret saknar också uppgifter om förskrivningsorsak.</p> |

### 3.30 Dödlighet efter hjärtinfarkt

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mått</b>        | Andelen som avled inom 28 dagar efter hjärtinfarkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beskrivning</b> | <p>Andelen av samtliga fall av akut hjärtinfarkt som avled inom 28 dagar efter infarkten.</p> <p>Samtliga vårdtillfällen med någon diagnos av akut hjärtinfarkt i Patientregistrets slutenvårdsdel eller ett dödsfall med dödsorsaken akut hjärtinfarkt inom 28 dagar hänförs till ett fall av akut hjärtinfarkt. I måttet ingår således även de som inte vårdats på sjukhus.</p> <p>Dödligheten inom 28 dagar mäts med Dödsorsaksregistret där alla avlidna beaktas oavsett dödsorsak. Måttet avser att mäta kvaliteten i hela vårdkedjan från den förebyggande vården till ambulansverksamheten, det akuta omhändertagandet och efterföljande vård.</p> <p>Personer med psykiatrisk sjukdom definieras som vårdad någon gång de senaste fem åren med psykiatrisk sjukdom</p> <p><i>Täljare:</i> Antalet fall under mätperioden som avled inom 28 dagar (dag 0 till 27) efter hjärtinfarkt.</p> <p><i>Nämnare:</i> Samtliga fall av hjärtinfarkt under mätperioden.</p> <p>Befolkningen:</p> <p><i>Täljare:</i> Antalet fall under mätperioden som avled inom 28 dagar (dag 0 till 27) efter hjärtinfarkt.</p> <p><i>Nämnare:</i> Samtliga fall av hjärtinfarkt under mätperioden.</p> |

|                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mätmetod</b> | Andelen döda inom 28 dagar efter infarkt har åldersstandardiserats med alla fall av akut hjärtinfarkt år 2000 som standardpopulation. Samma standardpopulation har använts för män och kvinnor. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Diagnos      | Diagnoskod - ICD 10 |
|--------------|---------------------|
| Hjärtinfarkt | I21, I22            |

| Huvud- eller bidiagnos | ICD 10                  |
|------------------------|-------------------------|
| Psykisk sjukdom        | F00-F99 (exkl. F00-F03) |

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemort.

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Datakälla</b> | Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen |
|------------------|-----------------------------------------------------------|

**Felkällor** Mycket litet bortfall av personnummer i både Patientregistrets slutenvårdsdel och i Dödsorsaksregistret. Skiftande diagnoskriterier i de olika landstingen kan påverka resultaten.

### 3.31 Dödlighet efter förstagångsstroke

**Mått** Andelen som avled inom 28 dagar resp 90 bland förstagångsfall av stroke.

**Beskrivning** 28-dagars dödlighet bland förstagångsfall av stroke. Förstagångsfall har skattats med krav på sju år utan föregående strokediagnos i Patientregistret. Det vill säga endast de personer som inte haft någon strokediagnos under de sju föregående åren har ingått i beräkningen. Med stroke avses hjärnblödning, hjärninfarkt och ej specificerad stroke. Måttet avser att mäta kvaliteten i hela vårdkedjan från den förebyggande vården till ambulansverksamheten, det akuta omhändertagandet och efterföljande vård.

Samtliga vårdtillfällen med någon diagnos av stroke i Patientregistrets slutenvårdsdel eller ett dödsfall med dödsorsaken stroke inom 28 dagar hänförs till ett strokefall. Både patienter som vårdats och inte vårdats på sjukhus ingår därmed.

Dödligheten inom 28 dagar mäts med Dödsorsaksregistret där alla avlidna beaktas oavsett dödsorsak.

Personer med psykiatrisk sjukdom definieras som vårdad någon gång de senaste fem åren med psykiatrisk sjukdom

*Täljare:* Antalet förstagångsfall under mätperioden som avled inom 28 dagar (dag 0–27) resp 90 efter stroke.

*Nämnare:* Samtliga förstagångsfall av stroke under mätperioden.

Befolkningen:

*Täljare:* Antalet förstagångsfall under mätperioden som avled inom 28 dagar (dag 0–27) resp 90 efter stroke.

*Nämnare:* Samtliga förstagångsfall av stroke under mätperioden.

**Mätmetod** Andelen döda inom 28 dagar resp 90 efter stroke har åldersstandardiserats utifrån alla fall av stroke år 2000 som standardpopulation. Samma standardpopulation har använts för män och kvinnor.

| Diagnos | Diagnoskod - ICD 10 |
|---------|---------------------|
| Stroke  | I61, I63, I64       |

| Huvud- eller bidiagnos | ICD 10                  |
|------------------------|-------------------------|
| Psykisk sjukdom        | F00-F99 (exkl. F00-F03) |

Den geografiska fördelningen har gjorts på personernas hemortslän.

**Datakälla** Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

**Felkällor** Mycket litet bortfall av personnummer i både Patientregistrets slutenvårdsdel och i Dödsorsaksregistret. Skiftande diagnoskriterier i de olika landstingen kan påverka resultaten.