

Cancerregistret Kodningsinstruktion 2010

Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

Artikelnr 2010-5-5

Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010

LÄPP (LABIUM)

C00

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Överläppens yttersida eller det läppröda	C00.0	C00.0	C00.0	140.0	140.0
Underläppens yttersida eller det läppröda	C00.1	C00.1	C00.1	140.1	140.1
Läppens yttersida eller det läppröda, läpp ej angiven	C00.2	C00.2	C00.2	140.9	140.9
Överläppens insida	C00.3	C00.3	C00.3	140.3	140.0
Underläppens insida	C00.4	C00.4	C00.4	140.4	140.1
Läppens insida, läpp ej angiven	C00.5	C00.5	C00.5	140.5	140.9
Läppkommissur eller mungipa	C00.6	C00.6	C00.6	140.6	140.9
Överväxt till/från angränsande sublokal inom läpp (C00) med okänt ursprung	C00.8	C00.9	C00.9	140.9	140.9
Läpp UNS	C00.9	C00.9	C00.9	140.9	140.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C00, se nedan		C00.8	C00.8	140.8	140.8

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C00.8.

För morfologiska koder avseende små spottkörtlar i läpp se läge C07 och C08 samt förklarande text.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

TUNGBAS (BASEOS LINGUAE)

C01

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Tungbasens dorsala sida, tungbas UNS, bakre 1/3 av tungan	C01.9	C01.9	C01	141.0	141.0

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

- Inkluderar tumör utgående från små spottkörtlar

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Mucosalt lentiginöst melanom in situ	87462/b		174/b
Mucosalt lentiginöst melanom	87463		176

För morfologiska koder avseende små spottkörtlar i tungbas se läge C07 och C08.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

TUNGA (LINGUA)

C02

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Tungans översida, främre 2/3, medellinje	C02.0	C02.0	C02.0	141.1	141.7
Tungans kant/rand och spets	C02.1	C02.1	C02.1	141.2	141.7
Tungans undersida, främre 2/3 och tungband	C02.2	C02.2	C02.2	141.3	141.7
Tungans rörliga del UNS (främre 2/3)	C02.3	C02.3	C02.3	141.4	141.9
Tungtonsill	C02.4	C02.4	C02.4	141.9	141.9
Överväxt till/från angränsande sublokal inom tunga (C02.0-C02.4) med okänt ursprung	C02.8	C02.9	C02.9	141.9	141.9
Tunga UNS	C02.9	C02.9	C02.9	141.9	141.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C02, se nedan		C02.8	C02.8	141.8	141.8

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

- Exkluderar tumör utgående från tonsill UNS (C09.9) och tungbas (C01.9)

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C02.8.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Mucosalt lentiginöst melanom in situ	87462/b		174/b
Mucosalt lentiginöst melanom	87463		176
Myoepitelialt carcinom (C02.4)	89823		196

Kommentar:

- Myoepitelialt carcinom registreras enligt ICD-O/3 med egen Morf-kod 89823 och enligt ICD-O/2 med Morf-kod 85623 med klartexten epitelialt-myoepitelialt carcinom, C24/hist 196.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

TANDKÖTT (GINGIVA)

C03

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Överkäkens tandkött (maxillär gingiva)	C03.0	C03.0	C03.0	143.0	144
Underkäkens tandkött (mandibulär gingiva)	C03.1	C03.1	C03.1	143.1	144
Tandkött (gingiva) UNS	C03.9	C03.9	C03.9	143.9	144

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

- Inkluderar tumör utgående från periodontal vävnad, tandficka och små spottkörtlar
- Exkluderar tumör utgående från tand- och benvävnad i överkäke/maxill (C41.0) respektive i underkäke/mandibel (C41.1).
- Tänder saknar egen lägeskod, räknas som benvävnad.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Mucosalt lentiginöst melanom in situ	87462/b		174/b
Mucosalt lentiginöst melanom	87463		176

För morfologiska koder avseende små spottkörtlar i tandkött se C07 och C08.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

MUNBOTTEN (BASEOS ORIS)

C04

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Munbotten främre del	C04.0	C04.0	C04.0	144.9	143
Munbotten lateral del	C04.1	C04.1	C04.1	144.9	143
Överväxt till/från angränsande sublokal inom munbotten (C04) med okänt ursprung	C04.8	C04.9	C04.9	144.9	143
Munbotten UNS	C04.9	C04.9	C04.9	144.9	143
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i C04, se nedan		C04.8	C04.8	144.9	143

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

- Inkluderar tumör utgående från små spottkörtlar

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, d v s avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisation översätts dessa till ICD-O/2 läge C04.8.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Mucosalt lentiginöst melanom in situ	87462/b		174/b
Mucosalt lentiginöst melanom	87463		176

För morfologiska koder avseende små spottkörtlar i munbotten se läge C07 och C08.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

GOM (PALATUM)

C05

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Hårda gommen	C05.0	C05.0	C05.0	145.2	144
Mjuka gommen	C05.1	C05.1	C05.1	145.3	144
Uvula (gomsegel)	C05.2	C05.2	C05.2	145.4	144
Överväxt till/från angränsande sublokal inom gom (C05) med okänt ursprung	C05.8	C05.9	C05.9	145.5	144
Gom (muntak) UNS	C05.9	C05.9	C05.9	145.5	144
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C05, se nedan		C05.8	C05.8	145.8	144

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

- Inkluderar tumör utgående från små spottkörtlar
- Exkluderar tumör i tandkött, på läpparnas insida, i underliggande ben och på mjuka gommens övre (= nasofaryngeala) yta.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, d v s avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C05.8.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Mucosalt lentiginöst melanom in situ	87462/b		174/b
Mucosalt lentiginöst melanom	87463		176

För morfologiska koder avseende små spottkörtlar i gom se läge C07 och C08.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ANNAN OCH ICKE SPECIFICERAD DEL AV MUNHÅLA C06

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
* Kindslemhinna (buccalslemhinna) UNS	C06.0	C06.0	C06.0	145.0	144
Kindfåra, läppfåra, alveolarfåra	C06.1	C06.1	C06.1	145.9	144
Retromolär yta (bakom kindtänderna)	C06.2	C06.2	C06.2	145.6	144
Överväxt till/från angränsande sublokal i andra och ospecificerade delar av munhåla (C06) med okänt ursprung	C06.8	C06.9	C06.9	145.9	144
Munhåla UNS inkl små spottkörtlar UNS	C06.9	C06.9	C06.9	145.9	144
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C06, se nedan		C06.8	C06.8	145.8	144

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

- Små spottkörtlar med lägesangivelse registreras på respektive läge.
- Vid angivet läge kind kontrollera om det är:
 1. insida=(slemhinna)
 2. utsida= hud som avses (se läge C44)

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C06.8.

* Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom pleomorft låggradigt	85253		096
Basalcellsadenocarcinom	81473		096
Mucosalt lentiginöst melanom in situ	87462/b		174/b
Mucosalt lentiginöst melanom	87463		176

För morfologiska koder avseende små spottkörtlar UNS i munhåla se läge C07 och C08.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ÖRONSPOTTKÖRTEL (PAROTIS)

C07

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Öronspottkörtel, inkl utförsgång (Stensens gång)	C07.9	C07.9	C07	142.0	142.0

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Acinic-cell carcinom/adenocarcinom	85503		066
Basalcellsadenocarcinom	81473		096
Blandtumör (mixed tumor), malign av spottkörteltyp	89403		046
Epitelialt-myoepitelialt carcinom	85623		196
Malignt pleomorft adenom	89413		046
Myoepitelialt carcinom	89823		196
Salivary duct carcinoma (spottkörtelgångscarcinom)	85003		096

Kommentar:

- Adenolymfom i spottkörtel (Warthintumör) är benign och skall ej registreras.
- Carcinom utgåendet från pleomorft adenom registreras enligt ICD-O/3 med Morf-kod 89413, registrerades enligt ICD-O/2 med Morf-kod 89403.
- Myoepitelialt carcinom registreras enligt ICD-O/3 med **egen** Morf-kod 89823, registrerades enligt ICD-O/2 med Morf-kod 85623 epitelialt-myoepitelialt carcinom.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ANDRA OCH OSPECIFICERADE STORA SPOTTKÖRTLAR

C08

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Submandibulariskörtel, submaxillariskörtel inkl utförsgång (Whartons gång)	C08.0	C08.0	C08.0	142.1	142.6
Sublingualiskörtel inkl utförsgång	C08.1	C08.1	C08.1	142.2	142.5
Överväxt till/från angränsande stora spottkörtlar (C07 + C08) med okänt ursprung	C08.8	C08.9	C08.9	142.9	142.9
Stora spottkörtlar UNS	C08.9	C08.9	C08.9	142.9	142.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C08, se nedan		C08.8	C08.8	142.8	142.8

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, d v s avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). **Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.**
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C08.8.

Obligatorisk sidoangivelse: 1=höger, 2=vänster och 9=okänd

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Acinic-cell carcinom/adenocarcinom	85503		066
Basalcellsadenocarcinom	81473		096
Blandtumör (mixed tumor) malign	89403		046
Epitelialt-myoepitelialt carcinom	85623		196
Malignt pleomorft adenom (carcinom utgående från pleomorft adenom)	89413		046
Myoepitelialt carcinom	89823		196
Salivary duct carcinoma (spottkörtelgångscarcinom)	85003		096

Kommentar:

- Benigna blandtumörer (av t ex fibromyxoepitelial typ = pleomorfa adenom) skall ej registreras.
- Adenolymfom i spottkörtel (Warthintumör) är benign skall ej registreras.
- Carcinom utgåendet från pleomorft adenom registreras enligt ICD-O/3 med
- Morf-kod 89413 registrerades enligt ICD-O/2 med Morf-kod 89403.
- Myoepitelialt carcinom registreras enligt ICD-O/3 med **egen** Morf-kod 89823, registrerades enligt ICD-O/2 med Morf-kod 85623 epitelialt-myoepitelialt carcinom C24/Hist 196.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

TONSILL (TONSILLA)

C09

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Fossa tonsillaris	C09.0	C09.0	C09.0	146.0	145.0
Gombågar, främre och bakre	C09.1	C09.1	C09.1	146.0	145.0
Överväxt till/från angränsande sublokal inom tonsill (C09) med okänt ursprung	C09.8	C09.9	C09.9	146.0	145.0
Gomtonsill och tonsill UNS	C09.9	C09.9	C09.9	146.0	145.0
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C09, se nedan		C09.8	C09.8	146.0	145.0

INCA: Startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

- Exkluderar tumör i tungtonsill (C02.4) och svalgtonsill/farynxtonsill (C11.1).

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C09.8.

Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Lymfoepiteliom/ lymfoepiteliomlikt carcinom	80823		166

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

MELLANSVALG (OROFARYNX, MESOFARYNX)

C10

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Vallecula epiglottica (struplocksinsänkning)	C10.0	C10.0	C10.0	146.9	145.7
Epiglottis främre yta och fria kanter	C10.1	C10.1	C10.1	146.9	145.7
Lateral vägg	C10.2	C10.2	C10.2	146.9	145.7
Bakre vägg	C10.3	C10.3	C10.3	146.9	145.7
Brankialveck (gälveck hos foster) samt brankialcysta (lateral halscysta), som plats för tumör	C10.4	C10.4	C10.4	146.9	145.7
Överväxt till/från angränsande sublokal inom mellansvalg (C10) med okänt ursprung	C10.8	C10.9	C10.9	146.9	145.9
Mellansvalg UNS	C10.9	C10.9	C10.9	146.9	145.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i C10, se nedan		C10.8	C10.8	146.8	145.8

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

- Bakre ytan av epiglottis räknas till larynx (C32.1).
- Exkluderar tumör utgående från epiglottis UNS (C32.1) och tonsill (C09.9).

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C10.8.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ÖVRE SVALGRUM (NASO/RHINO/FARYNX, EPIFARYNX) C11

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Övre vägg (naso/rhino- eller epifarynxtak)	C11.0	C11.0	C11.0	147.9	146
Bakre vägg inkl. adenoid, (svalgtonsill/farynxtonsill)	C11.1	C11.1	C11.1	147.9	146
Sidovägg inkl. Rosenmüllers ficka (fossa)	C11.2	C11.2	C11.2	147.9	146
Främre vägg inkl. bakre kant av nasseptum, koaner och nasofaryngeal yta av mjuka gommen	C11.3	C11.3	C11.3	147.9	146
Överväxt till/från angränsande sublokal inom övre svalgrum (C11) med okänt ursprung	C11.8	C11.9	C11.9	147.9	146
Övre svalgrum UNS	C11.9	C11.9	C11.9	147.9	146
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C11, se nedan		C11.8	C11.8	147.9	146

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C11.8.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Nasofaryngealt angiofibrom (juvenilt)	91600/b		501/b
Schmincketumör (lymfoepiteliom/lymfoepiteliomlikt carcinom) (C11.2)	80823		166

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

FOSSA PIRIFORMIS

C12

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Fossa (sinus) piriformis	C12.9	C12.9	C12	148.1	147

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

NEDRE SVALG (HYPOFARYNX, LARYNGOFARYNX)

C13

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Postkrikoidalt rum, (krikofarynx)	C13.0	C13.0	C13.0	148.0	147
Aryepiglottiska veckets hypofaryngeala del eller aryepiglottiska vecket UNS	C13.1	C13.1	C13.1	148.9	147
Bakre vägg	C13.2	C13.2	C13.2	148.9	147
Överväxt till/från angränsande sublokal inom nedre svalg (C13) med okänt ursprung	C13.8	C13.9	C13.9	148.9	147
Nedre svalg UNS	C13.9	C13.9	C13.9	148.9	147
Svalg (laryngofarynx)	C13.9	C14.1	C14.1	149.9	148
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C13, se nedan		C13.8	C13.8	148.8	147

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

- Exkluderar tumör i fossa piriformis (C12.9) och laryngeala delen av aryepiglottiska vecket (C32.1).
- Laryngofarynx registreras enligt ICD-O/3 på läge C13.9, registrerades enligt ICD-O/2 på läge C14.1 med angivande av ICD9 (149.9) och ICD7 (148).

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C13.8.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ANNAN OCH OFULLSTÄNDIGT ANGIVEN LOKALISATION I LÄPP, MUNHÅLA OCH SVALG

C14

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Svalg UNS	C14.0	C14.0	C14.0	149.9	148
Waldeyers ring (lymfoid vävnad)	C14.2	C14.2	C14.2	149.9	148
Överväxt till/från läpp, munhåla och svalg (C00-C14) med okänt ursprung	C14.8	C14.9	C14.9	149.9	148

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

- Laryngofarynx registreras enligt ICD-O/3 på läge C13.9, registrerades i ICD-O/2 på läge C14.1 med angivande av ICD9 (149.9) och ICD7 (148).

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

MATSTRUPE (ESOFAGUS)

C15

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Cervikal del (tractus superioris) ≤18cm	C15.0	C15.0	C15.0	150.3	150.0
Övre tredjedel (proximala) 19-24cm	C15.3	C15.0	C15.0	150.3	150.0
Mellersta tredjedelen 25-32cm	C15.4	C15.1	C15.1	150.4	150.0
Nedre tredjedel (distala) 33- 40cm	C15.5	C15.2	C15.2	150.5	150.0
Överväxt till/från angränsande sublokal inom matstrupe (C15) med okänt ursprung	C15.8	C15.9	C15.9	150.9	150.9
Matstrupe UNS	C15.9	C15.9	C15.9	150.9	150.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C15, se nedan		C15.8	C15.8	150.8	150.8

INCA: startår 2006, maligna tumörer.

Kommentar:

- Topografisk lokal enligt gällande TNM klassifikation (6:e upplagan från 2002) baserad på avstånd i cm från tandraden.
- Tumörer utgående från matstrupens mellersta del (C15.1) samt tumörer utgående från matstrupens nedre del (C15.2), lägen som tidigare använts vid registrering, är nu ersatta av läge C15.4 respektive C15.5.
- Med Barretts esofagus avses förekomst av ventrikelslemhinna i matstrupen.

Multifokal lokalisering:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C15.8.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom, intestinal typ	81443		096
Barrett's esofagus med adenocarcinom	81403		096

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

MAGSÄCK (VENTRIKEL)

C16

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Cardia UNS (övre magmun, gastroesofageal gränsson)	C16.0	C16.0	C16.0	151.0	151.1
Fundus (övre del av magsäck)	C16.1	C16.1	C16.1	151.3	151.0
Corpus (mellersta delen)	C16.2	C16.2	C16.2	151.4	151.0
Antrum (nedre del)	C16.3	C16.3	C16.3	151.1	151.0
Pylorus (nedre magmun)	C16.4	C16.4	C16.4	151.1	151.0
Curvatura minor UNS	C16.5	C16.5	C16.5	151.4	151.0
Curvatura major UNS	C16.6	C16.6	C16.6	151.4	151.0
Överväxt till/från angränsande sublokal inom magsäck (C16) med okänt ursprung	C16.8	C16.9	C16.9	151.9	151.9
Magsäck UNS	C16.9	C16.9	C16.9	151.9	151.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C16, se nedan		C16.8	C16.8	151.8	151.8

INCA: startår 2006, maligna tumörer.

Kommentar:

- Carcinoider utgår oftast från ileum, men även från övriga delar av tarmen, bronker, magsäck, pankreas, thyreoidea:
 - Foregut-carcinoider = vanligen i ventrikel, duodenum och pankreasvävnad
 - Midgut-carcinoider = vanligen i jejunum, ileum och colon ascendens
 - Hindgut-carcinoider = vanligen i distala delen av colon och rektum

Multifokal lokalisering:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst, Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C16.8.

För morfologisk typ se nästa sida.

forts C16

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom, som enbart invaderar stromat	81402/b		094/b
Adenocarcinom, intestinal typ	81443		096
Adenocarcinom, intramukosalt	84802/b		094/b
Apudom	82481		441
Carcinoid	82403		086
ECL-om (enterokromaffinlik cell carcinoid), UNS	82421		441
ECL-om (enterokromaffinlik cell carcinoid), malign	82423		446
Gastrinom UNS	81531		441
Gastrinom malignt	81533		446
Gastrincellstumör UNS	81531		441
Gastrincellstumör malign	81533		446
G-cellstumör UNS	81531		441
G-cellstumör malign	81533		446
GIST (gastrointestinalt stromacellssarkom), malign	89363		796
GIST, UNS/ oklar malign potential	89361		793
Linitis plastica	81423		096
Signetringscellscarcinom	84903		096
Tubulovillösa adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82632/b		094/b
Tubulära adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82102/b		094/b
Villösa adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82612/b		094/b

Kommentar

- Adenocarcinom i gastrointestinaltraktus, som enbart invaderar stromat (bindväven) i själva slemhinnan, skall uppfattas som adenocarcinom in situ och registreras med Morf-kod 81402/b, C24/hist 094/b.
- Slemhinnan begränsas av ett tunt muskellager ("lamina muscularis mucosae"). Först när genomväxt av detta lager ägt rum är förändringen att betrakta (och registrera) som invasivt växande adenocarcinom och registreras med Morf-kod 81403, C24/hist 096.
- Alla GIST-tumörer skall registreras enligt ovan.
- Malign GIST-tumör registrerades tidigare enligt ICD-O/2 med Morf-kod 88003 C24/hist 796.
- Misstänkt GIST kan ej användas, men om den är angiven registrera Morf-kod 80001 C24/hist 993.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

TUNNTARM

C17

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Duodenum (tolvfingertarm)	C17.0	C17.0	C17.0	152.0	152.0
Jejunum (övre del av tunntarm)	C17.1	C17.1	C17.1	152.1	152.7
Ileum (nedre del av tunntarm) (exkl ileocekal gränszon/valvula Bauhini)	C17.2	C17.2	C17.2	152.2	152.7
Meckels divertikel	C17.3	C17.3	C17.3	152.2	152.7
Överväxt till/från angränsande sublokal inom tunntarm (C17) med okänt ursprung	C17.8	C17.9	C17.9	152.9	152.9
Tunntarm UNS	C17.9	C17.9	C17.9	152.9	152.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C17, se nedan		C17.8	C17.8	152.8	152

INCA: saknas.

Kommentar:

- Periapullära regionen räknas till ampulla/papilla Vateri och registreras enligt ICD-O/3 på läge C24.1.
- Tarmkanalen, icke specificerad lokalisation, skall registreras på läge C26.0.
- Carcinoider utgår oftast från ileum, men även från övriga delar av tarmen, bronker, magsäck, pankreas, thyreoidea:
 - Foregut-carcinoider = vanligen i ventrikel, duodenum och pankreasvävnad
 - Midgut-carcinoider = vanligen i jejunum, ileum och colon ascendens
 - Hindgut-carcinoider = vanligen i distala delen av colon och rektum

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C17.8.

Se kommentar nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-Kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Tubulovillösa adenom med höggradig dysplasi (HGD)/gravatypi	82632/b		094/b
Tubulära adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82102/b		094/b
Villösa adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82612/b		094/b

Kommentar

- Adenocarcinom i gastrointestinaltraktus, som enbart invaderar stromat (bindväven) i själva slemhinnan, skall uppfattas som adenocarcinom in situ och registreras med Morf-kod 81402/b, C24/hist 094/b.
- Slemhinnan begränsas av ett tunt muskellager ("lamina muscularis mucosae"). Först när genomväxt av detta lager ägt rum är förändringen att betrakta (och registrera) som invasivt växande adenocarcinom och registreras med Morf-kod 81403, C24/hist 096.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

TJOCKTARM (COLON)

C18

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Caecum (blindtarm)	C18.0	C18.0	C18.0	153.4	153.0
Valvula Bauhini (ileocekal gränzon)	C18.0	C18.0	C18.0	153.6	153.0
Appendix vermiformis (blindtarmens maskformiga bihang)	C18.1	C18.1	C18.1	153.5	153.4
Ascendens (höger colon)	C18.2	C18.2	C18.2	153.6	153.0
Flexura hepatica (höger flexur)	C18.3	C18.3	C18.3	153.0	153.1
Transversum	C18.4	C18.4	C18.4	153.1	153.1
Flexura lienalis (vänster flexur)	C18.5	C18.5	C18.5	153.7	153.1
Descendens (vänster colon)	C18.6	C18.6	C18.6	153.2	153.2
Sigmoideum	C18.7	C18.7	C18.7	153.3	153.3
Överväxt till/från angränsande sublokal inom tjocktarm (C18) med okänt ursprung	C18.8	C18.9	C18.9	153.9	153.9
Tjocktarm UNS	C18.9	C18.9	C18.9	153.9	153.9

INCA: Startår 2007, maligna tumörer.

Kommentar:

- Rektosigmoidala gränzonen skall registreras på läge C19.9.
- Tarmkanalen, icke specificerad lokalisation skall registreras på läge C26.0.
- Vid läge appendix är diagnosen misstänkt carcinoid icke möjlig att registrera. Efterhör om diagnosen blivit fastställd, om inte avskrivs fallet.
- Carcinoider utgår oftast från ileum, men även från övriga delar av tarmen, bronker, magsäck, pankreas, thyreoidea:
 - Foregut-carcinoider = vanligen i ventrikel, duodenum och pankreasvävnad
 - Midgut-carcinoider = vanligen i jejunum, ileum och colon ascendens
 - Hindgut-carcinoider = vanligen i distala delen av colon och rektum
- Vid syndromet familjär polypos uppträder tumörer i colon och/eller rektum. Vid detta tillstånd registreras endast en premalign tumör med Morf-kod 82200/b C24 094/b samt en malign tumör med Morf-kod 82203 C24 096, oavsett antal tumörer och lokalisation. Om den första registrerade tumören är malign registreras ej eventuell tillkommande precancerös förändring.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisation översätts dessa till ICD-O/2 läge C18.8.

Morfologisk typ	forts C18		
	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom utgående från adenomatösa polyper i colon och/eller rektum hos patient med multipla adenomatösa polyper, som ej har diagnosen familjär polypos	82213		096
Blandtumörer carcinoid och adenocarcinom	82443		086/096
Carcinoid i appendix vermiformis	82401		086
Familjär polypos, adenocarcinom	82203		096
Familjär polypos, precanceröst adenom/precancerös adenomatos	82200/b		094/b
Gobletcell/mucinös carcinoid	82433		096
Mucinöst adenocarcinom	84803		096
Mucinöst adenocarcinom icke infiltrativt	84802/b		094/b
Tubulovillösa adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82632/b		094/b
Tubulära adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82102/b		094/b
Villösa adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82612/b		094/b

Kommentar:

- Adenocarcinom i gastrointestinaltraktus, som enbart invaderar stromat (bindväven) i själva slemhinnan, skall uppfattas som adenocarcinom in situ och registreras med Morf-kod 81402/b, C24/hist 094/b.
- Slemhinnan begränsas av ett tunt muskellager ("lamina muscularis mucosae"). Först när genomväxt av detta lager ägt rum är förändringen att betrakta (och registrera) som invasivt växande adenocarcinom och registreras med Morf-kod 81403, C24/hist 096.
- Rena carcinoider registreras som Morf-kod 82403 oavsett subgrupp.
- Vid blandtumörer med carcinoid komponent skall inte längre den endokrina komponenten styra C24/hist koden utan denna väljs efter dominerande tumör komponent. 2010-01-01.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ÖVERGÅNG ÄNDTARM-TJOCKTARM

C19

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Övergång ändtarm-tjocktarm (rektosigmoidal gränszon)	C19.9	C19.9	C19	154.0	154.0

Kommentar:

- För patienter med tidigare tumör i lokalen, där man erhåller en ny canceranmälan, överväg om den "nya" tumören skall registreras eller om den skall bedömas som ett recidiv. Beslut fattas efter samråd med kliniker.
- Tarmkanalen, icke specificerad lokalisation skall registreras på läge C26.0.
- Carcinoider utgår oftast från ileum, men även från övriga delar av tarmen, bronker, magsäck, pankreas, thyreoidea:
 - Foregut-carcinoider = vanligen i ventrikel, duodenum och pankreasvävnad
 - Midgut-carcinoider = vanligen i jejunum, ileum och colon ascendens
 - Hindgut-carcinoider = vanligen i distala delen av colon och rektum
- Vid syndromet familjär polypos uppträder tumörer i colon och/eller rektum. Vid detta tillstånd registreras endast en premalign tumör med Morf-kod 82200/b C24 094/b samt en malign tumör med Morf-kod 82203 C24 096, oavsett antal tumörer och lokalisation. Om den första registrerade tumören är malign registreras ej eventuell tillkommande precancerös förändring.

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom utgående från adenomatösa polyper i colon och/eller rektum hos patient med multipla adenomatösa polyper, som ej har diagnosen familjär polypos	82213		096
Familjär polypos, precancerös adenomatos	82200/b		094/b
Familjär polypos, adenocarcinom	82203		096
Mucinöst adenocarcinom	84803		096
Mucinöst adenocarcinom icke infiltrativt	84802/b		094/b
Tubulovillösa/adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82632/b		094/b
Tubulära/adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82102/b		094/b
Villösa /adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82612/b		094/b

Kommentar:

- Adenocarcinom i gastrointestinaltraktus, som enbart invaderar stromat (bindväven) i själva slemhinnan, skall uppfattas som adenocarcinom in situ och registreras med Morf-kod 81402/b, C24/hist 094/b.
- Slemhinnan begränsas av ett tunt muskellager ("lamina muscularis mucosae"). Först när genomväxt av detta lager ägt rum är förändringen att betrakta (och registrera) som invasivt växande adenocarcinom och registreras med Morf-kod 81403, C24/hist 096.
- Rena carcinoider registreras som Morf-kod 82403 oavsett subgrupp.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ÄNDTARMEN (RECTUM)

C20

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Ändtarm UNS	C20.9	C20.9	C20	154.1	154.0

INCA: startår 2007, maligna tumörer

Kommentar:

- För patienter med tidigare tumör i lokalen då man erhåller en ny canceranmälan, kan tidigare operationsmetod ha betydelse. Överväg om den nya "tumören" skall registreras eller om den skall bedömas som ett recidiv.
- Skivepitelcarcinom kan förekomma, men läget bör kontrolleras för att utesluta överväxt från analkanal (C21).
- Tarmkanalen, icke specificerad lokalisation, skall registreras på läge C26.0.
- Om flera primära tumörer diagnostiseras samtidigt, skall var och en registreras för sig.
- Vid syndromet familjär polypos förekommer tumörer i colon och/eller rektum. Vid detta tillstånd registreras endast en premalign tumör med Morf-kod 82200/b C24/hist 094/b samt en malign tumör med Morf-kod 82203 C24/hist 096, oavsett antal tumörer och lokalisation.
- Carcinoider utgår oftast från ileum, men även från övriga delar av tarmen, bronker, magsäck, pankreas, thyreoidea:
 - Foregut-carcinoider = vanligen i ventrikel, duodenum och pankreasvävnad
 - Midgut-carcinoider = vanligen i jejunum, ileum och colon ascendens
 - Hindgut-carcinoider = vanligen i distala delen av colon och rektum

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom utgående från adenomatösa polyper i colon och/eller rektum hos patient med multipla adenomatösa polyper, som ej har diagnosen familjär polypos	82213		096
Familjär polypos, precancerös adenomatos	82200/b		094/b
Familjär polypos, adenocarcinom	82203		096
Mucinöst adenocarcinom	84803		096
Mucinöst adenocarcinom icke infiltrativt	84802/b		094/b
Tubulovillösa adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82632/b		094/b
Tubulära adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82102/b		094/b
Villösa adenom med höggradig dysplasi (HGD)/grav atypi	82612/b		094/b

Kommentar:

- Adenocarcinom i gastrointestinaltraktus, som enbart invaderar stromat (bindväven) i själva slemhinnan, skall uppfattas som adenocarcinom in situ och registreras med Morf-kod 81402/b, C24/hist 094/b.
- Slemhinnan begränsas av ett tunt muskellager ("lamina muscularis mucosae"). Först när genomväxt av detta lager ägt rum är förändringen att betrakta (och registrera) som invasivt växande adenocarcinom och registreras med Morf-kod 81403, C24/hist 096.
- Rena carcinoider registreras som Morf-kod 82403 oavsett subgrupp.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ANUS (ÄNDTARMSÖPPNING) OCH ANALKANALEN

C21

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Anus UNS	C21.0	C21.0	C21.0	154.2	154.1
Analkanalen inkl analsfinktern (ringmuskeln)	C21.1	C21.1	C21.1	154.2	154.1
Kloakogen zon	C21.2	C21.2	C21.2	154.2	154.1
Överväxt till/från angränsande sublokal inom rektum/anus (C20-C21) med okänt utgångsläge i rektum/anus	C21.8	C26.0	C21.9	159.0	153.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C21, se nedan	C21.9	C21.8	C21.8	154.8	154.8

INCA: saknas

Kommentar:

- Analkanals nedre/ytte begränsning utgöres av övergången anal slemhinna/perianal hud. Denna övergång kan lägesmässigt variera mellan olika individer. För att inga slemhinnerelaterade tumörer skall missas, skall alla tumörer belägna inom ett område med diameter 5 cm med analöppningen som centrum, dvs. inom 2,5 cm radie, registreras på läge C21.0 enligt långvarig praxis. Om tumören är belägen utanför detta område registreras den på läge ICDO/3 C44.5 alternativt vulva, dvs. läge ICDO/3 C51.9 kan vara ett alternativ.
- OBS! Basaloid och kloakogen cancer i analregion får ej förväxlas med basalcellscancer i huden.**

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C21.8.

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
AIN III- anal intraepitelial neoplasi grad III (skivepitel)	80772/b		144/b
Basaloid cancer (C21.1)	81233		126
Malignt melanom UNS	87203		176
Kloakogen cancer (C21.2)	81243		126
Mb Paget extramammär	85423		096
Mucosalt lentiginöst melanom in situ	87462/b		174/b
Mucosalt lentiginöst melanom	87463		176
Skivepitelcancer	80703		146

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

LEVER (HEPAR) OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR

C22

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Lever	C22.0	C22.0	C22.0	155.0	155.0
Intrahepatiska gallvägar	C22.1	C22.1	C22.1	155.1	155.0

INCA: Startår 2008.

Kommentar:

- Vid läge lever, kontrollera att tumören är primär och inte en metastas.
- Registrering av levertumör, oklart om primär eller sekundär = metastas, har ändrats enligt nedan:
Levertumör UNS registreras enligt ICD-O/3 läge C80.9, ICD9 155.2, ICD7 156. Dessa tumörer registrerades enligt ICD-O/2 på läge C22.9, övriga klassifikationer är oförändrade.
- Ej histologiskt verifierad Klatskin-tumör (adenocarcinom som utgår från gallvägarna i leverhilus, kan vara både intra- och extrahepatiska) registreras på läge C24.8, Morf-kod 80003 och C24/hist 996.
- Övriga levertumörer utan histopatologisk diagnos registreras på läge C80.9.
- Annan laboratorieundersökning (diagnosgrund 8) kan nu användas som underlag för specificerad Morf-kod, C24/hist.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Biliärt carcinom (C22.1)	81603		076
Cholangiocellulärt carcinom (C22.1)	81603		076
Gallgångscarcinom (C22.1)	81603		076
Hepatoblastom	89703		886
Hepatocellulärt carcinom, UNS	81703		066
Hepatocellulärt och cholangiocellulärt carcinom blandat	81803		096
Klatskintumör (C22.1)	81623		076
Kupffercellssarkom (C22.0)	91243		706
Levercellsadenom	81700/b		061/b
Levercellscarcinom	81703		066

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

GALLBLÅSA (VESICA FELLAE)

C23

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Gallblåsa	C23.9	C23.9	C23	156.0	155.1

INCA: Startår 2008.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ANDRA OCH OSPECIFICERADE DELAR AV GALLVÄGSSYSTEMET

C24

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Extrahepatiska gallvägar (ductus hepaticus, ductus choledochus, ductus cysticus)	C24.0	C24.0	C24.0	156.1	155.2
Ampulla / papilla Vateri inkl. periampullära regionen	C24.1	C24.1	C24.1	156.2	155.3
Ampullär zon	C24.1	C17.0	C17.0	152.0	152.0
Överväxt till/från angränsande sublokal inom intrahepatiska och extrahepatiska gallvägar (C22.1-C24) med okänt ursprung	C24.8	C24.9	C24.9	156.9	155.9
Gallvägssystemet UNS (intra- och extrahepatiska delar)	C24.9	C24.9	C24.9	156.9	155.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C24, se nedan		C24.8	C24.8	156.8	155.8

INCA: Startår 2008.

Kommentar:

- Vid läge lever, kontrollera att tumören är primär och inte en metastas.
- Registrering av levertumör, oklart om primär eller sekundär = metastas, har ändrats enligt nedan:
Levertumör UNS registreras enligt ICD-O/3 läge C80.9, ICD9 155.2, ICD7 156. Dessa tumörer registrerades enligt ICD-O/2 på läge C22.9, övriga klassifikationer är oförändrade.
- Ej histologiskt verifierad Klatskin-tumör (adenocarcinom som utgår från gallvägarna i leverhilus, kan vara både intra- och extrahepatiska) registreras på läge C24.8, Morf-kod 80003 och C24/hist 996.
- Övriga levertumörer utan histopatologisk diagnos registreras på läge C80.9.
- Annan laboratorieundersökning (diagnosgrund 8) kan nu användas som underlag för specificerad Morf-kod, C24/hist.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisation översätts dessa till ICD-O/2 läge C21.8.

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Biliärt carcinom, extrahepatiskt (C24.0)	81603		076
Cholangiocellulärt carcinom	81603		076
Gallgångscarcinom (C24.0)	81603		076
Gallgångscarcinom, extrahepatiskt (C24.0)	81603		076
Klatskintumör (C24.0)*	81623		076

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

BUKSPOTTKÖRTELN (PANCREAS)

C25

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Caput (huvud)	C25.0	C25.0	C25.0	157.0	157
Corpus (kropp)	C25.1	C25.1	C25.1	157.1	157
Cauda (svans)	C25.2	C25.2	C25.2	157.2	157
Ductus (pankreasgång)	C25.3	C25.3	C25.3	157.3	157
Langerhanska öarna (endokrin del av pankreas)	C25.4	C25.4	C25.4	157.4	195.5
Överväxt till/från angränsande sublokal inom bukspottkörtel (C25) med okänt ursprung	C25.8	C25.9	C25.9	157.9	157
Bukspottkörteln UNS	C25.9	C25.9	C25.9	157.9	157
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C25, se nedan		C25.8	C25.8	157.8	157

INCA: startår 2010.

Kommentar:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av bröst. Varje tumör Registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp(= morfologi).
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C25.8.

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Acinärt (adeno-)carcinom utgåendet från exokrin del	85503		066
Adenom av endokrin typ (C25.4)	81500		091
Blandat exokrint/endokrint carcinom	81543		096
Endokrint carcinom, högt differentierat (C25.4)	81503		096
Endokrint carcinom, lågt differentierat/småcelligt (C25.4)	80413		196
Endokrint carcinom, ACTH-producerande med Cushings syndrom (C25.4)	81503		096
Endokrint carcinom, serotoninproducerande med carcinoidsyndrom (C25.4)	82413		096
Gastrinom UNS (C25.4)	81531		441
Gastrinom, malignt (C25.4)	81533		446
Glukagonom UNS (C25.4)	81521		441
Glukagonom, malignt (C25.4)	81523		446
Insulinom UNS (C25.4)	81510		091
Insulinom malignt (C25.4)	81513		096
Intraduktal papillärt mucinöst carcinom, icke invasivt	84532/b		094/b
Intraduktal papillärt mucinöst carcinom, invasivt	84533		096
Mucinös kystadenocarcinom, icke invasivt	84702/b		094/b
Pancreascancer UNS	81403		096
PanIN-3, adenocarcinom in situ	81402		094
Ö-cellsadenocarcinom blandat och exokrint adenocarcinom	81543		096
Ö-cellscarcinom (C25.4)	81503		096
Ö-cellstumör/ adenom, benignt (C25.4)	81500		091
Ö-cellstumör UNS (C25.4)	81501		091

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

MATSMÄLTNINGSORGAN

C26

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Tarmkanalen (C17 - C21) UNS	C26.0	C26.0	C26.0	159.0	153.9
Överväxt till/från angränsande organ med okänt ursprung, som inte kan klassificeras på (C15 - C26)	C26.8	C26.9	C26.8	159.9	199.3
Gastrointestinalkanalen (C15 - C21) UNS	C26.9	C26.9	C26.9	159.9	199.3
Digestionsorganen (C22 - C25) UNS					
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C26, se nedan		C26.8	C26.8	159.9	199.3

INCA: saknas.

Kommentar:

- Munhåla och svalg C01-C14 ingår ej.
- Exkluderar tumör utgående från analhuden, registreras på läge C44.5 enligt ICD-O/3 (se kommentar C21 alternativt C44).
- Exkluderar tumör utgående från gallvägar UNS som registreras på läge C24.9

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C26.8.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

NÄSHÅLA OCH MELLANÖRA

C30

Kliniskt läge		ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Näshåla:	inre näsrum	C30.0	C30.0	C30.0	160.0	160.0
	näsbrosk	C30.0	C30.0	C30.0	160.0	160.0
	näsmusslor	C30.0	C30.0	C30.0	160.0	160.0
	nässeptum (nässkiljevägg) UNS	C30.0	C30.0	C30.0	160.0	160.0
	näsvestibul	C30.0	C30.0	C30.0	160.0	160.0
Mellanöra:	Eustachiska röret (örontrumpeten)	C30.1	C30.1	C30.1	160.1	160.1
	inneröra	C30.1	C30.1	C30.1	160.1	160.1

INCA: Startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

Exkluderar tumör utgången från:

- Bakre kanten av nässeptum och koanerna (C11.3)
- Hörselgångens ben (C41.0)
- Luktnerve inkl luktbulb (C72.2)
- Näsa UNS (C76.0)
- Näsben (C41.0)

För morfologi se nästa sida.

forts C30

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Blandtumör (mixed tumor), malign	89403		046
Epitelialt-myoepitelialt carcinom	85623		196
Estesioneuroblastom	95223		426
Estesioneurocytom	95213		426
Estesioneuroepiteliom	95233		426
Malignt pleomorft adenom	89413		046
Myoepitelialt carcinom	89823		196
Näspapillom, äkta (inverterat)/ Schneiders papillom*	81211/b		115/b
Salivary ductal carcinoma (spottkörtelgångscarcinom)	85003		096
Schneiders carcinom	81213		116
Övergångsepitelpapillom/transitional cell papilloma	81211/b		115/b

Kommentar:

- *Registrerades enligt ICD-O/2 med Morf-kod 80501/b C24/hist 115/b.
- Övergångsepitelpapillom (transitional cell papilloma) registrerades enligt ICD-O/2, med Morf-kod 81200/b C24/hist 115/b, tolkades då som icke namngivna Schneiderpapillom.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

NÄSANS BIHÅLOR (SINUS)

C31

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Maxillarsinus (överkäkshåla)	C31.0	C31.0	C31.0	160.2	160.2
Etmoidalsinus (silbenshåla)	C31.1	C31.1	C31.1	160.3	160.7
Frontalsinus (pannhåla)	C31.2	C31.2	C31.2	160.4	160.7
Sfenoidalsinus (kilbenshåla)	C31.3	C31.3	C31.3	160.5	160.7
Överväxt till/från angränsande sublokal inom näsans bihålor (C31) med okänt ursprung	C31.8	C31.9	C31.9	160.9	160.9
Näsans bihålor UNS	C31.9	C31.9	C31.9	160.9	160.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C31, se nedan		C31.8	C31.8	160.8	160.8

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). **Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.**
- Vid flera, samtidigt diagnostiserade, tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C31.8.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Blandtumör (mixed tumor), malign	89403		046
Epitelialt-myoepitelialt carcinom	85623		196
Malignt pleomorft adenom	89413		046
Myoepitelialt carcinom	89823		196
Näspapillom, äkta (inverterat)/Schneiders papillom*	81211/b		115/b
Schneiders carcinom	81213		116
Övergångsepitelpapillom/transitional cell papilloma	81211/b		115/b

Kommentar:

- *Registrerades enligt ICD-O/2 med Morf-kod 80501/b C24/hist 115/b.
- Övergångsepitelpapillom (transitional cell papilloma) registrerades enligt ICD-O/2, med Morf-kod 81200/b C24/hist 115/b.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

STRUPHUVUD (LARYNX)

C32

Kliniskt läge		ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
* Glottis:	inre larynx	C32.0	C32.0	C32.0	161.0	161
	ähta stämband UNS	C32.0	C32.0	C32.0	161.0	161
Supraglottis (larynx övre del):	aryepiglottiska veckets laryngeala del	C32.1	C32.1	C32.1	161.1	161
	epiglottis bakre laryngeala del	C32.1	C32.1	C32.1	161.1	161
	epiglottis suprahoidala del	C32.1	C32.1	C32.1	161.1	161
	epiglottis UNS	C32.1	C32.1	C32.1	161.1	161
	falska stämband /fickband	C32.1	C32.1	C32.1	161.1	161
	ventriculus laryngis	C32.1	C32.1	C32.1	161.1	161
Subglottis (larynx undre del)		C32.2	C32.2	C32.2	161.2	161
Larynxbrosk		C32.3	C32.3	C32.3	161.3	161
Överväxt till/från angränsande sublokal inom struphuvud (C32) med okänt ursprung		C32.8	C32.9	C32.9	161.9	161
Larynx UNS		C32.9	C32.9	C32.9	161.9	161
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C32, se nedan			C31.8	C32.8	161.8	161

INCA: Startår 2008, maligna tumörer.

Kommentar:

Exkluderar tumör utgången från:

- Aryepiglottiska veckets hypofaryngeala del (C13.1)
- Aryepiglottiska vecket UNS (C13.1)
- Epiglottis främre yta och fria kanter (C10.1)
- vallecula epiglottica (C10.0)

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). **Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.**
- Vid flera, samtidigt diagnostiserade, tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C32.8.

* Obligatorisk sidoangivelse: 1=höger, 2=vänster, 9=okänd sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Kondrosarkom (C32.3)	92203		736

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

LUFTSTRUPE (TRACHEA)

C33

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Luftstrupe (trachea)	C33.9	C33.9	C33	162.0	162.0

INCA: Saknas.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

LUFTRÖR (BRONK) OCH LUNGA

C34

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Huvudbronk (stambronk) inkl carina, lunghilus	C34.0	C34.0	C34.0	162.2	162.1
*Överlob och lingula (vänster sida), inkl. både bronk och lunga	C34.1	C34.1	C34.1	162.3	162.1
*Mellanlob (höger sida), inkl. både bronk och lunga	C34.2	C34.2	C34.2	162.4	162.1
*Underlob, inkl. både bronk och lunga	C34.3	C34.3	C34.3	162.5	162.1
Överväxt till/från angränsande sublokal inom bronk eller lunga (C34) med okänt ursprung	C34.8	C34.9	C34.9	162.9	162.1
*Bronk eller lunga UNS	C34.9	C34.9	C34.9	162.9	162.1
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C34, se nedan		C34.8	C34.8	162.8	162.1

INCA: startår 2008, maligna tumörer.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C34.8.

*Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom, blandat med andra typer av carcinom inkl skivepitel-och småcelligt carcinom	82553		196
Adenocarcinom, bronkiolärt-alveolärt (bronkiolärt carcinom)	82503		076
Blastom, pulmonärt (pneumoblastom, lungblastom)	89723		896
Carcinoid, blandat med adenocarcinom	82443		086
Carcinom, icke småcelligt UNS *	80463		196
Carcinom, småcelligt UNS	80413		186
Carcinom, småcelligt, anaplastiskt	80413		196
Carcinom, småcelligt, fusiformt	80433		186

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod C24/hist ICD-O/2
Carcinom, småcelligt, intermediärt	80443	186
Carcinom, storcelligt UNS	80123	196
Oatcellscarcinom	80423	186
Tumoret UNS	80401/b	993/b
Typiska (lung)carcinoider	82403	086
Atypiska (lung)carcinoider	82493	086
Storcellig neuroendokrin lungcancer	80133	446
Småcelligt (neuroendokrint) carcinom	80413	186

Kommentar:

- *Registrerades enligt ICD-O/2 med Morf-kod 80103 C24/hist 196 samt Morf-kod 80203, C24/hist 196.
- Registrering av tumör i bronk eller lunga, oklart om primär eller sekundär = metastas, har ändrats enl. nedan:
Registreras enligt ICD-O/3 på läge C80.9, ICD-O/2 C39.8, ICD9 165.9, ICD7 163.
- För morfologiska koder avseende spottkörtelassocierade tumörer, se läge C07 + C08.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

BRÄSS (TYMUS)

C37

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Bräss	C37.9	C37.9	C37.9	164.0	195.2

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Carcinom, tymiskt, UNS	85863		846
Tymiskt storcelligt B-cellslymfom	96793		306
Tymom, blandat, malignt	85823		846
Tymom, blandat, UNS	85821		841
Tymom, kortikalt, malignt	85843		846
Tymom, kortikalt, UNS	85841		841
Tymom, malignt, UNS	85803		846
Tymom, medullärt, malignt	85813		846
Tymom, medullärt, UNS	85811		846
Tymom, UNS	85801		841

INCA: saknas.

Kommentar:

- Tymom registreras alltid på läge C37.9, dvs även tumör utgående från ektopisk tymusvävnad.
- Alla tymom redovisas tillsammans som maligna tumörer.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

HJÄRTA (COR), LUNGMELLANRUM (MEDIASTINUM), C38 LUNGSÄCK (PLEURA)

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Hjärta, perikardium	C38.0	C38.0	C38.0	164.1	197.5
Främre mediastinum	C38.1	C38.1	C38.1	164.9	164
Bakre mediastinum	C38.2	C38.2	C38.2	164.9	164
Mediastinum UNS	C38.3	C38.3	C38.3	164.9	164
* Lungsäck UNS (parietal, visceral)	C38.4	C38.4	C38.4	163.9	162.2
Överväxt till/från angränsande sublokal inom hjärta, lungmellanrum, lungsäck (C38) med okänt ursprung	C38.8	C39.9	C39.9	165.9	199.9

Kommentar:

* Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (C38.3)	96793		306
Mesoteliom, bifasiskt, malignt (C38.0, C38.4)	90533		776
Mesoteliom, epiteloitt, malignt (C38.0, C38.4)	90523		776
Mesoteliom, fibröst, malignt (C38.0, C38.4)	90513		776
Mesoteliom, malignt UNS (C38.0, C38.4)	90503		776

Kommentar:

Maligna medellinjetumörer exempelvis gonadala tumörer, kan förekomma mediastinalt, föres på läge C38.3.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ANNAN OCH OFULLSTÄNDIGT ANGIVEN LOKALISATION I ANDNINGSORGAN OCH BRÖSTHÅLANS ORGAN

C39

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Övre luftvägar UNS (näshåla, svalg, struphuvud)	C39.0	C39.0	C39.0	165.9	161
Överväxt till/från angränsande sublokal inom andningsorgan resp brösthålans organ (C30-C39.0) med okänt ursprung	C39.8	C39.9	C39.9	165.9	199.9
Andningsorgan UNS	C39.9	C39.9	C39.9	165.9	199.9

INCA: Saknas.

Kommentar:

Registrering av tumör i bronk eller lunga, oklart om primär eller sekundär = metastas, har ändrats enl. nedan:

- Tumör i bronk eller lunga UNS registreras enligt ICD-O/3 på läge C80.9, ICD-O/2 C39.8, ICD9 165.9, ICD7 163.
- ICD7 saknar gemensam kod för övre luftvägar UNS, dessa registreras på struphuvud ICD7 161.
- Primär tumör i brösthåla UNS registreras på läge C76.1.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

EXTREMITETSSKELETTETS BEN, LEDER OCH LEDBROSK

C40

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Skulderblad och övre extremiteters långa ben samt tillhörande leder	C40.0	C40.0	C40.0	170.4	196.4
<i>Plasmocytom</i> skulderblad och övre extremiteters långa ben samt tillhörande leder	C40.0	C90.2	C90.2	203.9	203
Övre extremiteters korta ben samt tillhörande leder	C40.1	C40.1	C40.1	170.5	196.5
<i>Plasmocytom</i> övre extremiteters korta ben samt tillhörande leder	C40.1	C90.2	C90.2	203.9	203
Nedre extremiteters långa ben samt tillhörande leder	C40.2	C40.2	C40.2	170.7	196.7
<i>Plasmocytom</i> nedre extremiteters långa ben samt tillhörande leder	C40.2	C90.2	C90.2	203.9	203
Nedre extremiteters korta ben samt tillhörande leder	C40.3	C40.3	C40.3	170.8	196.8
<i>Plasmocytom</i> nedre extremiteters korta ben samt tillhörande leder	C40.3	C90.2	C90.2	203.9	203
Överväxt till/från angränsande sublokal inom ben, leder och ledbrosk (C40) med okänt ursprung	C40.8	C40.9	C40.9	170.9	196.9
<i>Plasmocytom</i> överväxt till/från angränsande sublokal inom ben, leder och ledbrosk (C40) med okänt ursprung	C40.8	C90.2	C90.2	203.9	203
Extremiteternas ben, leder och ledbrosk UNS	C40.9	C40.9	C40.9	170.9	196.9
<i>Plasmocytom</i> extremiteternas ben, leder och ledbrosk UNS	C40.9	C90.2	C90.2	203.9	203

INCA: Saknas.

Kommentar:

- Plasmocytom registreras enligt ICD-O/3 på läge C40, enligt ICD-O/2 C90.2, ICD-9 203.9, ICD-7 203.
- Mjukdelstumörer i skelett är ovanliga, kontrollera därför att det verkligen är en primärtumör.
- Extraskelletala former av kondrosarkom, Ewing sarkom och osteosarkom skall registreras på mjukdelar, läge C49.
- Synovialt sarkom skall registreras på mjukdelar, läge C49.

Obligatorisk sidoangivelse: 1=höger, 2=vänster, 9=okänd sida

För morfologisk typ se nästa sida.

forts C40

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adamantinom, malignt (långa rörben)	92613	92613	866
Ewing-sarkom	92603	92603	756
Fibrosarkom, periostalt	88123	88123	706
Jättecellstumör UNS	92501/b	92501/b	741/b
Jättecellstumör, malign	92503	92503	746
Kondromatos UNS	92201/b	92201/b	733/b
Kondrosarkom UNS	92203	92203	736
Kondrosarkom, dedifferentierat	92433	92203	736
Kondrosarkom, juxtakortikalt	92213	92213	736
Kondrosarkom, klarcelligt	92423	92203	736
Kondrosarkom, mesenkymalt	92403	92403	736
Kondrosarkom, myxoitt	92313	92313	736
Kordom UNS	93703	93703	886
Osteoblastom, aggressivt	92001/b	92001/b	733/b
Osteoklastom UNS	92501/b	92501/b	741/b
Osteoklastom, malignt	92503	92503	746
Osteokondromatos UNS	92101/b	92101/b	733/b
Osteosarkom UNS	91803	91803	766
Osteosarkom, centralt	91863	91803	766
Osteosarkom, fibroblastiskt	91823	91823	766
Osteosarkom, intraosseöst, högt differentierat	91873	91803	766
Osteosarkom, juxtakortikalt/parostealt	91923	91903	766
Osteosarkom, kondroblastiskt	91813	91813	766
Osteosarkom, periostealt	91933	91903	766
Osteosarkom, småcelligt	91853	91853	766
Osteosarkom utvecklat från Pagets sjukdom i ben	91843	91843	766
Osteosarkom, ytligt växande, högmalignt	91943	91903	766
Plasmocytom i skelett	97313	97313	336

Kommentar:

- Vid läge extremitetsskelettets ben, leder och ledbrosk, kontrollera att tumören är primär och inte en metastas.
- Morf-kod 80003 får inte förekomma, registreras på läge C80.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

BEN, LEDER OCH LEDBROSK I ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE LÄGEN

C41

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Skallens, ansiktets och överkäkens (maxill) ben och tillhörande leder	C41.0	C41.0	C41.0	170.0	196.0
<i>Plasmocytom</i> skallens, ansiktets och överkäkens (maxill) ben och tillhörande leder	C41.0	C90.2	C90.2	203.9	203
Underkäkens (mandibel) ben och käkleden	C41.1	C41.1	C41.1	70.1	196.1
<i>Plasmocytom</i> underkäkens (mandibel) ben och käkleden	C41.1	C90.2	C90.2	03.9	203
* Kotpelaren	C41.2	C41.2	C41.2	70.2	196.2
* <i>Plasmocytom</i> kotpelaren	C41.2	C90.2	C90.2	03.9	203
Revben, * bröstben (sternum) och nyckelben (klavikel) och tillhörande leder	C41.3	C41.3	C41.3	70.3	196.3
<i>Plasmocytom</i> revben, * bröstben (sternum) och nyckelben (klavikel) och tillhörande leder	C41.3	C90.2	C90.2	03.9	203
* Bäckben, korsben (sacrum), svansben (coccyx) med tillhörande leder inkl höftled	C41.4	C41.4	C41.4	70.6	196.6
* <i>Plasmocytom</i> bäckenben, korsben (sacrum), svansben (coccyx) med tillhörande leder inkl höftled	C41.4	C90.2	C90.2	03.9	203
Överväxt till/från angränsande sublokal som inte kan klassificeras under (C40-C41.4) med okänt ursprung	C41.8	C41.9	C41.9	70.9	196.9
<i>Plasmocytom</i> överväxt till/från angränsande sublokal som inte kan klassificeras under (C40-C41.4) med okänt ursprung	C41.8	C90.2	C90.2	03.9	203
Ben, leder och ledbrosk UNS (C40-C41.4)	C41.9	C41.9	C41.9	170.9	196.9
<i>Plasmocytom</i> i ben, leder och ledbrosk UNS (C40-C41.4)	C41.9	C90.2	C90.2	203.9	203

*Sidoangivelse gäller ej

INCA: Saknas.

Kommentar:

- Plasmocytom registreras enligt ICD-O/3 på läge C41, registrerades enligt ICD-O/2 på läge C90.2, ICD-9 203.9 och ICD-7 203.
- Mjukdelstumörer i skelett är ovanliga, kontrollera därför noggrant att det verkligen rör sig om en primärtumör.
- Extraskelletala former av kondrosarkom, Ewing-sarkom och osteosarkom skall registreras på mjukdelar, läge C49.
- Synovialt sarkom skall registreras på mjukdelar, läge C49.

För morfologisk typ se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adamantinom, malignt (ej långa rörben)	93103	93103	866
Ameloblastom, malignt	93103	93103	866
Ameloblastiskt odontosarkom	92903	92903	866
Ameloblastiskt fibrosarkom	93303	93303	866
Clear cell odontogenic tumör	93411	92701	861
Ewing-sarkom	92603	92603	756
Fibrosarkom, periostalt	88123	88123	706
Jättecellstumör i ben UNS	92501/b	92501/b	741/b
Jättecellstumör i ben, malign	92503	92503	746
Kondroblastom, malignt	92303	92303	736
Kondromatos UNS	92201/b	92201/b	733/b
Kondrosarkom UNS	92203	92203	736
Kondrosarkom, dedifferentierat	92433	92203	736
Kondrosarkom, juxtakortikalt	92213	92213	736
Kondrosarkom, klarcelligt	92423	92203	736
Kondrosarkom, mesenkymalt	92403	92403	736
Kondrosarkom, myxoitt	92313	92313	736
Kordom UNS	93703	93703	886
Odontogen carcinosarkom	93423	92703	866
Odontogen tumör UNS	92701/b	92701/b	861/b
Odontogen tumör, malign	92703	92703	866
Osteoblastom, aggressivt	92001/b	92001/b	733/b
Osteoklastom UNS	92501/b	92501/b	741/b
Osteoklastom, malignt	92503	92503	746
Osteokondromatos UNS	92101/b	92101/b	733/b
Osteosarkom UNS	91803	91803	766
Osteosarkom, centralt	91863	91803	766
Osteosarkom, fibroblastiskt	91823	91823	766
Osteosarkom, intraosseöst, högt differentierat	91873	91803	766
Osteosarkom, juxtakortikalt/parostealt	91923	91903	766
Osteosarkom, kondroblastiskt	91813	91813	766
Osteosarkom, periostealt	91933	91903	766
Osteosarkom, småcelligt	91853	91853	766
Osteosarkom utvecklat från Pagets sjukdom i ben	91843	91843	766
Osteosarkom, ytligt växande, högt differentierat	91943	91903	766
Plasmocytom i skelett, solitärt	97313	97313	336

Kommentar:

- Morf-kod 80003 får inte förekomma, tumör med denna kod registreras på läge C80.
- Adamantinom UNS 93100 var registreringspliktig initialt (1958) men har sedan länge tagits bort.
- Adamantinom och ameloblastom har samma Morf-kod men är olika tumörer. Adamantinom kan vara odontogena, men de kan också vara primära i långa rörben, se läge C40.
- Tänder saknar egen lägeskod, registreras på ICDO/3 C41.0 alternativt C41.1.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

HUD

C44

Malignt melanom

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Hud, läpp, över- och under	C44.0	C43.0	C43.0	172.0	190.3
* Hud, ögonlock övre och nedre samt ögonvrå	C44.1	C43.1	C43.1	172.1	190.1
* Hud ytteröra, inkl yttre hörselgång och vaxkörtel	C44.2	C43.2	C43.2	172.2	190.2
Hud, annan eller ospecificerad del av ansiktet	C44.3	C43.3	C43.3	172.3	190.3
Hud, skalp, hals och nacke	C44.4	C43.4	C43.4	172.4	190.4
Hud, bål inkl anus/perianalt, axill, ljumske och perineum (jfr vulva)	C44.5	C43.5	C43.5	172.5	190.5
* Hud, övre extremitet och axel/skuldra	C44.6	C43.6	C43.6	172.6	190.6
* Hud, nedre extremitet och höft	C44.7	C43.7	C43.7	172.7	190.7
Hud, överväxt till/från angränsande sublokal med okänt ursprung inom (C44)	C44.8	C43.9	C43.9	172.9	190.9
Hud UNS	C44.9	C43.9	C43.9	172.9	190.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C43, se nedan		C43.8	C43.8	172.8	190.8

INCA: Startår 2009, maligna/pricancerösa tumörer.

Kommentar:

- Läge för axill respektive ljumske ändrades 1993 i ICD-7 från 190.6 till 190.5 för axill och från 190.7 till 190.5 för ljumske.
- Vermilion border/det läpproda registreras på läge C00.0-C00.2
- Genital hud registreras enligt följande, labia majora på läge C51.0, labia minora på läge C51.1 och vulvahud UNS på läge C51.9, penishud UNS på läge C60.9 och skrotalhud UNS på läge C63.2.
- Analhud, se kommentar C21.
- Primärt malignt melanom i annan lokal, t ex öga, munhåla eller vagina, registreras på respektive läge.
- Primärt malignt melanom i mjukdelar (Morf-kod 90443) registreras på läge C49.
- **OBS! Melanom i underhudsfett/subcutan fettvävnad är vanligen metastas/er.**
- Melanomas i meninger/mjuka hjärnhinnor (Morf-kod 87283) registreras på läge C70.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså, oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt, registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till läge C44.8 i ICD-O/2.

*** Obligatorisk sidoangivelse:****1=höger 2=vänster 9=okänd sida**

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Akralt lentiginöst melanom (ALM)	87443		176
Akralt lentiginöst melanom in situ	87442/b		174/b
Amelanotiskt melanom (fr.o.m. 20080101)	87303		176
Atypisk Spitznevus (med stark malignitetsmisstanke)	87701/b		173/b
Ballongcellsmelanom	87223		176
Blandat epiteloid- och spolcellsmelanom (Spitzoitt melanom)	87703		176
Desmoplastiskt melanom	87453		176
Epiteloidcellsmelanom	87713		176
Lentigo maligna melanom (LMM)	87423		176
Lentigo maligna (in situ-form)	87422/b		174/b
Malign blå nevus (malignt melanom utvecklat ur en blå nevus)	87803		176
Melanocytär nevus med grav/stark atypi/dysplasi	87270/b		174/b
Melanom, malignt UNS	87203		176
Melanom, malignt, in situ UNS	87202/b		174/b
Melanom, malignt, misstänkt UNS	87201/b		173/b
Melanom, utvecklat ur kongental jättenevus (fr.o.m. 2010)	87613		
Melanom, utvecklat ur precancerös melanos (fr.o.m. 2010)	87413		
Melanos, precancerös	87412/b		174/b
Nodulärt melanom (NM)	87213		176
Regressivt melanom/tumorös melanos	87231/b		173/b
Spolcellsmelanom	87723		176
Superficiellt/ytspridande melanom (SSM)	87433		176
Superficiellt/ytspridande melanom in situ	87432/b		174/b

Kommentar:

- Mucosala melanom (lokaliserade till slemhinnor) registreras på respektive läge, vanligen C01-C06, C21, C51-C52 samt C60.
- Clarknivåer: I = in situ, II-V = infiltrerande
- Melanocytära nevi med grav/stark atypi/dysplasi (gravt/starkt dysplastiska nevi) skall registreras sedan 1 september 2003.
- In situ-melanom, liksom gravt dysplastisk nevus, är ett potentiellt förstadium till infiltrativt malignt melanom och i sig ej malignt. Misstänkta förstadier, t.ex. misstänkt lentigo maligna, är ej rapporteringspliktiga enligt föreskrifterna. Misstänkt malignt melanom avser infiltrativa former, som registreras med slutsiffra 1, om möjligt specificerat avseende typ, t.ex. lentigo maligna melanom med Morf-kod 87421, annars UNS med Morf-kod 87201.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

HUD

C44

Exklusive malignt melanom

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Hud, läpp, över- och under	C44.0	C44.0	C44.0	173.0	191.3
* Hud, ögonlock övre och nedre samt ögonvrå	C44.1	C44.1.	C44.1.	173.1	191.1
* Hud ytteröra, inkl yttre hörselgång och vaxkörtel	C44.2	C44.2	C44.2	173.2	191.2
Hud, annan eller ospecificerad del av ansiktet	C44.3	C44.3	C44.3	173.3	191.3
Hud, skalp, hals och nacke	C44.4	C44.4	C44.4	173.4	191.4
Hud, bål inkl anus/perianalt, axill, ljumske och perineum (jfr vulva)	C44.5	C44.5	C44.5	173.5	191.5
* Hud, övre extremitet och axel/skuldra	C44.6	C44.6	C44.6	173.6	191.6
* Hud, nedre extremitet och höft	C44.7	C44.7	C44.7	173.7	191.7
Hud, överväxt till/från angränsande sublokal med okänt ursprung inom C44	C44.8	C44.8	C44.9	173.8	191.8
Hud UNS	C44.9	C44.9	C44.9	173.9	191.9
Multifokalt läge registrerades i ICD-O/2 på läge C44.8, se nedan		C44.8	C44.8	173.8	191.8

INCA: Startår, 2009, maligna/premaligna tumörer.

Kommentar

- Läge för axill respektive ljumske ändrades 1993 i ICD-7 från 191.6 till 191.5 för axill och från 191.7 till 191.5 för ljumske.
- Vermilion border/det läpproda registreras på läge C00.0-00.2.
- Genital hud registreras enligt följande, labia majora på läge C51.0, labia minora på läge C51.1 och vulvahud UNS på läge C51.9, penishud UNS på läge C60.9 och skrotalhud UNS på läge C63.2.
- Analhud, se kommentar C21.
- Primärtumörer i underhudsfett/subcutan fettväv kan förekomma, men i denna lokal är överväxt eller metastaser vanligare, dvs. kontrollera om primär i lokalen.
- Basalcellsadenocarcinom är ej en hudtumör, registreras enligt ICD-O/3 på spottkörtel läge C06-C08.
- Basaloitt carcinom/basaloid cancer, är ej en hudtumör, registreras enligt ICD-O/3 på analkanal läge C21.1.

* Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C44.8.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adnexalt carcinom UNS	83903		046
Aktinisk keratos med grav/stark atypi/dysplasi (motsvarande skivepitelcancer in situ)	72850/b		144/b
Angiosarkoma UNS (fr.o.m 2010)	91403		566
Apokrint adenocarcinom UNS	84013		096
Atypiskt fibröst histiocyto/fibroblastom	88301/b		715/b
Cerumenioitt adenocarcinom (C44.2)	84203		046
Dermatofibrosarkoma protuberans	88323		715
Ekrint adenocarcinom UNS	84133		046
Ekrint porom, malignt/porocarcinom (fr.o.m. 20080101)	84093		046
Epidermoitt carcinom (skivepitelcancer)	80703		146
Epidermoitt carcinom, in situ (skivepitelcancer in situ)	80702/b		144/b
Epiteloitt sarkom (enligt Enzinger)	88043		796
Hårfollikelcarcinom	81023		046
Intraepidermalt eller intraepitelialt carcinom (skivepitelcancer in situ)	80702/b		144/b
Kaposi sarkom (sarkoma Kaposi)	91403		566
Lymfangiosarkoma UNS (fr.o.m. 2010)	91703		
Malignt pilomatrikom	81103		046
Merkelcellstumör/-carcinom	82473		446
Mikrocystiskt adnexalt carcinom	84073		046
Morbus Bowen (speciell typ av skivepitelcancer in situ)	80812/b		144/b
Morbus Paget, extramammär	85423		096
Neuroendokrint carcinom i hud, primärt	82473		446
Porocarcinom/ekrint porom, malignt (fr.o.m. 20080101)	84093		046
Sebaseöst carcinom	84103		046
Skleroserande svettkörtelgångscarcinom	84073		046
Svettkörtelcarcinom UNS	84003		046
Talgkörtelcarcinom	84103		046
Tricholemmalt carcinom	81023		046
Vaxkörtelcarcinom (C44.2)	84203		046
Verruköst/vårtliknande carcinom UNS (skivepitelcancer)	80513		146

Hudlymfom

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Kutant T-cellslymfom UNS	97093	97023	986
Mastocytom, kutant UNS	97401/b		381/b
Mastocytos, kutan malign	97413		386
Mastocytos, kutan, indolent/misstänkt malign	97411/b		381/b
Mycosis fungoides	97003		356
Primär kutan CD30+ T-cellslymfoproliferativ sjukdom, inkl. Lymfomatoid papulos	97183		386
Primärt kutant anaplastisk storcelligt lymfom	97183	97143	356/306
Primärt kutant CD30+ storcelligt T-cells lymfom	97183	97023	386

Kommentar

- Morbus Paget är alltid malign enligt ICD-O/3.
- Ett flertal varianter av maligna hudadnextumörer föreligger, framför allt inom svettkörtelgruppen, endast de viktigaste specificerade ovan.
- Carcinoma cuniculatum är en speciell typ av skivepitelcancer och kodas som "vanlig" skivepitelcancer, d.v.s. Morf-kod 80703.
- Jättekonfylom enligt Buschke är enligt ICD-O/3 benigt och ej rapporteringspliktigt.
- Basalcellsadenocarcinom är ej en hudtumör, registreras enligt ICD-O/3 på spottkörtel läge C06-C08.
- Basalcellscancer (basaliom), inklusive metatypisk form, rapporteras till eget register, alltså ej till cancerregistret.
- Basaloitt carcinom/basaloid cancer, är ej en hudtumör, registreras enligt ICD-O/3 på analkanal läge C21.1.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

PERIFERA NERVER, GANGLIER OCH AUTONOMT NERVSYSTEM

C47

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Huvud inkl ansikte samt hals (exkl perifera nerver och autonoma nervsystemet i orbita C69.6)	C47.0	C47.0	C47.0	171.0	193.3
* Övre extremitet och skuldra	C47.1	C47.1	C47.1	171.2	193.3
* Nedre extremitet och höft	C47.2	C47.2	C47.2	171.3	193.3
Bröstkorg och brösthåls inre organ	C47.3	C47.3	C47.3	171.4	193.3
Bukvägg och bukåls organ	C47.4	C47.4	C47.4	171.5	193.3
Bäckenågg inkl. säte** och ljumske samt bäckenåls organ	C47.5	C47.5	C47.5	171.6 171.3**	193.3
Bål UNS	C47.6	C47.6	C47.6	171.7	193.3
Överått till/från angränsande sublokal med okänt ursprung inom C47	C47.8	C47.9	C47.9	171.9	193.9
Perifiera nerver och ganglier UNS	C47.9	C47.9	C47.9	171.9	193.9
Tidigare i ICD-O/2 multifokalt i läge C47, se nedan		C47.8	C47.8	171.8	193.8

INCA: Saknas.

Kommentar:

**Säte översätts i ICD-9 till 171.3

Multifokal lokalisatlon:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, d.v.s. ett avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyper (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisatlon översätts dessa till ICD-O/2 läge C47.8.

* **Obligatorisk sidoangivelse: 1=höger, 2=vänster, 9=okänd sida.**

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICDO/3	Morf-kod ICDO/2	C24/hist
Epiteloid malign perifer nervskidetumör (MPNST)	95403	95403	456
Ganglioneuroblastom	94903	94903	406
Malign perifer nervskidetumör (MPNST) UNS	95403	95403	456
Malign perifer nervskidetumör med rhabdomyoblastisk differentiering	95613	95613	456
Malignt schwannom med rhabdomyoblastisk differentiering	95613	95613	456
Melanotisk MPNST	95403	95403	456
Melanotisk psammomatös MPNST	95403	95403	456
MPNST med körteldifferentiering	95403	95403	456
MPNST med mesenkymal differentiering	95403	95403	456
Neurilemmom, malignt	95603	95603	456
Neuroblastom UNS*	95003	95003	416
Neurofibrosarkom/neurogent sarkom/neurosarkom	95403	95403	456
Perifer neuroektodermal tumör	93643	93643	416
Perineuriom, malignt/perinealt MPNST	95713	95403	456
Schwannom, malignt	95603	95603	456
Triton-tumör, malign	95613	95613	456

Kommentar:

- **Endast maligna tumörer registreras.**
- Intrakraniellt neuroblastom registreras på läge C71 eller C72.
- Morf-kod 80003 får ej förekomma, registreras på läge C80.
- Neurofibromatos (morbus Recklinghausen) är ett syndrom och registreras ej.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

RETROPERITONEALRUM OCH BUKHINNA (PERITONEUM)

C48

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Retroperitonealt rum*	C48.0	C48.0	C48.0	158.0	197.4
Bukhinna, specificerad del (t.ex. oment och fossa Douglasi)	C48.1	C48.1	C48.1	158.8	158
Bukhinna, icke specificerad del, och bukhåla	C48.2	C48.2	C48.2	158.9	158
Överväxt till/från angränsande sublokal inom C48 med okänt ursprung	C48.8	C48.2	C48.9	158.9	158

INCA: saknas.

Kommentar:

- Det måste klart framgå att tumören är primär på platsen.
- * Vanligen maligna mjukdelstumörer respektive maligna lymfom i denna lokal.
- Maligna medellinjetumörer exempelvis gonadala tumörer, kan förekomma retroperitonealt, föres på läge C48.0.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom, peritonealt mucinöst (C48.1 och C48.2) *	84703	84703	096
Mesotheliom, bifasiskt, malignt (C48.1 och C48.2)	90533	90533	776
Mesotheliom, epiteloitt, malignt (C48.1 och C48.2)	90523	90523	776
Mesotheliom, fibröst, malignt (C48.1 och C48.2)	90513	90513	776
Mesotheliom, malignt UNS (C48.1 och C48.2)	90503	90503	776
Seröst papillärt adenocarcinom (C48.1 och C48.2) *	84613	84613	096

Kommentar:

- *Tumören ser morfologiskt ut som en ovarialcancer men anses utgå från peritoneala celler.
- Mucinösa och serösa adenocarcinom i bukhinna är nästan alltid metastaser, men primära tumörer i denna lokalisation kan förekomma. Kontrollera om det är en primär tumör eller metastas.
- Morf-kod 80003 får inte förekomma, tumör med denna kod registreras på läge C80.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

BINDVÄV, UNDERHUDS- OCH ANNAN MJUKVÄVNAD**C49**

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Huvud inkl. ansikte, ytteröra och hals, exkl. orbita (C69.6) och näsbrosk (C30.0)	C49.0	C49.0	C49.0	171.0	197.0
* Övre extremitet och skuldra	C49.1	C49.1	C49.1	171.2	197.2
* Nedre extremitet och höft	C49.2	C49.2	C49.2	171.3	197.3
Bröstorg, exkl. mediastinum (C38)	C49.3	C49.3	C49.3	171.4	197.7
Buk UNS	C49.4	C49.4	C49.4	171.5	197.7
Bäcken inkl säte**, ljumskar och perineum	C49.5	C49.5	C49.5	171.6 171.3**	197.7
Bål UNS	C49.6	C49.6	C49.6	171.7	197.1
Överväxt till/från angränsande sublokal inom C49 med okänt ursprung	C49.8	C49.9	C49.9	171.9	197.9
Icke specificerat läge inom C49	C49.9	C49.9	C49.9	171.9	197.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C49, se nedan		C49.8	C49.8	171.8	197.8

INCA: saknas.

Kommentar:

- ** Säte registreras på läge ICD/9 171.3.
- Sarkom i subkutan fettväv registreras på läge C49.
- Sarkom i definierade organ registreras på respektive organ.
- Sarkom med oklar primärlokal registreras på läge C80.9
- Lymfangiomatos registreras inte.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C49.8.

* Obligatorisk sidoangivelse: 1=höger, 2=vänster, 9=okänd sida

För morfologisk typ se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Abdominal fibromatos	88221/b	88221/b	701/b
Alveolärt mjukdelssarkom	95813	95813	796
Angiosarkom	91203	91203	506
Atypiskt lipom/ytligt högt differentierat liposarkom	88501/b	88501/b	721/b
Atypiskt fibroxantom	88301/b	88301/b	715/b
Carcinosarkom UNS	89803	89803	896
Epiteloidcellssarkom	88043	88043	796
Ewing sarkom, extraskelettalt	92603	92603	756
Fibromyxosarkom	88113	88113	716
Fibrosarkom UNS	88103	88103	706
Fibrosarkom, infantilt	88143	88143	706
Fibröst histiocyтом, malignt	88303	88303	716
Giant cell fibroblastoma	88341	88231	705/793
Granularcellstumör, malign	95803	95803	686
Hemangioendoteliom, malignt	91303	91303	506
Hemangiopericytom UNS	91501/b	91501/b	533/b
Hemangiopericytom, malignt	91503	91503	536
Hemangiosarkom	91203	91203	506
Jättecellsfibroblastom	88341	88231	705/793
Jättecellstumör, tenosynovial, malign	92523	90403	796
Jättecellssarkom, ej i ben/Pleomorfcelligt sarkom	88023	88023	796
Jättecellstumör i mjukvävnad, malign	92513	92513	796
Kaposi sarkom	91403	91403	566
Klarcellssarkom/malignt melanom i mjukdelar, primärt UNS	90443	90443	796
Kondrosarkom, extraskelettalt	92203	92203	736
Leiomyosarkom	88903	88903	666
Leiomyosarkom, epitelioitt	88913	88913	666
Liposarkom, UNS	88503	88503	726
Liposarkom, högt differentierat	88513	88513	726
Liposarkom, dedifferentierat	88583	88583	726
Liposarkom, myxoitt	88523	88523	726
Liposarkom, pleomorft	88543	88543	726
Liposarkom, rundcelligt	88533	88533	726
Lymfangiosarkom	91703	91703	546
Mesodermal blandtumör, malign	89513	89513	896
Myeloitt sarkom/granulocytiskt sarkom/klorom	99303	99303	226
Myosarkom	88953	88953	696
Myxosarkom	88403	88403	716
Osteosarkom, extraskelettalt	91803	91803	766
Pleomorfcelligt sarkom	88023	88023	796
Rhabdomyosarkom UNS	89003	89003	676
Rhabdomyosarkom med ganglielik differentiering	89213	89003	676
Rhabdomyosarkom, alveolärt	89203	89203	676
Rhabdomyosarkom, embryonalt UNS (inkl botryoid typ)	89103	89103	876

forts C49

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Rhabdomyosarkom, pleomorft, adult typ	89013	89013	676
Sarkom UNS	88003	88003	796
Småcelligt desmoplastiskt sarkom	88033	88063	796
Småcelligt sarkom	88033	88033	796
Solitär fibrös tumör, malign	88153	88003	796
Spolcelligt sarkom	88013	88013	796
Synovialt sarkom UNS	90403	90403	776
Synovialt sarkom, bifasiskt	90433	90433	776
Synovialt sarkom, epiteloitt	90423	90423	776
Synovialt sarkom, spolcelligt	90413	90413	776

Morf-kod 80003 får inte förekomma, registreras på läge C80.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

BRÖSTKÖRTEL (MAMMA)

C50

Kliniskt läge		ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Bröstvårta och vårtgård	höger	C50.0	C50.0	C50.0	174.1	170.1
	vänster	C50.0	C50.0	C50.0	174.2	170.2
	okänd sida	C50.0	C50.0	C50.0	174.9	170.9
Central del	höger	C50.1	C50.1	C50.1	174.1	170.1
	vänster	C50.1	C50.1	C50.1	174.2	170.2
	okänd sida	C50.1	C50.1	C50.1	174.9	170.9
Övre, inre kvadrant	höger	C50.2	C50.2	C50.2	174.1	170.1
	vänster	C50.2	C50.2	C50.2	174.2	170.2
	okänd sida	C50.2	C50.2	C50.2	174.9	170.9
Nedre, inre kvadrant	höger	C50.3	C50.3	C50.3	174.1	170.1
	vänster	C50.3	C50.3	C50.3	174.2	170.2
	okänd sida	C50.3	C50.3	C50.3	174.9	170.9
Övre, yttre kvadrant	höger	C50.4	C50.4	C50.4	174.1	170.1
	vänster	C50.4	C50.4	C50.4	174.2	170.2
	okänd sida	C50.4	C50.4	C50.4	174.9	170.9
Nedre, yttre kvadrant	höger	C50.5	C50.5	C50.5	174.1	170.1
	vänster	C50.5	C50.5	C50.5	174.2	170.2
	okänd sida	C50.5	C50.5	C50.5	174.9	170.9
Axillarutskott	höger	C50.6	C50.6	C50.6	174.1	170.1
	vänster	C50.6	C50.6	C50.6	174.2	170.2
	okänd sida	C50.6	C50.6	C50.6	174.9	170.9
Överväxt till/från angränsande sublokal inom bröst (C50) med okänt ursprung	höger	C50.8	C50.9	C50.9	174.1	170.1
	vänster	C50.8	C50.9	C50.9	174.2	170.2
	okänd sida	C50.8	C50.9	C50.9	174.9	170.9
Bröstkörtel, UNS	höger	C50.9	C50.9	C50.9	174.1	170.1
	vänster	C50.9	C50.9	C50.9	174.2	170.2
	okänd sida	C50.9	C50.9	C50.9	174.9	170.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C50, se nedan	höger	C50.9	C50.8	C50.8	174.3	170.7
	vänster	C50.9	C50.8	C50.8	174.4	170.8
	okänd sida	C50.9	C50.8	C50.8	174.9	170.9

INCA: startår 2007, maligna/precancerösa tumörer.

Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida

För morfologi se nästa sida.

Kommentar:

- Innefattar bindväv i bröstkörtel, men ej fettväven runt respektive huden över bröstkörteln.
- In-situ former finns ej för tubulära, medullära, kolloida och inflammatoriska tumörer.
- Skivepitelcancer i bröstkörtel kan förekomma men ytterst sällan; kontrollera således att det inte rör sig om överväxt eller metastas från hudcancer.

Multifokal lokalisering:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C50.8.
- En grundregel är att tumörerna skall räknas. Det kan aldrig bli fler registreringar än antalet tumörer.

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Apokrint adenocarcinom	84013		096
Carcinosarkom UNS	89803		896
Comedocarcinom in situ/icke infiltrativt	85012/b		094/b
Comedocarcinom UNS	85013		096
Duktalt carcinom in situ, intraduktalt carcinom, UNS	85002/b		094/b
Duktalt carcinom, duktogent carcinom, UNS	85003		096
Duktalt carcinom blandat med andra typer av mammarcarcinom	85233		096
Inflammatoriskt carcinom	85303		096
Juvenilt/sekretoriskt carcinom i bröst	85023		096
Kolloitt/mucinöst carcinom	84803		096
Kombinerat duktalt och lobulärt carcinom in situ	85222/b		094/b
Kombinerat duktalt och lobulärt carcinom	85223		096
Kribriformt carcinom in situ	82012/b		094/b
Kribriformt carcinom UNS	82013		096
Lobulärt carcinom in situ UNS	85202/b		094/b
Lobulärt carcinom UNS	85203		096
Lobulärt carcinom blandat med andra typer av mammarcancer	85243		096
Mammarcancer UNS	81403		096
Morbus Paget/Pagets sjukdom i bröst	85403		096
Morbus Paget och infiltrerande duktalt carcinom	85413		096
Morbus Paget och duktalt carcinom in situ	85433		096
Medullärt carcinom, atypiskt	85133		096
Mucinöst adenocarcinom/kolloitt carcinom	84803		096
Metaplastisk carcinom UNS	85753		096
Papillärt adenocarcinom in situ (C50)	85032/b		094/b
Papillärt adenocarcinom (C50)	85033		096
Phyllodes tumör UNS/borderline	90201/b		051/b
Phyllodes tumör, malign	90203		056
Sekretoriskt/juvenilt carcinom i bröst	85023		096
Tubulärt carcinom	82113		096

Obs! papillär cancer i bröst har egna koder enligt ovan.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

KVINNLIGA YTTRE KÖNSORGAN (VULVA)

C51

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Stor blygdläpp (labium majus) inkl. Bartholins körtlar och ovanliggande hud	C51.0	C51.0	C51.0	184.1	176.7
Liten blygdläpp (labium minus)	C51.1	C51.1	C51.1	184.2	176.7
Klitoris	C51.2	C51.2	C51.2	184.3	176.7
Överväxt till/från angränsande sublokal inom vulva (C51) med okänt ursprung	C51.8	C51.9	C51.9	184.4	176.0
Vulva UNS	C51.9	C51.9	C51.9	184.4	176.0
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C51, se nedan		C51.8	C51.8	164.8	176.8

Kommentar:

Vid tveksamhet om en vaginal- eller vulvacancer föreligger, skall tumören klassificeras som en vulvacancer om växt föreligger i vulva.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C51.8.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom klarcelligt UNS/carcinom klarcelligt UNS/mesonefroitt carcinom	83103		096
Melanocytär nävus med grav/stark dysplasi/atypi (dysplastisk nävus)	87270/b		174/b
Mucosalt lentiginöst melanom in situ	87462/b		174/b
Mucosalt lentiginöst melanom	87463		176
Morbus Paget, extramammar	85423		096
VIN III, vulvar intraepitelial neoplasi grad III (skivepitelderiverad)	80772/b		144/b

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

SLIDA (VAGINA)

C52

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Slida UNS	C52.9	C52.9	C52	184.0	176.1

Kommentar:

- Tumörväxt i vaginaltoppen representerar oftast cervixcancer, som vuxit ned i slidan.
- Tumör i slidan registreras på läge C52.9 endast om den är **begränsad** till slidan.
- Om engagemang av portio, registreras den på läge C53.1, om engagemang av vulva på läge C51.9.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom klarcelligt UNS/ carcinom klarcelligt UNS/mesonefroitt carcinom	83103		096
Mucosalt lentiginöst melanom in situ	87462/b		174/b
Mucosalt lentiginöst melanom	87463		176
VAIN III, vaginal intraepitelial neoplasi grad III (skivepitel)	80772/b		144/b

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

LIVMODERHALS (CERVIX UTERI, COLLUM UTERI, PORTIO)

C53

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Endocervix	C53.0	C53.0	C53.0	180.9	171
Exocervix/portio	C53.1	C53.1	C53.1	180.9	171
Överväxt till/från angränsande sublokal inom livmoderhalsen (C53) med okänt ursprung	C53.8	C53.9	C53.9	180.9	171
Livmoderhals UNS	C53.9	C53.9	C53.9	180.9	171

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenoitt basaloitt carcinom	80983		126
CIN III, cervical intraepitelial neoplas grad III (skivepitelderiverad)	80772/b		144/b
Skivepitelcarcinom med mikroinvasion (C53.0, C53.1 samt C53.9)	80763		146

INCA: Startår, 2010.

Kommentar:

- Om endast cytologiprov finns (diganosgrund 5) kan infiltrativ tumörväxt ej med säkerhet fastställas, varför tumören registreras med slutsiffra 1 i Morf-koden. Vanligen kan celltypen anges, d.v.s. skivepitel (Morf-kod 80701) eller körtelepitel (Morf-kod 81401) men även enbart maligna celler (Morf-kod antingen 80001 eller 80101) kan förekomma.
- Om ny anmälan med diagnosgrund 3 inkommer, skall denna registreras på samma diagnostillfälle om mindre än ett år förflutit. Samtidigt korrigeras Morf-koden (in situ alternativt infiltrativ) enligt PAD-svaret.
- **OBS!** En individ kan endast ha samma Morf-kod en gång på läge C53 oavsett tidsintervall.
- Mikroinvasion definieras som max 0.5 cm djupväxt och enbart i denna lokal.
- Vaginal tumör registreras i C52.9 endast om de är begränsade till vagina; om engagemang av portio, registreras de på läge C53.1.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

LIVMODERKROPP (CORPUS UTERI)

C54

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Isthmus	C54.0	C54.0	C54.0	182.1	172
Endometrium (slemhinna)	C54.1	C54.1	C54.1	182.0	172
Endometrium (enbart maligna mjukdelstumörer/sarkom)	C54.1	C55.9	C55	179.9	174
Myometrium (muskelvägg)	C54.2	C55.9	C55	179.9	174
Fundus uteri	C54.3	C54.3	C54.3	182.0	172
Överväxt till/från angränsande sublokal inom livmodern (C54) med okänt ursprung	C54.8	C54.9	C54.9	182.0	172
Överväxt till/från angränsande sublokal inom Livmodern (C54) med okänt ursprung (enbart maligna mjukdelstumörer/sarkom)	C54.8	C55.9	C55	179.9	174
Livmoderkropp UNS*	C54.9	C54.9	C54.9	182.0	172
Livmoderkropp UNS (enbart maligna mjukdelstumörer/sarkom)	C54.9	C55.9	C55	179.9	174

INCA: Startår, 2010.

Kommentar:

- Till läge C54 skall endast föras sådana fall, där det av anmälan klart framgår, att det rör sig om en malign tumör i slemhinnan eller muskelväggen i livmoderkroppen. Om oklart huruvida tumören utgår från livmoderhals eller livmoderkropp registreras den på läge C55.9.
- * Livmoderkropp UNS avser fall där det inte kan avgöras om tumören utgår från muskelvägg eller slemhinna, vanligen sådana fall där histologisk diagnos saknas.
- Choriocarcinom i uterus registreras alltid på läge C58.9.

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom, endometriecancer, UNS (C54.1)	81403		096
Angiosarkom	91203		506
Endometrialt stromacellssarkom, UNS/höggradigt (C54.1)	89303		876
Endometrialt stromacellssarkom, låggradigt/endolymfatisk stromamyos/ endometriell stromatos/ stromal endometriosis/stromal myos (C54.1)	89313		875
Endometriehyperplasi, atypisk	81402/b		094/b
Fibrosarkom UNS	88103		706
Leiomyosarkom (C54.2)	88903		666
Müllersk blandtumör	89503		896

Kommentar:

- Samtliga sarkom och Müllerska blandtumörer skall föras på C54.1, C54.2, C54.8 eller C54.9 med översättning till ICD-O/2 C55.9.
- Endometrioitt carcinom förekommer även primärt utanför endometriet och har då en speciell Morf-kod 83803. Jfr. med endometriecarcinom, som är metastatiskt om det uppträder utanför livmoderkroppen.
- Skivepitelcarcinom är ytterst ovanligt och accepteras endast efter noggrann kontroll.
- Choriocarcinom i uterus registreras alltid på läge C58.9

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

LIVMODER (UTERUS)

C55

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Livmoder UNS	C55.9	C55.9	C55	179.9	174

INCA: startår, 2010.

Kommentar:

- "Cancer uteri et ovarii" med oklar utgångspunkt registreras enligt ICD-O/3 på läge C57.8.
Enligt ICD-O/2 registrerades dessa tumörer på läge C76.3 och i ICD-7 på läge 199.4.
- Till läge C55.9 föres de fall där histologisk diagnos saknas och/eller det enbart kan fastställas att det rör sig om malign tumör i någon icke närmare specificerad del av uterus.
- Sarkom i livmoderkroppen registreras enligt ICD-O/3 på läge C54. Enligt ICD-O/2 registrerades dessa på läge C55.9 och i ICD-7 på läge 174.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ÄGGSTOCK (OVARIIUM)

C56

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Äggstock	C56.9	C56.9	C56	183.0	175.0

INCA: startår, 2008.

Kommentar:

- Sidoangivelse för äggstockstumörer är inte obligatorisk, men om uppgift finns ska sidan anges.
- Krukenbergstumör är alltid en metastas: utgår oftast från ventrikeln.
- "Cancer uteri et ovarii" med oklar utgångspunkt registreras enligt ICD-O/3 på läge C57.8. Enligt ICD-O/2 registrerades dessa tumörer på läge C76.3 och i ICD-7 på läge 199.4.
- Extragonadala tumörer, kan förekomma mediastinalt, föres på läge C38.3 respektive retroperitonealt föres på läge C48.0.

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinofibrom, klarcelligt	83133		096
Adenocarcinofibrom, seröst	90143		096
Androblastom/arrhenoblastom, malignt	86303		056
Androblastom/arrhenoblastom UNS	86301		051
Borderlinetumör av typ:			
Brennertumör	90001/b		054/b
Endometrioitt kystadenom	83801/b		094/b
Klarcellig, cystisk	84441/b		094/b
Klarcelligt adenofibrom/kystadenofibrom	83131/b		094/b
Mucinös papillär och cystisk	84731/b		094/b
Mucinöst kystadenom	84721/b		094/b
Serös, papillär och cystisk	84621/b		094/b
Serös adenofibrom/kystadenofibrom	90141/b		094/b
Seröst kystadenom	84421/b		094/b
Brennertumör, malign	90003		056
Carcinoid i struma ovari	90911/b		085/b
Carcinom, klarcelligt, mesonefroitt och UNS	83103		096
Cystadenocarcinom UNS	84403		096
Mucinöst adenocarcinom, cystiskt och UNS	84703		096
Cystadenocarcinom, papillärt UNS	84503		096
Seröst adenocarcinom, cystiskt och UNS	84413		096
Dermoidcysta/teratom med malign omvandling (alla tumörtyper)	90843		826
Dysgerminom	90603		066
Embryonalt carcinom UNS	90703		826
Embryonalt carcinom av polyembryonal typ	90723		826
Endodermal sinustumör "yolk sac tumor" (gulesäckstumör)	90713		826

forts C56

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Endometroitt adenocarcinom UNS	83803		096
Gonadal stromacellstumör/interstitialcellstumör UNS	85901		051
Granulosacellstumör (alla typer)	86203		056
Granulosa-tekacellstumör	86211		055
Gynandroblastom	86321		056
Hiluscellstumör	86600		051
Interstitialcellstumör UNS	86501		051
Leydigcellstumör UNS	86501		051
Lipidcellstumör/steroidcellstumör i äggstock	86700		051
Luteom UNS	86100		051
Mesodermal blandtumör, malign	89513		896
Mesonefrisk tumör UNS	91101		896
Mesonefrom, malignt	91103		096
Mesoteliom	90503		776
Müllersk blandtumör	89503		896
Polyembryom	90723		826
Sertolicellstumör, lipidrik	86410		063
Sertolicellsadenom eller tumör UNS	86401		063
Sertolicellscarcinom	86403		066
Sertoli-Leydigcellstumör, medelhögt differentierad och UNS	86311		063
Sertoli-Leydigcellstumör, malign, lågt differentierad/sarkomatoid	86313		066
Stromacellstumör UNS i äggstock	85901		056
Seröst/papillärt (seropapillärt) adenocarcinom	84603		096
Struma ovarii, malign	90903		826
Tekom, malignt	86003		056
Tekom UNS	86000/b		054/b
Teratom, malignt UNS	90803		826
Wolffska gången-deriverad tumör, malign	91103		896
Wolffska gången-deriverad tumör, UNS	91101		893
Övergångsepitel-carcinom	81203		116

Kommentar:

- Enligt gällande föreskrift räknas histologiskt benigna tumörer som maligna i C24 på koderna 051, 053, 055 och 063.
- Enkla serösa och mucinösa kystom (kystadenom) respektive kystadenofibrom är helt benigna och registreras ej. OBS! Får ej förväxlas med ovanstående borderline-former!
- Brenner-tumör UNS med Morf-kod 90000 räknas som benign och registreras ej.
- Vid skivepitelcarcinom i ovariet, kontrollera om metastas eller primär (utgående från dermoidcysta) och kodas med Morf-kod 90843 C24/hist 826.
- Sertolicellstumör UNS räknas i ICD-O/3 som borderline-typ, vilket för vår del inte innebär någon förändring då vi redan tidigare registrerat dessa som borderlinetumör.
- Borderlinetumörer registreras enligt ICD-O/3 med Morf-kod-slutsiffra 1, tidigare enligt ICD-O/2 med Morf-kod-slutsiffra 3.
- T o m 1988 registrerades alla tekom som maligna, d v s enligt C24/hist 056.
Fr o m 1989 ändrades kodinstruktionen till följande i C24/hist:
tekom UNS 054/b, granulosa-tekacellstumör 055, lipidcellstumör 051.
- Ovarialcancer med samma Morf-kod registreras endast en gång även om den uppträder i det andra ovariet.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ANDRA OCH OSPECIFICERADE KVINNLIGA KÖNSORGAN

C57

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
* Äggledare	C57.0	C57.0	C57.0	183.2	175.1
* Breda ligamentet	C57.1	C57.1	C57.1	183.3	175.1
* Runda ligamentet	C57.2	C57.2	C57.2	183.5	175.1
* Parametriet	C57.3	C57.3	C57.3	183.4	175.1
* Uterina adnexa UNS	C57.4	C57.4	C57.4	183.9	175.9
Andra specificerade delar av kvinnliga könsorgan inklusive Wolffska gången	C57.7	C57.7	C57.7	183.9	175.9
Överväxt till/från angränsande kvinnliga könsorgan (C51-C57) med okänt ursprung	C57.8	C57.9	C57.9	184.9	176.9
Cancer uteri et ovarii	C57.8	C76.3	C76.3	195.3	199.4
Kvinnliga könsorgan UNS	C57.9	C57.9	C57.9	184.9	176.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C57, se nedan		C57.8	C57.8	183.8	175.8

INCA: startår, 2008.

Kommentar:

- "Cancer uteri et ovarii" är en specialform av överväxt, där det är oklart om primärtumören utvecklats i uterus eller ovarialvävnad.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp= (morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C57.8.

* Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

MODERKAKA (PLACENTA)

C58

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Moderkaka	C58.9	C58.9	C58 D39.2	181.9	173

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O2	C24/hist
Choriocarcinom UNS	91003		806
Invasiv mola	91001		806
Mola/mola hydatidosa (druvbörd)	91000/b		801/b
Mola/mola hydatidosa (druvbörd) partiell	91030/b		801/b
Trofoblastisk tumör utgående från moderkaksbädden (PSTT)	91041/b		803/b
Trofoblastisk tumör, epiteloid	91053		806

Kommentar:

- Misstänkt mola, i allmänhet regressiv placentaförändring utan karaktären av tumör, registreras ej.
- Mola med misstänkt invasivitet registreras som mola med Morf-kod 91000/b, Morf-koden 91001 får endast användas för säkerställd invasiv mola.
- Invasiv mola registreras i ICD-O/3 med Morf-kod 91001, C24/hist 806. I ICD-O/2 användes Morf-koden 91002 för invasiv mola med C24/hist 806.
- Komplet mola:
Båda kromosomer från fadern. Foster saknas. Enbart hinnsäck/blåsbildning. Högre risk (ca 30%) för malignitet (choriocarcinom).
- Partiell mola:
1 kromosom från modern - 1 kromosom från fadern. Foster oftast missbildat.

OBS! - trots benignitet kan dessa förändringar metastasera" vanligast till lungor och lilla bäcken!

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

PENIS

C60

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Förhud (preputium)	C60.0	C60.0	C60.0	187.1	179.0
Ollon (glans)	C60.1	C60.1	C60.1	187.2	179.0
Manslemskropp	C60.2	C60.2	C60.2	187.3	179.0
Överväxt till/från angränsande sublokal inom manslem (C60) med okänt ursprung	C60.8	C60.9	C60.9	187.4	179.0
Manslem UNS inkl hud	C60.9	C60.9	C60.9	187.4	179.0
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C60, se nedan		C60.8	C60.8	187.4	179.0

INCA: Startår, 2009.

Kommentar:

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C60.8.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Erythroplasia Queyrat (skivepitelcancer in situ)	80802/b		144/b
Melanocytär nävus med grav/stark dysplasi/atypi (dysplastisk nävus) (enbart läge C60.9)	87270/b		174/b
Morbus Bowen (skivepitelcancer in situ)	80812/b		144/b
Morbus Paget	85423		096
Mucosalt lentiginöst melanom in situ	87462/b		174/b
Mucosalt lentiginöst melanom	87463		176
Verruköst/vårtliknande carcinom UNS (skivepitelcancer)	80513		146

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

BLÅSHALSKÖRTEL (PROSTATA)

C61

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Blåshalskörtel	C61.9	C61.9	C61	185.9	177

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Neuroendokrint carcinom, UNS	82463		446
PIN III/prostatisk intraepitelial neoplasi, grad III (körtelepitel)	81482/b		094/b

INCA: Startår, 2007.

Kommentar:

- Höggradig PIN = PIN II–III, registreras som PIN III med Morf-kod 81482/b.
- Låggradig PIN = PIN I, registreras ej.
- Även andra maligna neuroendokrina tumörer kan förekomma.
- Urotelialt carcinom kan vara primärt i lokalen, då utgående från distala gångar, men kontrollera att tumören ej representerar överväxt från uretra eller urinblåsa.
- Mesenkymala tumörer kan förekomma.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

TESTIKEL (TESTIS)

C62

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
* Icke nedvandrad (retinerad) testikel och ej i pungen belägen (ektopisk) testikel	C62.0	C62.0	C62.0	186.9	178
* Nedvandrad testikel (belägen i pungen)	C62.1	C62.1	C62.1	186.9	178
* Testikel UNS	C62.9	C62.9	C62.9	186.9	178

INCA: Startår, 2010.

Kommentar:

- Extragonadala tumörer, kan förekomma mediastinalt, föres på läge C38.3 respektive retroperitonealt föres på läge C48.0.

***Obligatorisk sidoangivelse: 1=höger, 2=vänster, 9=okänd sida**

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Androblastom/arrenoblastom, UNS	86301		056
Androblastom/arrenoblastom, malignt	86303		056
Choriocarcinom kombinerat med andra germinalcellskomponenter (teratom/embryonalt carcinom/seminom)	91013		826
Choriocarcinom, UNS	91003		806
Embryonalt carcinom, UNS	90703		826
Endodermal sinustumör "yolk sac tumor" (gulesäckstumör)	90713		826
Germinalcellstumör, blandad (teratom med seminomkomponent)	90853		826
Germinalcellstumör, intratubulär (IGCNU)	90642/b		824/b
Germinalcellstumör, utan seminomkomponent	90653		826
Gonadal stromacellstumör, UNS	85901		056
Granulosacellstumör, UNS	86201		056
Leydigcellstumör, malign	86503		056
Leydigcellstumör, UNS	86501/b		051/b
Seminom, in situ	90612/b		064/b
Seminom, spermatocytiskt	90633		066
Seminom, UNS	90613		066
Sertolicellscarcinom	86403		066
Teratocarcinom (blandat embryonalt carcinom och teratom)	90813		826
Teratom, malignt UNS (embryonalt teratom, malignt teratoblastom, omoget teratom UNS)	90803		826
Teratom med seminomkomponent (germinalcellstumör, blandad)	90853		826
Teratom, UNS	90801/b		823/b

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ANDRA OCH OSPECIFICERADE MANLIGA KÖNSORGAN

C63

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
* Bitestikel (epididymis)	C63.0	C63.0	C63.0	187.5	179.7
* Sädlesledare (ductus deferens)	C63.1	C63.1	C63.1	187.6	179.7
Pung (skrotum), hud, melanom	C63.2	C63.2	C63.2	187.7	190.5
Pung (skrotum), hud, övriga	C63.2	C63.2	C63.2	187.7	191.5
Pung (skrotum), UNS inkl hud och exkl tunica vaginalis	C63.2	C63.2	C63.2	187.7	179.1
Andra specificerade manliga könsorgan inkl sädesblåsa och tunica vaginalis	C63.7	C63.7	C63.7	187.9	179.7
Överväxt till/från angränsande sublokal inom manliga könsorgan (C60-C63.7) med okänt ursprung	C63.8	C63.9	C63.9	187.9	179.9
Manliga könsorgan UNS	C63.9	C63.9	C63.9	187.9	179.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C63, se kommentar		C63.8	C63.8	187.8	179.8

Kommentar:

- Lägeskoden för punghud i ICD-7 är beroende av om det rör sig om malignt melanom eller annan malign tumör i huden.
- Mesoteliala tumörer kan förekomma på läge C63.

Multifokal lokalisering:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C63.8.

* Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida

Morfologisk typ	Morf-kod	C24/hist
Androblastom/arrenoblastom, UNS	86301	056
Androblastom/arrenoblastom, malignt	86303	056

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

NJURE (REN)

C64

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Njure parenkym	C64.9	C64.0	C64	189.0	180.0
Njure UNS	C64.9	C64.9	C64	189.6	180.9

INCA: Startår, 2009.

Kommentar:

- Primära njurparenkymtumörer registrerades enligt ICD-O/2 på läge C64.0 ICD9 189.0, ICD7 180.0.
- Tumör, som histopatologiskt är urotelialt carcinom (övergångsepitelscarcinom), registreras på läge C65.
- Vid oklarhet om tumören är utgående från njurparenkym eller njurbäcken registreras på läge C68.9, ICD10/ICD-O/2 C64.9. Ofta saknas histopatologisk eller cytologisk diagnos, diagnosgrund vanligen röntgen.

***Obligatorisk sidoangivelse: 1=höger, 2=vänster, 9=okänd sida.**

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenocarcinom, kromofilt	82603		096
Adenocarcinom, kromofobt	83173		096
Adenocarcinom, onkocytiskt/oxyfilt (onkocytom, malignt)	82903		096
Adenocarcinom, papillärt UNS/njurcellscarcinom, papillärt	82603		096
Bellinis carcinom/collecting duct carcinoma/ renal medullärt carcinom	83193		096
Collecting duct carcinoma/Bellinis carcinom/ renal medullärt carcinom	83193		096
Klarcellscarcinom UNS/klarcellsadenocarcinom, mesonefroitt	89643		096
Klarcellssarkom i njure	89603		796
Nefroblastom/Wilms tumör/nefrom UNS	89603		886
Njurcellscarcinom/ renalcellscarcinom, UNS inkl. klarcelligt	83123		096
Njurcellscarcinom, papillärt/ papillärt adenocarcinom UNS	82603		096
Renalcellscarcinom UNS/njurcellscarcinom inkl. klarcelligt	83123		096
Renalcellscarcinom/njurcellscarcinom, kromofobt	83173		096
Renalt medullärt carcinom/ collecting duct carcinoma/Bellinis carcinom	83193		096
Wilms tumör/nefroblastom/nefrom UNS	89603		886

Kommentar:

- Granularcellscarcinom på detta läge är ett malignt onkocytom, med Morf-kod 82903.
- Hypernefrom en föråldrad beteckning för klarcellig njurcancer, med Morf-kod 83123 C24/hist 096.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

NJURBÄCKEN (PELVIS RENALIS)

C65

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
* Njurbäcken UNS	C65.9	C65.9	C65	189.1	180.1

INCA: startår, 2009.

Kommentar:

- Sammanhängande tumörväxt omfattande
 - a) njurbäcken-uretär,
 - b) uretär-urinblåsa,
 - c) urinblåsa-urinrör registreras på läge C68.8. OBS! Får ej förväxlas med multifokal tumörväxt.
- Vid oklarhet om tumören är utgående från njurparenkym eller njurbäcken registreras på läge C68.9, ICD10/ICD-O/2 C64.9. Ofta saknas histopatologisk eller cytologisk diagnos, diagnosgrund vanligen röntgen.

***Obligatorisk sidoangivelse: 1=höger, 2=vänster, 9=okänd sida.**

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	C24/hist
Maligna uroteliala celler UNS	81201	116
Urotelialt carcinom, in situ	81202	114
Urotelialt carcinom, papillärt, icke invasivt, utan gradangivelse	81302	116
Urotelialt carcinom, papillärt, icke invasivt, med gradangivelse	813021 Grad I 813022 Grad II 813023 Grad III	116 116 116
Urotelialt carcinom, papillärt, invasivt, utan gradangivelse	81303	116
Urotelialt carcinom, papillärt, invasivt, med gradangivelse	813031 Grad I 813032 Grad II 813033 Grad III	116 116 116
Urotelialt carcinom UNS, utan gradangivelse	81203	116
Urotelialt carcinom UNS, med gradangivelse	812031 Grad I 812032 Grad II 812033 Grad III	116 116 116
Urotelial tumör, papillär med lågmalign potential (LMP)	81301	116

Kommentar:

- Skivepitelcarcinom registreras med Morf-kod 80703, C24/hist 146. Om urotelkomponent finns (oavsett storlek) registreras tumören som urotelialt carcinom.
- LMP inkluderades tidigare i papillärt urotelialt carcinom Grad I. I ICD-O/3 finns LMP som egen kod.
- Om uppgift om invasivitet för papillärt urotelialt carcinom saknas bör klargörande inhämtas från patolog.
- Cytologisk diagnos **maligna uroteliala celler**, registreras med Morf-kod 81201, C24/hist 116, eftersom det ej kan avgöras cytologiskt om tumören infiltrerar eller ej.
- Om endast urotelial cancer är angivet, dvs vare sig papillär/icke papillär eller grad angivelse, registreras Morf-kod 81203, C24/hist 116.
För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

URINLEDARE (URETÄR)

C66

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
* Urinledare	C66.9	C66.9	C66	189.2	181.1

Kommentar:

- Sammanhängande tumörväxt omfattande a) njurbäcken-uretär, b) uretär-urinblåsa, c) urinblåsa-urinrör registreras på läge C68.8.

OBS! Får ej förväxlas med multifokal tumörväxt.

* Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	C24/hist
Maligna uroteliala celler UNS	81201	116
Urotelialt carcinom, in situ	81202	114
Urotelialt carcinom, papillärt, icke invasivt, utan gradangivelse	81302	116
Urotelialt carcinom, papillärt, icke invasivt, med gradangivelse	813021 Grad I	116
	813022 Grad II	116
	813023 Grad III	116
Urotelialt carcinom, papillärt, invasivt, utan gradangivelse	81303	116
Urotelialt carcinom, papillärt, invasivt, med gradangivelse	813031 Grad I	116
	813032 Grad II	116
	813033 Grad III	116
Urotelialt carcinom UNS, utan gradangivelse	81203	116
Urotelialt carcinom UNS, med gradangivelse	812031 Grad I	116
	812032 Grad II	116
	812033 Grad III	116
Urotelial tumör, papillär med lågmalign potential (LMP)	81301	116

Kommentar:

- Skivepitelcarcinom registreras med Morf-kod 80703, C24/hist 146, om urotelkomponent finns (oavsett storlek) registreras tumören som urotelialt carcinom.
- LMP inkluderades tidigare i papillärt urotelialt carcinom Grad I. I ICD-O/3 finns LMP som egen kod.
- Om uppgift om invasivitet för papillärt urotelialt carcinom saknas bör klargörande inhämtas från patolog.
- Cytologisk diagnos **maligna uroteliala celler**, registreras med Morf-kod 81201, C24/hist 116, eftersom det ej kan avgöras cytologiskt om tumören infiltrerar eller ej.
- Om endast urotelial cancer är angivet, dvs vare sig papillär/icke papillär eller grad angivelse, registreras Morf-kod 81203, C24/hist 116.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

URINBLÅSA (VESICA URINARIA)

C67

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Trigonum	C67.0	C67.0	C67.0	188.9	181.0
Blåstak	C67.1	C67.1	C67.1	188.9	181.0
Sidovägg	C67.2	C67.2	C67.2	188.9	181.0
Framvägg	C67.3	C67.3	C67.3	188.9	181.0
Bakvägg	C67.4	C67.4	C67.4	188.9	181.0
Blåshals, inre uretramynning	C67.5	C67.5	C67.5	188.9	181.0
Uretäröppning	C67.6	C67.6	C67.6	188.9	181.0
Urachus	C67.7	C67.7	C67.7	188.7	181.6
Överväxt till/från angränsande sublokal inom urinblåsa (C67) med okänt ursprung	C67.8	C67.9	C67.9	188.9	181.0
Urinblåsa UNS	C67.9	C67.9	C67.9	188.9	181.0
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C67, se nedan		C67.8	C67.8	188.8	181.0

INCA: Startår, 2008.

Kommentar:

- Om lägesangivelse saknas rekommenderas följande lägen:
 - Cytologiskt prov, blåssköljvätska C67.9
 - Cytologiskt prov, kastad eller tappad urin C68.9

OBS! Ovanstående lägen skall morf-koden vara 81201/b.

- Sammanhängande tumörväxt omfattande:
 - a) njurbäcken-uretär
 - b) uretär-urinblåsa
 - c) urinblåsa-urinrör registreras på läge C68.8

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). **Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.**
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C67.8.

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	C24/hist
Maligna uroteliala celler UNS	81201	116
Mucinöst adenocarcinom	84803	096
Urotelialt carcinom, in situ	81202	114
Urotelialt carcinom, papillärt, icke invasivt, utan gradangivelse	81302	116
Urotelialt carcinom, papillärt, icke invasivt, med gradangivelse	813021 Grad I 813022 Grad II 813023 Grad III	116 116 116
Urotelialt carcinom, papillärt, invasivt, utan gradangivelse	81303	116
Urotelialt carcinom, papillärt, invasivt, med gradangivelse	813031 Grad I 813032 Grad II 813033 Grad III	116 116 116
Urotelialt carcinom	81203	116
Urotelialt carcinom, UNS, inklusive cytologi, med gradangivelse	812031 Grad I 812032 Grad II 812033 Grad III	116 116 116
Urotelial tumör, papillär med lågmalign potential (LMP)	81301	116
Urotelialt papillom, UNS	81301	116

Kommentar:

- Endast vid rena skivepitelcarcinom registreras med Morf-kod 80703, C24/hist 146, om urotelkomponent finns (oavsett storlek) registreras tumören som urotelialt carcinom.
- Mucinöst adenocarcinom kan vara primärt, då utgående från urachusrest i blåstaket, men överväxt från tarm måste uteslutas.
- Inverterat urotelialt papillom skall ej registreras.
- LMP inkluderades tidigare i papillärt urotelialt carcinom Grad I. I ICD-O/3 finns LMP som egen kod.
- Om uppgift om invasivitet för papillärt urotelialt carcinom saknas bör klargörande inhämtas från patolog.
- Cytologisk diagnos **maligna uroteliala celler**, registreras med Morf-kod 81201, C24/hist 116, eftersom det ej kan avgöras cytologiskt om tumören infiltrerar eller ej.
- Om endast urotelial cancer är angiven, dvs. vare sig papillär/icke papillär eller grad, registreras Morf-kod 81203, C24/hist 116.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE URINORGAN

C68

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Urinrör (uretra)	C68.0	C68.0	C68.0	189.3	181.2
Parauretrala körtlar	C68.1	C68.1	C68.1	189.4	181.7
Överväxt till/från angränsande sublokal inom andra och icke specificerade urinorgan (C64.9-C68.1) med okänt ursprung	C68.8	C68.9	C68.9	189.9	181.9
* Urinorgan UNS	C68.9	C68.9	C68.9	189.9	181.9
	C68.9	C64.9	C64	189.6	180.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C68, se nedan		C68.8	C68.8	189.8	181.8

* Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida

Kommentar:

- Om lägesangivelse saknas rekommenderas följande lägen:
 - Cytologiskt prov, blåssköljväska C67.9
 - Cytologiskt prov, kastad eller tappad urin C68.9
- Sammanhängande tumörväxt omfattande:
 - a) njurbäcken-uretär
 - b) uretär-urinblåsa
 - c) urinblåsa-urinrör registreras på läge C68.8 i ICD-O/3.

OBS! Får ej förväxlas med multifokal tumörväxt i ICD-O/2.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). **Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.**
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C68.8.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	C24/hist
Maligna uroteliala celler UNS	81201	116
Mucinöst adenocarcinom	84803	096
Urotelialt carcinom, in situ	81202	114
Urotelialt carcinom, papillärt, icke invasivt, utan gradangivelse	81302	116
Urotelialt carcinom, papillärt, icke invasivt, med gradangivelse	813021 Grad I	116
	813022 Grad II	116
	813023 Grad III	116
Urotelialt carcinom, papillärt, invasivt, utan gradangivelse	81303	116
Urotelialt carcinom, papillärt, invasivt, med gradangivelse	813031 Grad I	116
	813032 Grad II	116
	813033 Grad III	116
Urotelialt carcinom	81203	116
Urotelialt carcinom, UNS, inklusive cytologi, med gradangivelse	812031 Grad I	116
	812032 Grad II	116
	812033 Grad III	116
Urotelial tumör, papillär med lågmalign potential (LMP)	81301	116
Urotelialt papillom, UNS	81301	116

Kommentar:

- Endast vid ren skivepitelcancer registreras Morf-kod 80703, C24/hist 146. Om urotelkomponent finns (oavsett storlek) registreras tumören som urotelialt carcinom.
- Inverterat papillom utan atypi skall ej registreras.
- LMP inkluderades tidigare i papillärt urotelialt carcinom Grad I.
- Om uppgift om invasivitet för papillärt urotelialt carcinom saknas bör klargörande inhämtas från patolog.
- Cytologisk diagnos **maligna uroteliala celler**, registreras med Morf-kod 81201, C24/hist 116, eftersom det ej kan avgöras cytologiskt om tumören infiltrerar eller ej.
- Om endast urotelial cancer är angivet, dvs vare sig papillär/icke papillär eller gradangivelse, registreras Morf-kod 81203, C24/hist 116.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ÖGA OCH ÖGONHÅLA SAMT TÅRKÖRTEL OCH TILLHÖRANDE VÄVNADER

C69

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
* Bindehinna (conjunctiva)	C69.0	C69.0	C69.0	190.3	192.3
* Hornhinna (cornea)	C69.1	C69.1	C69.1	190.4	192.7
* Näthinna (retina)	C69.2	C69.2	C69.2	190.5	192.0
* Åderhinna (choroidea)	C69.3	C69.3	C69.3	190.6	192.0
* Regnbågshinna (iris) och strålkropp (corpus ciliare)	C69.4	C69.4	C69.4	190.0	192.0
* Tårsäck och tårkanal	C69.5	C69.5	C69.5	190.7	192.7
* Tårkörtel	C69.5	C69.5	C69.5	190.2	192.2
* Ögonhåla (orbita)	C69.6	C69.6	C69.6	190.1	192.2
* Överväxt till/från angränsande sublokal inom (C69) med okänt ursprung	C69.8	C69.9	C69.8	190.9	192.9
* Öga UNS	C69.9	C69.9	C69.9	190.9	192.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C69, se nedan		C69.8	C69.8	190.8	192.8

INCA: Saknas.

Kommentar:

- Ögonhåla (orbita) inkluderar bindväv, perifera nerver, autonoma nervsystemet samt yttre ögonmusklerna och retrobulbär vävnad.
- Synnerv (nervus opticus) registreras på läge C72.3.
- Tumörer utgående från ögonlockshud registreras på läge C44.1.
- Beträffande mjukdelssarkom, se C49 och generell kodlista.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). **Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.**
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C69.8.

Obligatorisk sidoangivelse: 1=höger, 2=vänster, 9=okänd sida.

För morfologi se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Melanom, malignt	87203	87203	176
Melanom, malignt spolcelligt typ A	87733	87733	176
Melanom, malignt spolcelligt typ B	87743	87443	176
Melanos (malignt melanom in situ)	87202/b	87202/b	174/b
Retinoblastom, UNS (C69.2)	95103	95103	436
Retinoblastom, differentierat (C69.2)	95113	95113	436
Retinoblastom, odifferentierat (C69.2)	95123	95123	436
Retinoblastom, diffust och UNS (C69.2)	95103	95133	436
Retinoblastom i spontan regress (C69.2)	95141/b	95101	431/b

Kommentar:

Retinoblastom förekommer främst hos barn, om hos vuxen kontrollera diagnosen.
Malignt melanom utan morfologisk verifikation kodas 80003.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

HJÄRNNINNOR OCH RYGGMÄRGSHINNOR (MENINGER) C70

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Hjärnhinnor	C70.0	C70.0	C70.0	192.1	193.0
Ryggmärgshinnor	C70.1	C70.1	C70.1	192.3	193.1
Hinnor UNS	C70.9	C70.9	C70.9	192.9	193.9

INCA: startår, 2009.

Kommentar:

- Alla tumörer och tumörlika tillstånd registreras.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Melanocytos, diffus (C70.9)	87280	87200	176
Melanocytom, meningealt (C70.9)	87281	87200	176
Melanomatos, meningeal (C70.9)	87283	87203	176
Melanom, malignt	87203	87203	176
Meningiom UNS	95300	95300	461
Meningiom, malignt	95303	95303	466
Meningiom, angiomatöst	95340	95340	461
Meningiom, atypiskt	95391	95302	463
Meningiom, blandat	95370	95370	461
Meningiom, fibröst	95320	95320	461
Meningiom, klarcelligt	95381	95381	463
Meningiom, meningiotelialt	95310	95310	461
Meningiom, papillärt, rabdoidt	95383	95381	466
Meningiom, psammomatöst	95330	95330	461
Meningiomatos	95301	95301	463
Olfactoriusmeningiom	95300	95300	461
Sarkom, meningealt	95303	95303	466
Sarkomatos, meningeal	95393	95393	466

Kommentar:

- Vid malignt melanom, kontrollera att tumören ej utgör metastas.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

HJÄRNA (CEREBRUM)

C71

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
* Storhjärna (cerebrum)	C71.0	C71.0	C71.0	191.7	193.0
* Frontallob	C71.1	C71.1	C71.1	191.1	193.0
* Temporallob	C71.2	C71.2	C71.2	191.2	193.0
* Parietallob	C71.3	C71.3	C17.3	191.3	193.0
* Occipitallob	C71.4	C71.4	C71.4	191.4	193.0
* Hjärnventriklar med plexus chorioideus, exkl fjärde ventrikeln	C71.5	C71.5	C71.5	191.5	193.0
Lillhjärna (cerebellum)	C71.6	C71.6	C71.6	191.6	193.0
Hjärnstam, inkl fjärde ventrikeln med plexus chorioideus	C71.7	C71.7	C71.7	191.7	193.0
Corpus callosum	C71.8	C71.7	C71.0	191.7	193.0
Överväxt till/från angränsande sublokal inom C71 med okänt ursprung	C71.8	C71.9	C71.9	191.9	193.0
Hjärna UNS inkl intrakraniellt läge	C71.9	C71.9	C71.9	191.9	193.0
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C71, se nedan		C71.8	C71.8	191.8	193.0

INCA: startår, 2009.

Kommentar:

- Alla tumörer och tumörlika tillstånd registreras som maligna.
- Kraniofaryngiom registreras på läge C75.2.
- Corpus callosum registreras enligt ICD-O/3 på läge C71.8, registrerades enligt ICD-O/2 på läge C71.7, ICD9 191.7, ICD7 193.0.
- Mjukdelssarkom kan förekomma.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). **Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.**
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C71.8. Obligatorisk sidoangivelse: *1=höger, 2=vänster, 9=okänd sida

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Astrocytom (lågmalignt, gr I-II)	94003	94003	475
Astrocytom, anaplastiskt (högmalignt, gr III)	94013	94013	476
Astrocytom, anaplastiskt (högmalignt, gr IV = glioblastom)	94403	94403	476
Astrocytom, desmoplastiskt infantilt	94121	94213	475

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Astrocytom, gemistocytiskt	94113	94113	475
Astrocytom, pilocytiskt/juvenilt	94211	94213	475
Astrocytom, subependymalt jättecellstyp	93841	93841	475
Cysta, dermoid UNS	90840	90840	821
Cysta, enkel intrakraniellt UNS	33400	33400	031
Dysembryoplastisk neuroepitelial tumör (DNET)	94130	94731	411
Ependymom (gr I-II)	93913	93913	485
Ependymom, anaplastiskt (gr III-IV)	93923	93923	486
Ependymom, papillärt	93933	93931	485
Gangliocytom	94920	94900	401
Gangliocytom, dysplastiskt i cerebellum (C71.6)	94930	94901	401
Gangliogliom UNS	95051	95051	475
Gangliogliom, anaplastiskt	95053	95053	476
Ganglioneuroblastom	94903	94903	406
Germinom	90643	90643	981
Glioblastom UNS, glioblastoma multiforme	94403	94403	476
Glioblastom, jättecellstyp	94413	94413	476
Gliom, malignt	93803	93803	476
Gliom, blandat	93823	93823	476
Gliomatos, cerebral	93813	93813	476
Gliosarkom	94423	94423	476
Hemangioblastom	91611	91611	511
Hemangiom	91200	91200	501
Lipom, UNS	88500	88500	721
Medulloblastom, UNS	94703	94703	436
Medulloblastom, desmoplastiskt nodulärt	94713	94713	436
Medulloblastom, storcelligt	94743	94703	436
Medulloepiteliom, UNS	95013	95013	436
Medulloepiteliom, teratoitt	95023	95023	436
Medullomyoblastom	94723	94723	436
Neuroblastom, UNS	95003	95003	416
Neurocytom, centralt	95061	95061	411
Neuroektodermal tumör, melanotisk	93630	93630	411
Neuroepitelial tumör, dysembryoplastisk	94130	95030	411
Neuroepiteliom, UNS	95033	95033	416
Oligoastrocytom alla typer	93823	93823	476
Oligodendrogliom, UNS	94503	94503	475
Oligodendrogliom, anaplastiskt	94513	94513	476
Primitiv neuroektodermal tumör (PNET), UNS	94733	94733	416
Pleomorft xanthoastrocytom	94243	94243	475
Plexuspapillom, atypiskt choroitt (C71.5)	93901	93901	023
Plexuspapillom, choroitt (C71.5)	93900	93900	021
Plexuscarcinom, choroitt (C71.5)	93903	93903	026

forts C71

Morfologisk typ	Morf-kod ICDO/3	Morf-kod ICDO/2	C24/hist
“Retinal anlage tumor”	93630	93630	411
Subependymom	93831	93831	481
Teratoid/rhabdoid tumör, atypisk	95083	90801	823
Teratom, benignt	90800	90800	821
Teratom, malignt	90803	90803	826

Kommentar:

- Cysta, enkel intrakranial UNS, ingår ej i ICD-O/3. P.g.a. lokaliseringen är förändringen anmälningspliktig och kodas som angivits ovan.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

RYGGMÄRGEN, HJÄRNNERVER OCH ANDRA DELAR AV C72 CENTRALA NERVSYSTEMET

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Ryggmärg (medulla spinalis)	C72.0	C72.0	C72.0	192.2	193.1
Cauda equina	C72.1	C72.1	C72.1	192.2	193.1
* Luktnerf (nervus olfactorius) inkl luktbulb (bulbus olfactorius)	C72.2	C72.2	C72.2	192.0	193.0
* Synnerf (nervus opticus) inkl synnervskorsning (chiasma opticum)	C72.3	C72.3	C72.3	192.4	192.1
* Hörselnerv (nervus acusticus/vestibularis)	C72.4	C72.4	C72.4	192.0	193.0
Kranialnerv UNS	C72.5	C72.5	C72.5	192.0	193.0
Överväxt till/från angränsande sublokal med okänt ursprung inom C70-C72.5	C72.8	C72.9	C72.9	192.9	193.9
Centralt nervsystem UNS inkl epiduralrum	C72.9	C72.9	C72.9	192.9	193.9
Tidigare registrerades i ICD-O/2 multifokalt i läge C72, se nedan		C72.8	C72.8	192.8	193.8

INCA: startår, 2009.

Kommentar:

- Alla tumörer och tumörlika tillstånd registreras som maligna.

Multifokal lokalisation:

- Definieras som flera tumörer i samma lokal alternativt inom samma sublokal, dvs. avgränsat område inom ett organ, t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är olika eller samma tumörtyp (= morfologi). **Alltså: oavsett morfologi, lokal eller tidpunkt registreras varje tumör var för sig.**
- Vid flera samtidigt diagnostiserade tumörer med samma morfologi och inom samma sublokalisering översätts dessa till ICD-O/2 läge C72.8.

* **Obligatorisk sidoangivelse: 1=höger, 2=vänster sida, 9=okänd sida**

För morfologisk typ se nästa sida.

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Astrocytom, pilocytiskt/juvenilt	94211	94213	475
Acusticusneurinom (C72.4)	95600	95600	451
Astrocytom (lågmaligt gr I-II)	94003	94003	475
Astrocytom desmoplastiskt infantilt	94121	94213	475
Astrocytom gemistocytiskt	94113	94113	475
Astrocytom subendymalt av jättecellstyp	93841	93841	475
Astrocytom, anaplastiskt (högmalignt gr III)	94013	94013	476
Astrocytom, anaplastiskt (högmalignt, gr IV=Glioblastom)	94403	94403	476
Astrocytom, fibrillärt	94203	94203	475
Astrocytom, juvenilt (grad O-I)	94211	94213	475
Dermoidcysta	90840	90840	821
Ependymom (grad I-II)	93913	93913	485
Ependymom, anaplastiskt (gr III-IV)	93923	93923	486
Ependymom, myxopapillärt (C72.0)	93941	93941	485
Ependymom, papillärt	93933	93931	485
Gangliocytom	94920	94900	401
Gangliogliom UNS	95051	95051	475
Gangliogliom, anaplastiskt	95053	95053	476
Ganglioneuroblastom	94903	94903	406
Germinom	90643	90643	981
Glioblastom UNS, glioblastoma multiforme	94403	94403	476
Glioblastom, jättecellstyp	94413	94413	476
Gliom, blandat	93823	93823	476
Gliom, malignt	93803	93803	476
Gliosarkom	94423	94423	476
Hemangioblastom	91611	91611	511
Hemangiom	91200	91200	501
Lipom, UNS	88500	88500	721
Medulloblastom, desmoplastiskt nodulärt	94713	94713	436
Medulloblastom, storcelligt	94743	94703	436
Medulloepiteliom, UNS	95013	95013	436
Medulloepiteliom, teratoitt	95023	95023	436
Medullomyoblastom	94723	94723	436
Neuroblastom UNS	95003	95003	416
Neurocytom, centralt	95061	95061	411
Neuroektodermal tumör, melanotisk	93630	93630	411
Neuroepiteliom, UNS	95033	95033	416
Neurofibrom	95400	95400	451
Neurofibrom, plexiformt	95500	95500	451
Neurofibrosarkom	95403	95403	456

forts C72

Morfologisk typ	Morf-kod ICDO/3	Morf-kod ICDO/2	C24/hist
Neurinom	95600	95600	451
Neurinom, malignt	95603	95603	456
Olfaktorisk neurogen tumör (C72.2)	95203	95203	451
Olfaktoriskt neuroblastom (C72.2)	95223	95223	406
Olfaktoriskt neurocytom (C72.2)	95213	95213	451
Olfaktoriskt neuroepiteliom (C72.2)	95233	95233	426
Oligoastrocytom, mixed	93823	93823	476
Oligodendroblastom	94603	94603	476
Oligodendrogliom UNS	94503	94503	475
Oligodendrogliom, anaplastiskt	94513	94513	476
Opticusgliom (C72.3)	94003	94003	471
Perineuriom, intraneuralt, mjukdels	95710	95700	451
Perineuriom, malignt	95713	95703	456
Pleomorft xanthoastrocytom	94243	94243	475
Primitiv neuroektodermal tumör (PNET)	94733	94733	416
“Retinal anlage tumor”	93630	93630	411
Schwannom	95600	95600	451
Schwannom, malignt	95603	95603	456
Spongioblastom (grad 0-1)	94223	94223	475
Subependymom	93831	93831	481
Teratoid/rhabdoid tumör, atypisk	95083	90801	823
Teratom, benignt	90800	90800	821
Teratom, malignt	90803	90803	826

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

SKÖLDKÖRTEL (THYREOIDEA)

C73

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Sköldkörteln (thyreoidea)	C73.9	C73.9	C73	193.9	194
Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3		Morf-kod ICD-O/2		C24/hist
Anaplastiskt carcinom	80213				196
Carcinom (cancer) med thymus-liknande differentiering	85893				196
Follikulärt adenom, atypiskt/misstänkt malignt	83301/b				093/b
Follikulärt (adeno)carcinom, UNS	83303				096
Follikulärt (adeno)carcinom, minimal-invasivt	83353				096
Follikulärt (adeno)carcinom med komponent av medullärt carcinom	83463				196
Follikulär variant av papillärt adenocarcinom	83403				096
Hürtelcellsadenom (oxyfilt eller onkocytärt adenom)	82900/b				094/b
Hürtelcellscarcinom (oxyfilt eller onkocytärt carcinom)	82903				096
Insulärt carcinom	83373				096
Jättecellscarcinom	80313				196
Medullärt (adeno)carcinom med amyloidstroma (C-cellscarcinom)	83453				186
Medullärt (adeno)carcinom, UNS	85103				186
Mucinöst carcinom	84803				096
Mukoepidermoid cancer	84303				046
Odifferentierat carcinom	80203				196
Oxyfilt eller onkocytärt adenom (Hürtelcellsadenom)	82900/b				094/b
Oxyfilt eller onkocytärt carcinom (Hürtelcellscarcinom)	82903				096
Papillärt (adeno)carcinom med komponent av medullärt carcinom	83473				196
Papillärt (adeno)carcinom, UNS	82603				096
Papillärt (adeno)carcinom, "högcalls"-variant ("Tall cell"-typ)	83443				096
Skivepitelcancer (ovanligt, uteslut metastas)	80703				146
Skleroserande, ej avkapslat, carcinom enligt Graham	83503				196
Småcelligt carcinom, UNS, inkl småcelligt neuroendokrint carcinom	80413				196
Storcelligt carcinom, UNS	80123				196

Kommentar:

- I sköldkörteln registreras endast Hürtelcells-(synonym oxyfilt eller onkocytärt) adenom, dvs. inga andra typer oavsett endokrin aktivitet.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

BINJURE (glandula suprarenalis)

C74

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
* Bark (cortex)	C74.0	C74.0	C74.0	194.0	195.0
* Märg (medulla)	C74.1	C74.1	C74.1	194.0	195.0
* Binjure, UNS	C74.9	C74.9	C74.9	194.0	195.0

* Obligatorisk sidoangivelse:

1=höger 2=vänster 9=okänd sida

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Binjurebarksadenom (C74.0)	83700		091
Binjurebarks(adeno)carcinom (C74.0)*	83703		096
Feokromocytom, UNS, inkl kromaffint paragangliom (C74.1)	87000		441
Feokromocytom, malignt, UNS/feokromoblastom (C74.1)	87003		446
Kemodektom, paragangliom, UNS (C74.1)	86931		441
Neuroblastom, UNS (C74.1)	95003		416
Neuroendokrint carcinom, UNS	82463		446
Paragangliom, kemodektom, UNS (C74.1)	86931		441

Kommentar: *

- Endast kliniskt endokrint aktiva binjurebarksadenom skall registreras nämligen:
 - Conn-tumörer – aldosteronproducerande.
 - Cushings syndrom – cortisolproducerande.
 - Viriliserande – testosteronproducerande.
 - Östrogenproducerande (alla)
- "Incidentalom"- icke endokrint aktivt (upptäckta av en tillfällighet radiologiskt) skall ej registreras.

OBS! Obduktionsupptäckta fall av binjurebarksadenom registreras ej, eftersom oklarhet torde råda om de kliniskt varit endokrint aktiva eller ej.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

ÖVRIGA ENDOKRINA KÖRTLAR OCH DÄRMED BESLÄKTADE VÄVNADER

C75

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Bisköldkörtel (glandula parathyreoidea)	C75.0	C75.0	C75.0	194.1	195.1
Hypofys inkl Rathkes ficka	C75.1	C75.1	C75.1	194.3	195.3
Hypofysgång (ductus craniopharyngealis)	C75.2	C75.2	C75.2	191.7	193.0
Tallkottkörtel (corpus pineale)	C75.3	C75.3	C75.3	194.4	193.0
Glomus caroticum	C75.4	C75.4	C75.4	194.5	195.7
Paraganglier inkl "aortic body" och "glomus jugulare"*	C75.5	C75.5	C75.5	194.6	195.7
		C75.9	C75.9	194.9	195.9
Multifokal lokalisation, inkl familjär kromaffinomas och multifokal endokrin adenomas, MEA I och II	C75.8	C75.8	C75.8	194.8	195.8
Endokrin körtel, UNS	C75.9	C75.9	C75.9	194.9	195.9

Kommentar:

- Endokrina delen av bukspottskörtel (C25.4) ingår ej, ej heller motsvarande delar av äggstockar, testiklar, bräss eller sköldkörtel.
- * Glomus jugulare registrerades tidigare felaktigt på läge C75.9
- Endokrint differentierade tumörer i gastrointestinalkanalerna kodas på respektive läge.

För morfologisk typ se nästa sida!

forts C75

Morfologisk typ	Morf-kod ICD-O/3	Morf-kod ICD-O/2	C24/hist
Adenom, kromofobt (C75.1)	82700		091
Adenom, UNS	81400		091
Adenom i parathyreoidea eller hypofys med atypi	81401		093
Familjär kromaffinomas (C75.8)	87000		441
Cysta, enkel intrakraniell UNS	33400		031
Gastrinom, UNS (C75.9)	81531		441
Gastrinom, malignt (C75.9)	81533		446
Glomus aorticum-tumör, paragangliom (C75.5)	86911		441
Glomus caroticum-tumör, paragangliom (C75.4)	86921		441
Glomus jugulare-tumör, paragangliom (C75.5)	86901		441
Glukagonom, UNS (C75.9)	81521		441
läge (C25.4) skall användas för endokrin i bukspottskörtel			
Glukagonom, malignt (C75.9)	81523		446
läge (C25.4) skall användas för endokrin i bukspottskörtel			
Huvudcellsadenom (C75.0)	83210		091
Kemodectom/extraadrenalt paragangliom, UNS (C75.5)	86931		441
Kraniofaryngeom (C75.2)	93501		881
Kromofobt adenom (C75.1)	82700		091
Kromofobt carcinom (C75.1)	82703		096
MEA I och II (C75.8)	83601		441
Neuroblastom, UNS	95003		416
Neuroendokrint carcinom, UNS	82463		446
Oxyfilt eller onkocytärt adenom (C75.0), (C75.1)	82900		091
Paragangliom, glomus aorticum (C75.5)	86911		441
Paragangliom, glomus caroticum (C75.4)	86921		441
Paragangliom, glomus jugulare (C75.5)	86901		441
Paragangliom, UNS i annat läge (C75.5)	86801		441
Paragangliom, i annat läge, malignt (C75.5)	86803		446
Pinealom (C75.3)	93601		981
Pinealom, malignt eller pineoblastom (C75.3)	93623		986
Prolaktinom (C75.1)	82710		091
Seminom, UNS (C75.3)	90613		066
Vipom, UNS	81551		091
Vipom, malignt	81553		096

Kommentar:

- Vid tumörliknande tillstånd vid hyperparathyreodism, kontrollera att det verkligen rör sig om adenom och inte hyperplasi.
- Vipom med malign Morf-kod = 81553 registrerades tidigare felaktigt med C24/hist 091.

OFULLSTÄNDIGT ANGIVET LÄGE

C76

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
Icke närmare specificerad lokalisation i huvudet, i ansiktet eller på halsen	C76.0	C76.0	C76.0	195.0	199.1
Icke närmare specificerad lokalisation i brösthålan eller på bröstkorgen (thorax)	C76.1	C76.1	C76.1	195.1	199.2
Icke närmare specificerad lokalisation i bukhålan eller bukväggen	C76.2	C76.2	C76.2	195.2	199.3
Icke närmare specificerad lokalisation i lilla bäckenet samt skinkor, ljumskar mm	C76.3	C76.3	C76.3	195.3	199.4
Icke närmare specificerad lokalisation i övre extremiteterna, inkl skulderregionen	C76.4	C76.4	C76.4	195.4	199.5
Icke närmare specificerad lokalisation i nedre extremiteterna inkl höfterna	C76.5	C76.5	C76.5	195.5	199.5
Icke specificerad lokalisation inkl rygg, flank och bål, UNS	C76.7	C76.7	C76.7	195.9	199.9
Övergripande växt i annan och/eller ofullständigt angiven lokalisation	C76.8	C76.7	C76.7	195.9	199.9

Kommentar:

- Till dessa lägen skall även föras tumörer där histologisk eller cytologisk bedömning saknas, och dessa skall ha Morf-kod 80003.
- Vid misstänkt malignitet skall Morf-koden vara 80001/b.
- Mjukdelssarkom med okänd primärlokal får ej registreras på läge C76 utan skall registreras på läge C49.

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

LYMFKÖRTEL, endast tumörer primära i denna lokal

C77

Kliniskt läge	ICD-O/3
Huvud, ansikte och hals	C77.0
Intratorakalt	C77.1
Intraabdominellt	C77.2
Axill och övre extremitet	C77.3
Ljumske och nedre extremitet	C77.4
Bäcken	C77.5
Lymfkörtlar i multipla kroppsregioner	C77.8
Lymfkörtel UNS	C77.9

Kommentar:

För översättning till ICD-O/2, ICD9 samt ICD7, var god se lymfomkapitlet.

Morfologisk typ:

Se listan över maligna lymfom.

Kommentar till regel D enligt ICD-0/3-klassifikationen. Topografiska koder för lymfom.

- Om ursprungslokaliseringen för lymfomet är lymfkörtlarna, registreras på läge C77._.
- Om ett lymfom engagerar lymfkörtlar i flera olika områden, registreras på läge C77.8
- (lymfkörtlar i multipla kroppsregioner).
- Lymfom ej lokaliserade till lymfkörtlar registreras på ursprungslokaliseringen. Om ingen lokalisering anges för ett lymfom registreras det på läge C80.9 (okänd ursprungslokalisering).

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.

**MALIGN TUMÖR MED OKÄND PRIMÄR
LOKALISATION,
sekundära maligna tumörer**

C80
(C77-C80)

Kliniskt läge	ICD-O/3	ICD-O/2	ICD10	ICD9	ICD7
OKÄND PRIMÄR LOKALISATION					
Ospecificerad lokalisation	C80.9	C80.9	C80	199.1	199.9
Multifokal lokalisation, ospecificerad	C80.9	C80.9	C80	199.0	199.9
Lever UNS	C80.9	C22.9	C22.9	155.2	156
Lunga och pleura UNS	C80.9	C39.8	C39.8	165.9	163
SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I LYMFKÖRTEL					
Huvud, ansikte och hals	C80.9	C77.0	C77.0	196.0	199.9
Intratorakalt	C80.9	C77.1	C77.1	196.1	199.9
Intraabdominellt	C80.9	C77.2	C77.2	196.2	199.9
Axill och övre extremitet	C80.9	C77.3	C77.3	196.3	199.9
Ljumske och nedre extremitet	C80.9	C77.4	C77.4	196.5	199.9
Bäcken	C80.9	C77.5	C77.5	196.6	199.9
Lymfkörtlar i multipla kroppsregioner	C80.9	C77.8	C77.8	196.8	199.9
Lymfkörtlar UNS	C80.9	C77.9	C77.9	196.9	199.9
SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I ANDNINGS- OCH MATSMÄLTNINGSORGANEN					
Metastas i lunga	C80.9	C78.0	C78.0	197.0	199.9
Metastas i mediastinum	C80.9	C78.1	C78.1	197.1	199.9
Metastas i lungsäck	C80.9	C78.2	C78.2	197.2	199.9
Metastas i andra och ospecificerade respirationsorgan	C80.9	C78.3	C78.3	197.3	199.9
Metastas i tunntarm	C80.9	C78.4	C78.4	197.4	199.9
Metastas i tjocktarm och ändtarm	C80.9	C78.5	C78.5	197.5	199.9
Metastas i bukhinna och retroperitonealrummet	C80.9	C78.6	C78.6	197.6	199.9
Metastas i lever	C80.9	C78.7	C78.7	197.7	199.9
Metastas i andra ospecificerade matsmältningsorgan	C80.9	C78.8	C78.8	197.9	199.9

SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR MED ANDRA LOKALISATIONER

Metastas i njure och njurbäcken	C80.9	C79.0	C79.0	198.0	199.9
Metastas i urinblåsa och andra specificerade urinorgan, urinorgan UNS	C80.9	C79.1	C79.1	198.1	199.9
Metastas i huden	C80.9	C79.2	C79.2	198.2	199.9
Metastas i hjärnan och hjärnhinnor	C80.9	C79.3	C79.3	198.3	199.9
Metastas i andra och ospecificerade delar av nervsystemet	C80.9	C79.4	C79.4	198.4	199.9
Metastas i ben och benmärg	C80.9	C79.5	C79.5	198.5	199.9
Metastas i ovarium	C80.9	C79.6	C79.6	198.6	199.9
Metastas i binjure	C80.9	C79.7	C79.7	198.9	199.9
Metastas i andra specificerade lokalisationer	C80.9	C79.8	C79.8	198.9	199.9

Kommentar:

- Mjukdelssarkom med okänd primärlokal får ej förekomma på läge C80.9, dessa registreras på läge C49.
- I dessa lägen kan även registreras fall där PAD/CYT-uppgift saknas.
- Variationerna är stora. Flertalet utgöres av metastaserande epiteliala tumörer (carcinom).

Kommentar till regel D enligt ICD-0/3-klassifikationen. Topografiska koder för lymfom.

Lymfom ej lokaliserade till lymfkörtlar registreras på ursprungslokalisationen. Om ingen lokalisering anges för ett lymfom registreras det på läge C80.9 .

För morfologi, se WHO ICD-O, Third edition.