

Statistik om stroke 2016


År 2016 inträffade drygt 28 300 strokefall fördelat på cirka 26 500 personer. Cirka 6 900 personer dog av sjukdomen. Sedan 2002 har både insjuknade och dödlighet per 100 000 invånare minskat med närmare 40 procent, med hänsyn till åldersstruktur i befolkningen. I 26 procent av strokefallen 2016 avled personen inom 28 dagar från insjuknande.

Stroke vanligast bland äldre

Statistiken om stroke omfattar både hjärninfarkt och hjärnblödning Enligt preliminära siffror för 2016 drabbades cirka 26 500 personer av stroke under året (se faktaruta sid. 3). Antalet inträffade fall av stroke var drygt 28 300, vilket motsvarar 370 strokefall per 100 000 invånare (incidens). Cirka 6 900 personer avled med stroke som dödsorsak under 2016. Det motsvarar 90 döda per 100 000 invånare (mortalitet).

Stroke förekommer i alla åldrar men är mycket vanligare bland äldre än bland yngre. Figur 1 visar incidens och mortalitet under 2016 för olika åldersgrupper. Både antalet fall av stroke och avlidna per 100 000 i befolkningen ökar betydligt för varje högre åldersintervall.

Figur 1. Antal fall och dödlighet i stroke per 100 000 invånare efter kön och ålder, 2016




Det är vanligare att män insjuknar i stroke än kvinnor. Inom varje åldersgrupp har män högre insjuknande och högre dödlighet. För hela befolkningen från 20 år och uppåt är däremot skillnaden i incidens mellan könen mindre medan dödligheten i befolkningen är något högre för kvinnor än för män. Det beror på att

äldre drabbas av stroke i högre utsträckning än yngre och att andelen äldre är högre bland kvinnor än bland män.

Insjuknande och dödlighet minskar

Under 2000-talet har både antal strokefall per 100 000 invånare och antal döda per 100 000 invånare minskat stadigt. I figur 2 visas utvecklingen för kvinnor och män mellan åren 2002 och 2016. Siffrorna är åldersstandardiserade, vilket betyder att de är justerade för skillnader i befolkningens åldersstruktur. Både incidensen och mortaliteten har minskat med närmare 40 procent under perioden, både för kvinnor och för män.



Med hänsyn till skillnader i åldersstruktur inträffar cirka 40 procent fler fall av stroke bland män jämfört med bland kvinnor. Skillnaden mellan könen är mindre när det gäller dödlighet. Med hänsyn till åldersstruktur och antal i befolkningen avlider fler män än kvinnor, trots att det absoluta antalet kvinnor som dör av stroke är högre.

Skillnader mellan länen i andel som dör efter stroke

Letalitet är andelen av inträffade fall där personen dör inom en viss tidsperiod. Bland de fall av stroke som inträffade 2016 avled den insjuknade samma dag i 15 procent av fallen. I 26 procent av fallen dog personen inom 28 dagar och i 37


procent av fallen avled personen inom ett år. Här ingår samtliga som avlidit, oavsett dödsorsak.

Andelen som dör samma dag som insjuknande är lika för kvinnor och män, medan kvinnor har någon procentenhet högre letalitet inom 28 dagar och inom ett år jämfört med männen.

Letaliteten skiljer sig mellan länen. I figur 3 visas andel döda inom 28 dagar efter insjuknande uppdelat efter personens hemlän. För bättre jämförbarhet mellan länen presenteras medelvärden för åren 2014–2016 och siffrorna är åldersstandardiserade.

Figur 3. Andel döda inom 28 dagar av samtliga fall av stroke efter hemlän, 20 år och äldre, medelvärde 2014–2016*

Åldersstandardiserade siffror



Lägst var letaliteten för boende i Kronoberg, Västmanland, Stockholm, Uppsala och Jämtland. Där var andelen avlidna inom 28 dagar efter insjuknande mindre än 24 procent. Kalmar hade högst dödlighet med drygt 30 procent, följt av Södermanland, där den insjuknade avled inom 28 dagar i drygt 29 procent av fallen.

Strokesjukdomar i statistiken enligt ICD-10:

- Hjärnblödning (I61)
- Cerebral infarkt (I63)
- Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt (I64)

Preliminära siffror från patientregistret för år 2016

I strokestatistiken skattas incidensdatumet med inskrivningsdatumet i patientregistret eller dödsdatumet i dödsorsaksregistret. Patientregistret innehåller bara vårdtillfällen där patienten blivit utskriven. Vårdtillfällen som påbörjades 2016 men avslutades 2017 är inte med i den här rapporten vilket innebär att det senaste årets siffror för slutenvård kommer att justeras något. Sjukhusvårdade med utskrivning året efter inskrivningsåret motsvarar cirka 2 procent av fallen.

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen:

www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-18

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:

www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/stroke

Kontakt:

Maria Öman, statistikfrågor

Telefon: 075-247 34 87

E-post: maria.oman@socialstyrelsen.se

Maria State, sakfrågor

Telefon: 075-247 47 76

E-post: maria.state@socialstyrelsen.se