Socialstyrelsen

2026-11-17
Art.nr: 2026-11-10522

Statistik om stroke 2025


Under 2025 inträffade omkring 25 500 strokefall, fördelade på cirka 24 000 personer. Det var ungefär 400 färre strokefall än året innan. Antalet personer som avled med stroke som underliggande dödsorsak minskade också med cirka 200 jämfört med 2024. Under 2000-talet har både antalet personer som insjuknar i stroke och antalet personer som avlider till följd av stroke mer än halverats, när hänsyn tas till befolkningsökningen och förändringar i åldersstrukturen.

Insjuknande och dödlighet minskar

Statistiken över stroke omfattar både cerebral infarkt och hjärnblödning. Under 2025 inträffade omkring 25 500 strokefall, fördelade på cirka 24 000 personer, vilket var omkring 400 färre strokefall än under 2024. Under 2000-talet har både incidensen, det vill säga antalet strokefall per 100 000 invånare, och mortaliteten, det vill säga antalet avlidna per 100 000 invånare, minskat stadigt. Figur 1 visar utvecklingen för kvinnor och män under perioden 2001–2025. Siffrorna är åldersstandardiserade, vilket innebär att de har justerats för förändringar i befolkningens åldersstruktur mellan olika år. Både incidensen och mortaliteten har mer än halverats sedan år 2001. Minskningen är ungefär lika stor bland män och kvinnor.

Figur 1. Antal incidens och mortalitet i stroke per 100 000 invånare, 20 år och äldre, efter kön och år, 2001–2025

Åldersstandardiserade siffror



Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Antalet personer som avled med stroke som dödsorsak minskade med omkring 200 jämfört med 2024, till cirka 4 900 personer under 2025.

Statistiken omfattar dödsfall där stroke anges som antingen underliggande eller övrig dödsorsak[1] på dödsorsaksintyget.


Var fjärde person med stroke avlider inom 28 dagar

Letalitet beskriver andelen av inträffade strokefall där personen avlider, oavsett dödsorsak, inom en viss tidsperiod. Under perioden 2001–2025 minskade andelen som avled efter stroke för både män och kvinnor. Minskningen gäller dödsfall samma dag som insjuknandet, inom 28 dagar eller inom 365 dagar efter insjuknandet.

Minskningen har skett gradvis, även om variationer förekommer mellan enskilda år. Figur 2 visar utvecklingen av letaliteten samma dag som insjuknandet samt inom 28 respektive 365 dagar efter stroke. Siffrorna är åldersstandardiserade och redovisas uppdelade efter kön.

Figur 2. Andel avlidna inom 0, 28 och 365* dagar av samtliga fall av stroke, 20 år och äldre, 2001–2025

Åldersstandardiserade siffror



*Preliminära uppgifter för 2025

Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Av de strokefall som inträffade 2025 avled cirka 10 procent av personerna samma dag, cirka 22 procent inom 28 dagar och 31 procent inom ett år.


[1] Underliggande dödsorsak är den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som ledde till döden, eller de omständigheter vid en olycka eller våldshandling som framkallade den dödliga skadan. På dödsorsaksintyget anges förutom underliggande dödsorsak ofta andra dödsorsaker, såsom komplikationer till följd av den underliggande dödsorsaken samt bidragande dödsorsaker.

Letaliteten ökade något under 2020, men därefter har en liten minskning skett. Skillnaden i letaliteten mellan män och kvinnor är liten. Risken att avlida efter stroke ökar med åldern. Bland personer som var 85 år eller äldre och insjuknande i stroke under 2025 avled cirka 20 procent samma dag och omkring 38 procent inom 28 dagar.

Stroke vanligast bland äldre

Figur 3 visar incidens och mortalitet under 2025 för olika åldersgrupper, uppdelat efter kön. Stroke förekommer i alla åldrar, men är betydligt vanligare bland äldre än bland yngre. Både antalet strokefall och antalet avlidna per 100 000 invånare ökar markant med stigande ålder.

Figur 3. Antal incidens och mortalitet i stroke per 100 000 invånare efter kön och ålder, 2025



Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Knappt fyra procent av de strokefall som inträffade under 2025 gällde personer i åldern 20–49 år, vilket motsvarar cirka 950 personer. Endast cirka en procent av alla som avled med stroke som underliggande eller bidragande dödsorsak under 2025 var yngre än 50 år, vilket motsvarar 51 personer. Tre av fyra personer som insjuknade i stroke under 2025 var 70 år eller äldre. Bland personer som avled med stroke som underliggande eller bidragande dödsorsak var nio av tio 70 år eller äldre.

Män insjuknar oftare i stroke

Under de senaste fem åren (2021–2025) har antalet nya strokefall per 100 000 invånare, med hänsyn till åldersskillnader mellan könen, i genomsnitt varit cirka 40 procent högre bland män än bland kvinnor. Skillnaden mellan könen är mindre när det gäller mortalitet i stroke. Med hänsyn till åldersskillnader har mortaliteten i stroke per 100 000 invånare i genomsnitt


varit cirka 24 procent högre bland män än bland kvinnor under samma period. I absoluta tal avled något färre män än kvinnor med stroke under 2025, vilket även har varit fallet tidigare år, med undantag för 2020 då ungefär lika många män som kvinnor avled. Att fler kvinnor än män avlider med stroke som dödsorsak förklaras av att stroke är betydligt vanligare bland äldre än bland yngre och att kvinnor utgör en större andel av den äldre befolkningen.

Högre incidens av stroke i områden med socioekonomiska utmaningar

Figur 4 visar incidensen av stroke under 2025 bland personer som bor i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Områdena sträcker sig från områden med stora socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar, uppdelat efter kön.

Figur 4. Antal strokefall per 100 000 invånare i stroke efter områdestyp och kön, 2025

Åldersstandardiserade siffror



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen, Statistikmyndigheten SCB

Incidensen av stroke varierar mellan områdestyperna. Bland kvinnor är incidensen högst i områden med stora socioekonomiska utmaningar, medan den bland män är högst i områden med socioekonomiska utmaningar. För både kvinnor och män är incidensen lägst i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Bland män varierar den från 394 fall per 100 000 invånare i områden med stora socioekonomiska utmaningar till omkring 298 fall per 100 000 invånare i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Motsvarande siffror för kvinnor är 299

respektive 209 fall per 100 000 invånare. I alla områden har män fler stroke-fall än kvinnor, men skillnaden mellan könen är något mer framträdande i området med socioekonomiska utmaningar.

Vad baseras statistiken på?

I strokestatistiken används inskrivningsdatum för slutenvården i patientregistret för att skatta incidensdatum. I de fall som patienten avled utan att ha blivit sjukhusvårdad skattas incidensdatum utifrån dödsdatumet i dödsorsaksregistret. Alla händelser från och med dag 0 till och med dag 27 tillhör samma incidenta fall.

Strokesjukdomar i statistiken enligt ICD-10

- Hjärnblödning (I61)
- Cerebral infarkt (I63)
- Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt (I64)

Områdestyp och regionala statistikområden

Områdestyp är ett mått för socioekonomiska förutsättningar. Måttet bygger på ett index som innehåller andel personer med låg ekonomisk standard, andel personer med förgymnasial utbildning och andelen med ekonomiskt bistånd och/eller långtidsarbetslösa. Totalt finns det fem områdestyper som sträcker sig från områden med stora socioekonomiska utmaningar (1) till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar (5). Områdena är kategoriserade utifrån regionala statistikområden, RegSo. RegSo delar in Sverige i 3 363 områden som följer läns- och kommungränserna och dessa uppgifter uppdateras årligen med utgångspunkt i befolkningen per den 31 december.

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här (välj Tillhörande dokument och bilagor):
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/stroke/

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:
www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikdatabasen

Kontakt:

Malin Johansson, statistikfrågor
Telefon: 075-247 30 00
E-post: patientregistret@socialstyrelsen.se

Maria State, sakfrågor
Telefon: 075-247 30 00
E-post: Maria.State@socialstyrelsen.se