


Rättelser till "Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013", artikelnummer: 2013-3-15

Kapitel 2:

Diagram 2:31, sidan 58 är ofullständigt i rapporten. Nedanstående diagramdel innehåller tillägget:

Figur 2:31. E-H. Sociala skillnader i sjukhusvård för olika psykiatriska diagnoser i åldern 15-29 år, 1991-2011

Antal sjukhusvårdade per 10 000, män och kvinnor, 15-29 år, efter moderns högst uppnådda utbildning. 1991-2011.



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen och Utbildningsregistret, Statistiska centralbyrån.

Kapitel 3, sidan 78:

Tidigare text:

Ungefär 20 procent av pojkarna i HVB och 17 procent av flickorna i HVB behandlades med psykofarmaka utan att de fått psykiatrisk dia-

gnos. Motsvarande andel inom familjehem var omkring 10 procent (för både pojkar och flickor) och tre procent för övriga barn och unga. Placerade barn och unga använder alltså betydligt mer psykofarmaka jämfört med övriga i samma åldersgrupp, i synnerhet de som är placerade i HVB. Detta gäller oavsett om de har fått en psykiatrisk diagnos eller inte.

Ny text:

Bland dem som inte hade en psykiatrisk diagnos var det exempelvis 45 gånger vanligare att behandlas med antipsykotiska läkemedel bland flickor i HVB, än bland flickor som inte var placerade (4,5 procent jämfört med 0,1 procent). Av alla barn och unga 11–20 år som var placerade i HVB stod närmare 20 procent på psykofarmaka utan att ha en psykiatrisk diagnos (visas ej i tabell). Motsvarande andel inom familjehem var omkring 10 procent och tre procent bland dem som aldrig varit placerade.

Tabell 3:5.

Övre tabellrubrik ska vara: Förekomst av psykofarmaka i samband med diagnos.

Undre tabellrubrik ska vara: Andel (%) unga med psykofarmaka bland personer (11–20 år) med respektive utan psykiatrisk diagnos*, uppdelat på kön och boendeform, år 2011. För läkemedelsgrupperna antipsykotiska, antidepressiva eller ångestdämpande.