

Cancerincidens i Sverige 2012

Nya diagnosticerade cancerfall år 2012

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och sjukvård
Cancerincidens i Sverige 2012
Nya diagnosticerade cancerfall år 2012

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Cancer Incidence incidence in Sweden 2012

Information: 075-247 30 00 vx

*Tidigare publicering:
Cancer incidence in Sweden 2011*

*Previous publication:
Cancer incidence in Sweden 2011*

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

ISSN	1400-3511
ISBN	978-91-7555-126-5
Artikelnummer	2013-12-17
Publicerad	www.socialstyrelsen.se , januari 2014

Förord

Det svenska cancerregistret grundades 1958 och används till statistikframställning och forskning. Målet är att tillhandahålla en tillförlitlig statistik med hög kvalitet och vara en datakälla för klinisks och epidemiologisk forskning samt att möjliggöra internationella jämförelser. Denna publikation är den 55:e årliga rapporten om förekomsten av cancer i Sverige från det svenska cancerregistret och innehåller uppgifter för 2012 och perioden 1970-2012. Rapporten är riktad till såväl forskare som media och allmänhet. Tumörernas läge och morfologiska diagnos av har kodats enligt ICD-O/3 som sedan 1:a januari 2005 finns i det svenska cancerregistret. ICD-O/3 har sedan översatts till den tidigare versionen ICD-7 som ligger till grund för presentationer av figurer och tabeller.

Stockholm i januari 2014

Anders Åberg
Enhetschef
Statistikenhet 2
Avdelningen för Statistik och Jämförelser

Innehåll

Förord	3
Tabellförteckning	7
Sammanfattning	9
Summary.....	10
Cancerregistret	11
Innehåll i cancerregistret	11
Innehåll i den officiella statistiken	11
Statistiska mått.....	14
Incidens	14
Antal fall	14
Antal fall per 100 000 individer.....	15
Antalet fall per 100 000, åldersstandardiserad incidens.....	17
Jämförelse av ökningen i olika cancerincidensmått	17
Årlig procentuell ökning av cancerincidensen	18
Risken att få en cancerdiagnos	19
Mortalitet	19
Cancerincidens per läge	20
Bröstcancer	20
Prostatacancer.....	22
Hudcancer.....	24
Malignt melanom	25
Lungcancer	27
Tjocktarmscancer.....	28
Övriga cancersjukdomar.....	30
Cancerincidens efter län	35
Cancerincidens efter utbildning	36
Risken att utveckla cancer.....	37
Trender.....	39
Tabeller	42
Referenser	109
Appendix 1.....	110
Appendix 2.....	111
Appendix 3.....	114
Rapportering till Cancerregistret	114

Tabellförteckning

Tabell A	Inrapporterade tumörer till cancerregistret avseende år 2012. Innehåll i officiell statistik, Män
Tabell B	Inrapporterade tumörer till cancerregistret avseende år 2012. Innehåll i officiell statistik, Män Inrapporterade tumörer till cancerregistret avseende år 2012. Innehåll i officiell statistik, kvinnor
Tabell C	Fall per 100 000 efter grupper med olika utbildningsnivå
Tabell D	Kumulativ risk att utveckla cancer innan en viss uppnådd ålder
Tabell E	Skattning av årlig, genomsnittlig procentuell förändring av incidensen
Tabell 1	Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos
Tabell 2	Antal nya fall efter läge, kön och län
Tabell 3A	Antal nya fall efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Tabell 3B	Antal nya oväntade fall upptäckta vid obduktion efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Tabell 3C.	Antal nya fall för personer som fått minst en tumör tidigare efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Tabell 4	Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.
Tabell 5	Antal nya fall per 100 000 personer, åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000 efter läge, kön och län
Tabell 6	Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000, Fördelning efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Tabell 7	Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter världsbe- folkningen. Fördelning efter läge, kön och diagnosår 1993- 2012
Tabell 8	Andel fall (%) cytologiskt eller histologiskt verifierade efter läge kön och ålder vid diagnos
Tabell 9	Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön och ålder vid diagnos
Tabell 10	Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön, sjuk- vårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Tabell 11	Andelen (%) individer av antalet tumörer
Tabell 12	Number of tumors in situ

Sammanfattning

Under 2012 rapporterades 57 270 maligna tumörer för sammanlagt 54 447 personer, till cancerregistret. Av dessa fick 45 413 personer en cancerdiagnos för första gången. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn: 51 procent av tumörerna är bland män och 49 procent bland kvinnor. Antalet tumörer har under de två senaste decennierna ökat med i genomsnitt 2,1 procent per år för män och 1,6 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur, screening och förbättrade diagnostiska metoder men även av exponering för riskfaktorer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 30,4 procent av all kvinnlig cancer. Incidensen för bröstcancer har ökat sen 1970. Antal kvinnor i åldern 50-64 år som under ett år får en bröstcancerdiagnos har dock sedan början av 2000-talet en nedåtgående trend. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för 30,6 procent av fallen under 2012. Incidensen av prostatacancer har i genomsnitt ökat med 1,7 procent per år under den senaste 20-årsperioden. De senaste åren har antalet fall dock minskat. Incidensen av prostatacancer är relaterad till användningen av PSA-test i vården och således är det oklart hur incidenstrenden kommer utvecklas de kommande åren.

Malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcancers) utgör sammanlagt 15,5 procent av alla cancerfall. Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen och den som ökar mest. Under 2012 fick 2 214 kvinnor och 2 938 män en hudcancerdiagnos. Den årliga procentuella ökningen av antalet rapporterade maligna hudcancertumörer var 6,9 procent för kvinnor och 4,7 procent för män.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män. Sammantaget utgör den drygt 7 procent av alla fall som rapporterats till cancerregistret för 2012. Under en 20-årsperiod har inciden- sen för lungcancer bland män minskat med 0,5 procent per år medan den har gått upp 2,9 procent per år bland kvinnor. För yngre kvinnor har dock inciden- sen i lungcancer minskat. Sannolikheten för en man att diagnostiseras med cancer före 75 års ålder är 30 procent och motsvarande sannolikhet för kvinnor är 28 procent.

Det finns stora skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå. I gruppen kvinnor med grundskola som högsta utbildningsnivå är lungcancerincidensen 69 fall per 100 000 kvinnor vilket är mer än dubbelt så högt som för gruppen med en eftergymnasial utbildning som har en incidens på 31 fall per 100 000 kvinnor. Incidensen för malignt melanom är 57 fall per 100 000 män i gruppen med en eftergymnasial utbildning medan den är 33 i gruppen med grundskola som högsta utbildning. Det finns även geografiska skillnader i cancerincidens. De norra länen har en lägre incidens av malignt melanom och övrig hudcancer än län i södra Sverige.

Summary

During 2012 there were 57,270 cases of malignant cancers diagnosed and reported to the Swedish Cancer Registry; 52 per cent of them in men and 48 per cent in women. The number of persons for whom the cancer has been diagnosed for the first time is 45,413. During the last two decades the average annual increase in number of cases has been 2.1 per cent for men and 1.6 per cent for women. The increase is partly explained by the ageing population, but also by the introduction of screening activities, improvements in diagnostic practices and exposure to various risk factors. Breast cancer is the most common cancer in women representing 30.4 per cent of the cases in 2012. The average annual increase has been 1.3 per cent during the last two decades. Prostate cancer is the most common cancer in men, representing 30.6 per cent of the male cases in 2012. On average, the incidence has increased by 1.7 per cent annually seen over the last 20 years. In the past five years, the incidence of prostate cancer has slightly decreased. The incidence of prostate cancer is related to the use of PSA testing in health care and therefore it is uncertain how the incidence trend will develop over the coming years. Malignant melanoma and other skin cancer (except basal cell carcinoma) represent 15.5 per cent of the cancer cases in Sweden. Skin cancer is more common than malignant melanoma and is the second most common cancer in both men and women. The incidence is increasing for both sexes and is higher in women than in men. Colon cancer is the third most common cancer in both men and women, corresponding to 7 per cent of the total number of cases. The incidence rate of lung cancer in women has increased. For men, the corresponding incidence has decreased, although it is still more common among males than females.

The probability of developing cancer before the age of 75 is 30 per cent among men and 28 per cent among women. There are significant differences between groups with different levels of education. In the group of women with an educational level in 9 years, the lung cancer incidence rate is 69 cases per 100,000 women. That means that the incidence rate is more than twice as high as in the group with a postsecondary education, who have an incidence rate of 31 cases per 100,000 women. Among men with a postsecondary education, the incidence rate of malignant melanoma is 57 cases per 100,000, while it is only 33 in the group with a compulsory education.

Cancerregistret

Innehåll i cancerregistret

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar för vilka celler på ett okontrollerat sätt börjat växa till tumörer. Dessa maligna (elakartade) tumörer kan växa in i intilliggande vävnad och sprida sig via blodomloppet och lymfsystemet. Primärtumören kan då bilda metastaser (dottertumörer) andra delar av kroppen.

Till nationella cancerregistret rapporteras främst maligna tumörer, förstadiet till maligna tumörer (cancer in situ) och vissa godartade tumörer som kan utgöra ett allvarligt problem beroende på var i kroppen tumören växer. Till cancerregistret rapporteras *inte* återfall (recidiv) i samma cancersjukdom eller metastaser. Metastaser rapporteras endast i de fall där primärtumören inte är känd sen tidigare. Inrapporteringen är anmälningspliktig och regleras i föreskriften, SOSFS 2003:13. I Tabell A och B redovisas dels innehållet i cancerregistret och dels innehållet i den officiella statistiken. Redovisning sker efter läge enligt ICD-7 (se appendix om innehåll i cancerregistret) och beskriver var tumören påträffats. En individ kan ha flera tumörer och antalet individer är därför ofta något mindre än antalet tumörer. Antalet tumörer är fördelade på benigna, in situ och maligna tumörer. T.ex. var antalet män som fick tjocktarmscancer (ICD-7 = 153) 2 515 st. För dessa män rapporterades sammanlagt 2 709 tumörer varav 25 tumörer var godartade och 600 tumörer utgjorde förstadium till tjocktarmscancer. 2 084 tumörer var elakartade. Se appendix 2 för närmare beskrivning av datainsamling och variabelinnehåll i cancerregistret.

Innehåll i den officiella statistiken

Cancerregistret utgör ett underlag för den officiella statistiken. I tabell A och B redovisas tumörer som ingår i den officiella statistiken. Alla maligna tumörer samt enligt undantag (markerade med * i tabellen) benigna och in situ tumörer ingår. Dessutom redovisas antalet individer för vilka tumörerna i den officiella statistiken har diagnosticerats. Särredovisning sker också av individer som fått en diagnos för första gången. Till exempel var antalet inrapporterade maligna tumörer med tjocktarmscancer (ICD-7 = 153) för män, 2 084 och avsåg 2 029 män varav 1 974 män fick en tjocktarmscancer diagnosticerad för första gången. Några av de in situ tumörer som inte räknas in i den officiella statistiken finns redovisade i tabell 12.

Tabell A. Inrapporterade tumörer till cancerregistret avseende år 2012.**Innehåll i officiell statistik**

Män	Cancerregistret					Officiell statistik		
	Individer	Tumörer	Varav			Tumörer	Individer	
Icd7 Läge			Benigna	In situ	Maligna		1:a tumör	
140 Läpp	114	114	1	18	95	95	95	93
141 Tunga	151	153	1	2	150	150	148	147
142 Sportkörtel	69	69	1	0	68	68	68	68
143 Munbotten	39	39	1	3	35	35	35	34
144 Munnen, annan eller opsec. del	97	97	3	1	93	93	93	89
145 Mellansvalget	165	165	0	3	162	162	162	160
146 Näs-svalgrummet	24	24	0	1	23	23	23	23
147 Svalget, bakom struphuvudet	43	43	0	0	43	43	43	43
148 Svalget ospecificerat ställe	1	1	1	0	0	0	0	0
150 Matstrupe	333	334	3	22	309	309	308	308
151 Magsäck	476	480	25	19	436	436	433	433
152 Tunntarm	167	208	16	18	174	174	135	134
153 Tjocktarm	2 515	2 709	25	600	2 084	2 084	2 029	1 974
154 Ändarm/Anus	1 602	1 637	16	366	1 255	1 255	1 248	1 244
155 Lever/gallvägar	544	545	12	11	522	522	521	520
156 Levercancer, ospecificerat	47	47	5	0	42	42	42	42
157 Bukspottkörtel	541	542	20	2	520	520	519	519
158 Bukhinna	10	10	1	0	9	9	9	9
160 Mellanöra/näshåla/bihålor	70	70	29	5	36	36	36	35
161 Struphuvud/Stämband	167	169	4	27	138	138	138	135
162 Luftstrupe/Bronker/Lunga	1 919	1 930	15	4	1 911	1 911	1 900	1 884
163 Lungcancer ospecificerad	8	8	0	0	8	8	8	8
164 Bindvävsrum mellan lungorna	7	7	0	0	7	7	7	7
170 Bröst	41	43	0	2	41	41	41	41
177 Prostata	9 253	9 264	149	130	8 985	8 985	8 984	8 975
178 Testikel	351	357	8	3	346	346	342	333
179 Manligt könsorgan	145	147	1	55	91	91	91	90
180 Njure exkl.. 1801 njurbäcken	640	653	4	0	649	649	637	628
*1801 Njurbäcken	73	73	0	2	71	73	73	73
*181 Urinvägar utom njure	1 840	1 856	4	63	1 789	1 856	1 840	1 797
190 Malignt melanom i huden	2 793	3 026	21	1296	1 709	1709	1 644	1 523
191 Tumör i huden (ej malignt melanom), exkl.pad =715	5 883	7 056	226	3579	3 251	3 251	2 895	2 190
*191, pad =715	43		-	43	0	43	43	43
192 Öga excl. 1921 and pad = 461	79	79	1	5	73	73	73	73
*1921	3	3	1	0	2	3	3	3
*193 Hjärna/övriga nervsystemet	590	593	297	0	296	593	590	578
194 Sköldkörtel	152	156	2	0	154	154	150	149
*195 Endokrin körtel	312	315	275	0	40	315	312	308
196 Skelettet	34	34	6	0	28	28	28	28
197 Bindväv och annan mjuk vävnad, excl. pad=715	164	164	7	0	157	157	157	156
*197, pad=715	3	3	3	-	-	3	3	3
199 Övriga, ospecificerat ställe	569	569	13	2	554	554	554	552
200 Lymfatisk/blodbildande vävnad	964	972	47	0	925	925	917	915
201 Hodgkins sjukdom	114	114	0	0	114	114	114	114
202 Tumör i lymfatisk vävnad	119	119	9	0	110	110	110	109
203 Multipelt myelom, plasmocytom	364	364	6	0	358	358	358	358
204 Lymfatisk leukemi	330	331	0	0	331	331	330	330
205 Myeloisk leukemi	440	443	171	0	272	272	272	271
206 Monocyt leukemi	13	13	0	0	13	13	13	13
207 Annan leukemi och ospecificerad	94	94	50	0	44	44	44	44
208 Polycytomia vera	82	82	0	0	82	82	82	82
209 Myelofibros	82	82	0	0	82	82	82	82
140- 209 Samtliga	33 835	36 450	1 523	6 239	28 688	29 376	28 228	23 548

Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

* Samtliga tumörer ingår i den officiella statiken

Tabell B. Inrapporterade tumörer till cancerregistret avseende år 2012. Innehåll i officiell statistik

Kvinnor	Cancerregistret					Officiell statistik		
	Individer		Tumörer		Varav	Tumörer		Individer
Icd7 Läge			Benigna	In situ	Maligna	1:a tumör		
140 Läpp	94	95	4	23	68	68	67	63
141 Tunga	115	115	0	4	111	111	111	107
142 Sportkörtel	59	59	4	0	55	55	55	55
143 Munbotten	29	29	0	5	24	24	24	24
144 Munnen, annan eller ospecificerad del	105	107	3	5	99	99	99	92
145 Mellansvalget	57	58	0	1	57	57	56	56
146 Näs-svalgrummet	11	11	0	0	11	11	11	11
147 Svalget, bakom struphuvudet	15	16	0	1	15	15	15	15
148 Svalget ospecificerat ställe	2	2	0	1	1	1	1	1
150 Matstrupe	122	122	1	8	113	113	113	113
151 Magsäck	340	341	25	9	307	307	306	305
152 Tunntarm	125	129	8	10	111	111	107	107
153 Tjocktarm	2 499	2 652	35	496	2 121	2 121	2 058	2 002
154 Ändtarm/Anus	1 224	1 240	17	311	912	912	908	898
155 Lever/gallvägar	440	443	17	13	413	413	411	410
156 Levercancer, ospecificerat	42	42	4	0	38	38	38	38
157 Bukspottkörtel	558	560	20	8	532	532	530	530
158 Bukhinna	65	65	1	0	64	64	64	64
160 Mellanöra/ näshåla/bihålor	50	50	13	2	35	35	35	35
161 Struphuvud/Stämband	43	43	0	6	37	37	37	37
162 Luftstrupe/Bronker/Lunga	1 815	1 824	10	2	1 812	1 812	1 804	1 775
163 Luncancer ospecificerad	6	6	1	0	5	5	5	5
164 Bindvävsrum mellan lungorna	3	3	0	0	3	3	3	3
170 Bröst	8 359	9 954	21	1 443	8 490	8 490	7 519	7 006
171 Livmoderhals	5 240	5 308	290	4 534	484	484	483	482
172 Livmoderkropp	1 395	1 397	11	24	1 362	1 362	1 360	1 359
173 Placenta	126	126	122	0	4	4	4	4
174 Livmoder ospecificerat ställe excl. pad=875,	98	98	4	1	93	93	93	93
*174 pad = 875	2	2	2	0	0	2	2	2
175 Äggstockar m.m. exklusive **	985	1 000	8	299	693	693	689	688
*175 med pad = **	1	1	1	0	0	1	1	1
176 Kvinnligt könsorgan	474	479	6	264	209	209	208	202
180 Njure exkl. 1801 njurbäcken	388	401	4	0	397	397	384	378
*1801 Njurbäcken	57	57	0	0	57	57	57	56
*181 Urinvägar utom njure	626	629	1	17	611	629	626	616
190 Malignt melanom i huden	2 864	2 998	15	1 324	1 659	1 659	1 634	1 540
191 Tumör i huden (ej malignt melanom), exkl. pad = 715	5 898	6 875	182	4 286	2 407	2 407	2 197	1 796
*191 med pad = 715	17	17	17	0	0	17	17	17
192 Öga excl. 1921	65	65	1	2	62	62	62	62
*1921	2	2	0	0	2	2	2	2
*193 Hjärna/övriga nervsystemet	681	693	484	0	209	693	681	671
194 Sköldkörtel	357	364	8	0	356	356	349	349
*195 Endokrin körtel	629	629	587	0	42	629	629	621
196 Skelettet excl. pad=865	50	59	7	1	51	51	42	42
197 Bindväv och annan mjuk vävnad ,excl. pad=715	152	152	6	0	146	146	146	143
*197 med pad=715	4	4	4	0	0	4	4	4
199 Övriga, ospecificerat ställe	724	725	20	1	704	704	703	702
200 Lymfatisk/blodbildande vävna	761	761	38	0	723	723	723	722
201 Hodgkins sjukdom	105	105	0	0	105	105	105	105
202 Tumör i lymfatisk vävnad	53	53	3	0	50	50	50	49
203 Multipelt myelom, plasmocytom	275	275	3	0	272	272	272	271
204 Lymfatisk leukemi	226	226	0	0	226	226	226	226
205 Myeloisk leukemi	324	325	110	0	215	215	215	214
206 Monocytleukemi	12	12	0	0	12	12	12	12
207 Annan Leukemi, ospec.	129	129	74	0	55	55	55	55
208 Polycytemia vera	78	78	0	0	78	78	78	78
209 Myelofibros	63	63	0	0	63	63	63	63
140-209 Samtliga	38 432	42 074	2 192	13 101	26 781	27 894	26 219	21 865

Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

* Samtliga tumörer ingår i den officiella statiken ** pad =051,053,055,063

Statistiska mått

Incidens

Cancerincidensen kan redovisas på olika sätt beroende på vilket syfte redovisningen har. I detta avsnitt visas tre incidensmått som används i denna rapport. Redovisningen avser incidensen för samtliga cancersjukdomar bland kvinnor och män.


Cancerregistret är ett tumörregister och den officiella statistiken över cancerincidenser baseras på rapportering av antalet tumörer till cancerregistret. I den här rapporten används begreppen tumör och fall synonymt.

Från slutet av 1990-talet har antalet individer i cancerregistret med fler än en rapporterad tumör ökat för några cancersjukdomar. Det finns därför en tilltagande skillnad mellan antalet tumörer och antalet individer som är viktigt att ta hänsyn till. I denna rapport redovisas därför ibland *antalet individer* tillsammans med antalet tumörer. I tabell 11 redovisas antalet individer som procent av antalet tumörer för samtliga lägen. Skillnaden mellan antal individer och antal tumörer kommer då inte bli lika betydande.

I detta avsnitt redovisas de tumörer som ingår i den officiella statistiken och som redovisas i tabell A och B.


Antal fall

I figur 1 visas *antalet tumörer(fall)* som rapporterats till cancerregistret och för dessa *antal individer* för vilka tumörerna har rapporterats. Antalet fall (och antal individer) har ökat från år 1970 till 2012. En del av ökningen beror på en större och allt äldre befolkning. Från slutet av 1990-talet har antalet fall för män ökat mer än för kvinnor. En stor del av ökningen för män avser prostatacancer. Nedgången i antalet fall från 2011 till 2012 kan delvis bero på en naturlig eftersläpning i rapporteringen till cancerregistret. (se appendix 3) och antalet fall kan öka något till nästa års rapportering. Därför ska denna nedgång för det senast rapporterade året tolkas med stor försiktighet.

Figur 1. Antal fall och individer


Antal fall per 100 000 individer

För att kunna göra jämförelser över tid och mellan olika demografiska grupper (ex. län, kön) oberoende av befolkningstillväxt eller storlek på län delas antalet fall med medelbefolkningen. Kvoten blir väldigt liten och multipliceras därför med 100 000. I figur 2 visas antalet fall och antalet individer per 100 000 för män och kvinnor. Incidenserna ökar under perioden och för män är incidensen tilltagande från slutet av 1990-talet.

Figur 2. Antal fall och antal individer per 100 000

Åldersspecifik cancerincidens

Den åldersspecifika cancerincidensen beräknas som antal fall per 5-årsgrupp delat med medelbefolkningen i åldersgruppen. Beräkningen är densamma som för *antalet fall per 100 000* och redovisas separat för män och kvinnor. För att få en mer utjämnad åldersspecifik incidens och lättare kunna se mindre förändringar visas i figur 3 den åldersspecifika cancerincidensen som *3-års medelvärde*. Incidensen för både kvinnor och män är förskjuten till äldre åldersgrupper. I åldersgrupper innan 60 år har kvinnor en något högre incidens än män. Från och med 60 år har män en betydligt högre incidens än kvinnor. Mellan perioderna 1990-1992 till 2010-2012 har incidensen för både män och kvinnor ökat. Mest har den ökat för kvinnor i åldrarna 65-74 år. För män har incidensen främst ökat i åldern 50-69 år men stora ökningar har även skett bland män i åldern 30-34 år och 25-39 år även om det är från lägre nivåer. Den totala incidensen för män är högre (617 fall per 100 000) än för kvinnor (545 fall per 100 000) för perioden 2010-2012.




Antalet fall per 100 000, åldersstandardiserad incidens

Den åldersspecifika incidensen i figur 3 visar att risken för cancer ökar med stigande ålder. Jämförelser över tid och mellan olika demografiska grupper är känsliga för befolkningens ålderssammansättning. Ett län med en äldre befolkning har ofta en högre cancerincidens än ett län med en yngre befolkning. För att kunna jämföra incidenser mellan olika grupper kan den *åldersstandardiserade incidensen* användas. Den beräknas för olika år eller olika demografiska grupper som om de hade samma ålderssammansättning med hjälp av en standardpopulation. Den svenska befolkningen år 2000 används som standardpopulation för beräkningar i denna rapport. I några tabeller används också världsstandardpopulationen. (se appendix 2).

Figur 4 visar den åldersstandardiserade incidensen för kvinnor och män från 1970 till 2012. Efter som medelåldern hos den svenska befolkningen ökar blir ökningen av den åldersstandardiserade incidensen något lägre.


Metoden att beräkna åldersstandardiserad incidens finns beskriven i Cancer Incidence in Five Continents [3].



Jämförelse av ökningen i olika cancerincidensmått

I figur 5 visas de tre presenterade incidensmått som index för att tydligare kunna se skillnader i utveckling över tid. Index för *antal fall* visar att det från startåret 1970 (=100) skett en fördubbling fram till år 2012 (män = 208 kvinnor=194). Index för *antal fall per 100 000* visar ökningen oberoende av att befolkningstillväxten och är totalt cirka 75 procent (män = 186, kvinnor=166). Index för antalet individer per 100 000, åldersstandardiserat är 130 för män och 129 för kvinnor. Det har alltså skett en fördubbling av *antalet fall* men med hänsyn tagen till att folkmängden ökar och blir allt äldre så är ökningen i cirka 30 procent. Denna ökning beror på andra faktorer som till exempel diagnostiska metoder, förändring av kodningspraxis, obduktionsfre-

kvens och screeningaktiviteter. Naturligtvis påverkas incidensen också av exponering för olika riskfaktorer till exempel befolkningens rökvanor och exponering för UV-strålning. Det är svårt att avgöra för varje enskild cancer-sjukdom vad som är orsaken till förändringar i incidensen. Jämförelser av trender bör därför göras med viss försiktighet.




Årlig procentuell ökning av cancerincidensen

Den årliga procentuella förändringen i incidensen används för att beskriva cancerincidensens trend. Syftet är att skatta den *långsiktiga* procentuella ökningen oberoende av befolkningsökning, ålderssammansättning eller tillfälliga variationer i incidensen.

Skattning sker därför genom att anpassa en enkel regressionsmodell till den logaritmerade *ålderstandardiserade incidensen*. I figur 6 visas den ålderstandardiserade cancerincidensen tillsammans med de skattade 10 och 20 årstrenderna för kvinnor och män. Den skattade 10-årstrenden visas som en streckad svart linje uppåtgående lutning motsvarande 0,8 procent's årlig ökning. För män är den årliga procentuella ökningen på 20 års sikt 0,9 procent. De senaste 3 åren har incidensen för män gått ner något. Trenden för de senaste 10 åren svagt nedåtgående dock ej signifikant. Skattningar av trender för specifika cancerdiagnoser och grupper av diagnoser finns i tabell E.

Figur 6. Fall per 100 000 ålderstandardiserat samt trendlinjer

Antal fall per 100 000, ålderstandardiserat och årlig procentuell förändring
Fall per 100 000 samt trendlinjer



Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Risken att få en cancerdiagnos

Den kumulativa risken att få en cancerdiagnos innan en viss ålder, skattas utifrån den åldersspecifika incidensen. Metoden finns beskriven i Cancer Incidence in Five Continents [3]. Tabell D visar skattningarna för olika grupper.

Mortalitet


För några av cancersjukdomarna redovisas mortalitet (dödlighet) i cancer. Mortalitet hämtas från dödsorsaksregistret och beräknas som antal avlidna per 100 000. Den är kopplad till incidensen men är oftast förskjuten. För mer information se statistiken över dödsorsaker.

Cancerincidens per läge

De tio största cancersjukdomarna redovisas i figur 7 som procent av all cancer för män respektive kvinnor. Tillsammans utgör de drygt 75 procent av alla cancersjukdomar. Bröstcancer och prostatacancer är i särklass de största cancersjukdomarna och står för 30,4 procent av all cancer bland kvinnor respektive 30,6 procent bland män. I följande avsnitt redovisas bröstcancer, prostatacancer, hudcancer, malignt melanom, lungcancer och tjocktarmscancer var och en för sig. Därefter redovisas en del av de övriga cancersjukdomarna som grupper i figur 27- 39. I figur 40 redovisas cancersjukdomar per län och i figur 41 cancersjukdomar efter utbildningsnivå. Övriga redovisningar finns i tabell 1–12.

Figur 7. De 10 största cancersjukdomarna

De 10 största cancersjukdomarnas andel av samtliga cancersjukdomar för män och kvinnor respektive



Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Bröstcancer


För år 2012 rapporterades 8 490 fall med bröstcancer samt 1 443 bröstcancertumörer in situ (in situ ingår ej i den officiella statistiken). Incidensen har ökat från cirka 80 till 180 fall per 100 000 (figur 8) under perioden 1970 till 2012. Incidensen för antalet individer har från år 2003 planat ut något för att från 2009 återigen öka. Skillnaden beror på att fler bröstcancertumörer per kvinna har registrerats. Mortaliteten har mer eller mindre legat på en konstant nivå under perioden med en svag nedåtgående trend från mitten av 2000-talet.

Figur 8. Bröstcancer, incidens och mortalitet

Fall och individer per 100 000 och döda per 100 000

Fall per 100 000

Incidens och mortalitet, 1970-2012, kvinnor



Källa: Cancerregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen


Figur 9 visar antalet fall med bröstcancer per 100 000 över tid för olika åldersgrupper. Incidensen i åldersgruppen 50-64 år minskar något från 2004 medan den stiger i åldersintervallet 65-79 år.

Figur 9. Bröstcancer, Incidens efter ålder

Fall per 100 000 efter åldersgrupper


Fall per 100 000

Fall per 100 000




Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Figur 10 visar den åldersspecifika incidensen som 3-årsmedelvärde för perioderna 1990-1992 och 2010-2012. Incidenserna har ökat i samtliga åldersgrupper. Ökningen är störst i åldrarna 60-74 år. Den kumulativa risken att få en bröstcancerdiagnos innan 75 års ålder är cirka 10 procent (se tabell D).



I Figur 11 visas fall per 100 000 tillsammans med skattningar av 10 och 20-årstrender. På både 10 och 20 års sikt har incidensen ökat med i genomsnitt 1,4 procent.




Prostatacancer

Prostatacancer är den största cancersjukdomen bland män. År 2012 registrerades 9 663 maligna diagnoser i cancerregistret vilket motsvarar 205,5 män per 100 000. Incidensen för prostatacancer har ökat kraftigt (figur 12) från slutet av 1990-talet. Mortaliteten har från 1970 gått upp långsamt för att från 2003 långsamt gå nedåt.

Figur 12. Prostatacancer, incidens och mortalitet

Fall per 100 000 och döda per 100 000




Källa: Cancerregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Den åldersspecifika incidensen (figur13) har ökat för yngre åldersgrupper medan den för äldre åldersgrupperna har minskat.

Figur 13. Prostatacancer, åldersspecifik incidens, 1990-1992 och 2010-2012

Fall per 100 000, 3-årsmedelvärde




Källa: Socialstyrelsen, cancerregistret

I figur 14 visas den ålderstandardiserade incidensen tillsammans med de skattade procentuella ökningarna baserat på 10 och 20 års incidens. Prostatacancer har under 20 år en genomsnittlig ökning på 1,7 procent och under de senaste 10 åren en minskning med 2,0 procent per år, dock ej signifikant. Den stora variationen under 2000-talet gör att utvecklingen är svårbedömd.

Figur 14. Prostatacancer, ålderstandardiserad incidens och trend

Fall per 100 000, ålderstandardiserad incidens och trendlinjer för skattad årlig procentuell förändring under 10 och 20 år




Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Hudcancer

Hudcancer är den näst största cancersjukdomen både för kvinnor och män och också den som ökar mest. Figur 15 visar att antalet tumörer och individer per 100 000 har ökat stadigt från 1970 och från början av 2000-talet börjat öka kraftigt. Antalet tumörer som rapporteras till cancerregistret per individ har också ökat från början av 2000-talet vilket har lett till att incidensen för antalet tumörer är högre än för individer. Mortaliteten för hudcancer är låg och ligger för män och kvinnor kring 0,8 respektive 0,5 dödsfall per 100 000.


Figur 15. Hudcancer, incidens och mortalitet

Fall och individer per 100 000 och döda per 100 000




Källa: Cancerregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Den åldersspecifika incidensen (Figur 16) visar att det skett en stor ökning av incidensen från åren 1990-1992 till åren 2010-2012. För gruppen män över 85 år har incidensen ökat från 408 till 953 män per 100 000 vilket är en ökning med drygt 130 procent. I denna grupp har incidensen för kvinnor ökat från 183 till 469 kvinnor per 100 000 vilket är en ökning på 256 procent.



I Figur 17 visas åldersstandardiserade incidenserna för fall och individer per 100 000 tillsammans med skattad, årlig procentuell ökning. Antalet fall per 100 000 bland kvinnor har ökat i genomsnitt med 5,3 procent under de senaste 20 åren. De 10 senaste åren är den procentuella ökningen 6,6 procent. Bland män är motsvarande ökning 4,0 och 4,7 procent.




Maligt melanom

Maligt melanom är den sjätte största cancersjukdomen för män och den femte största för kvinnor. Under år 2012 registrerades 1 634 kvinnor med totalt 1 659 maligna melanom i cancerregistret. 1 644 män registrerades med 1 709 tumörer med maligt melanom. Dessutom registrerades totalt 2 620 (1 296 för män, 1 324 för kvinnor) tumörer med förstadier till maligt melanom (ej med i figur 18). Från början av 2000-talet har ökningen i antalet fall per 100 000 tilltagit (figur 18) för både kvinnor och män. Incidensutvecklingen över tid är påfallande jämn mellan män och kvinnor. Däremot visar figur 19 att män har en högre incidens i äldre åldersgrupper medan kvinnor under

50 år har en högre incidens än män. För kvinnor är den totala incidensen för samtliga åldrar lägre. Kvinnor har en högre åldersspecifik incidens än män i åldersklasserna upp till 54 år. Män har en högre åldersspecifik incidens i åldersklasserna från 60 år och uppåt. Män har också en högre incidens för samtliga åldersklasser. Mortaliteten har från 1970 ökat.

Figur 18. Malignt melanom, incidens och mortalitet


Fall per 100 000 och döda per 100 000



Källa: Cancerregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Figur 19. Malignt melanom, åldersspecifik incidens, 1990-1992 och 2010-2012

Fall per 100 000, 3-års medelvärde




Källa: Socialstyrelsen, cancerregistret

Från början av 2000-talet ökar incidensen (figur 20) för både kvinnor och män. Trenden för de 10 senaste åren baserad på den åldersstandardiserade incidensen är 5.3 procent per år för kvinnor och 5.2 procent per år för män.

Figur 20. Malignt melanom, incidens och trend

Fall per 100 000, ålderstandardiserad incidens och trendlinjer för skattad årlig procentuell förändring under 10 år




Lungcancer

Lungcancer har minskat (figur 21) något bland män från 1980-talet. Från att ligga på en nivå kring 45 fall per 100 000 år 1980 till runt 40 år 2012. Dödligheten är tyvärr hög och mortaliteten ligger på i stort sett samma nivå som incidensen. Incidensen bland kvinnor har under samma period haft en kraftig ökning från en nivå på cirka 10 fall per 100 000 till samma nivå som bland män år 2012. Precis som för män så ligger mortaliteten för kvinnor på samma nivå som incidensen. Den åldersspecifika incidensen (figur 22) visar att lungcancer för män har minskat på 20 år i åldersgrupperna upp till 74 år men ökat i åldersgrupperna 75 till 84 år. För kvinnor har det skett en ökning i åldersgrupperna från 60 år men en minskning i de lägre åldersgrupperna.


Figur 21. Lungcancer, incidens och mortalitet

Fall per 100 000 och döda per 100 000



Figur 22. Lungcancer, åldersspecifik incidens, 1990-1992 och 2010-2012

Fall per 100 000, 3-års medelvärde



Källa: Socialstyrelsen, cancerregistret


Den skattade, procentuella ändringstakten för lungcancer (figur 23) visar att incidensen har minskat bland män de senaste 10 åren med i genomsnitt 1,2 procent, dock ej signifikant. Sen 2009 minskar incidensen något för kvinnor dock visar 10 års-trenden fortfarande en ökning med i genomsnitt 1,7 (ej signifikant procent) per år.

Figur 23. Lungcancer, incidens och trend

Fall per 100 000, ålderstandardiserad incidens och trendlinjer för skattad årlig procentuell förändring under 10 och 20 år

Fall per 100 000

Incidens och Trend, 1970-2012




Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Tjocktarmscancer

Från 1970 till 2012 har tjocktarmscancer (figur 24) ökat från nivåer på 25-30 individer till 40-45 individer per 100 000 för både kvinnor och män. Mortaliteten har legat runt 20 individer per 100 000.

Figur 24. Tjocktarmscancer, incidens och mortalitet

Fall per 100 000 och döda per 100 000




Källa: Cancerregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Den åldersspecifika incidensen i figur 25 visar att kvinnor och män har ungefär samma incidens upp till 60 års ålder. Därefter har män en högre incidens än kvinnor.

Figur 25. Tjocktarmscancer, åldersspecifik incidens, 1990-1992 och 2010-2012

Antal per 100 000, 3-års medelvärde



Källa: Socialstyrelsen, cancerregistret


Den ålderstandardiserade incidensen ökar (figur 26) från och med slutet på 1990 talet. För män är den årliga procentuella ökningen i genomsnitt 0,7 procent per under som senaste 20 åren år och för kvinnor 1 procent.

Figur 26. Tjockarmscancer, antal tumörer och individer

Fall per 100 000, ålderstandardiserad incidens och trendlinjer för skattad årlig procentuell förändring under 20 år

Fall per 100 000

Incidens och trend, 1970-2012



Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Övriga cancersjukdomar


I figur 27-39 visas incidenser för olika cancersjukdomar och grupper av cancersjukdomar. Incidenserna visas som *fall per 100 000* (ojusterad incidens) och *fall per 100 000 ålderstandardiserad* (åldersjusterad incidens) under åren 1960-2012. Dessutom visas åldersspecifik incidens som 3-årsmedelvärde för åren 2010-2012 för män och kvinnor.

Figur 27. Huvud och hals (icd7: 140-148)

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens


Fall per 100 000

Incidens 1960-2012



Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen


**Åldersspecifik incidens,
3-årsmedelvärde 2010-2012**



Figur 28. Matsmältningskanalen, övre (icd7: 150-152)

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens

Fall per 100 000 **Incidens 1960-2012** **Åldersspecifik incidens, 3-årsmedelvärde 2010-2012**




Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Figur 29. Ändtarm och anus (icd7: 154)

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens

Fall per 100 000 **Incidens 1960-2012** **Åldersspecifik incidens, 3-årsmedelvärde 2010-2012**




Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Figur 30. Lever, gallvägar och bukspottkörtel (icd7: 155-157)

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens


Fall per 100 000 **Incidens 1960-2012** **Åldersspecifik incidens, 3-årsmedelvärde 2010-2012**




Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Figur 31. Luftvägarna, övre (icd7: 160-161)


Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens

**Figur 32. Luftvägarna, nedre (icd7: 162-163)**

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens


**Figur 33. Kvinnliga könsorgan (icd7: 171-176)**

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens




Figur 34. Manliga könsorgan (icd7: 178-179)


Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens

**Figur 35. Njurar och urinvägar (icd7: 180-181)**

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens


**Figur 36. Sköldkörtel och endokrina körtlar (icd7: 194-195)**

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens




Figur 37. Ben och bindväv (icd7: 196-197)


Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens

**Figur 38. Malignt lymfom (icd7: 202-204 inkl. 204.1)**

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens


**Figur 39. Leukemi (icd7: 204-207 exkl. 204.1)**

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens



Cancerincidens efter län

Figur 40 visar den ålderstandardiserade incidensen för olika cancersjukdomar efter län. Det finns geografiska skillnader i cancerincidens mellan länen. Till exempel så är incidensen för hudcancer och malignt melanom lägre i norra länen. Incidensen för bröstcancer är högre i södra länen.



Cancerincidens efter utbildning


Cancerregistret har matchats med utbildningsregistret. I Figur 41 visas cancerincidensen för några av de stora cancersjukdomarna för under perioden 2008 – 2012 för individer i åldern 35-74 år. Incidensen är fördelad på högsta uppnådda utbildningsnivå (grundskola, gymnasial och eftergymnasial utbildning). Skillnaden för samtliga cancersjukdomar är inte så stor mellan olika utbildningsnivåer. För lungcancer finns däremot en tydlig skillnad där kvinnor i gruppen med grundskola har en incidens på 69 fall per 100 000 och kvinnor i gruppen med eftergymnasial utbildning en incidens på 31 fall per 100 000. För män är motsvarande incidens 65 och 31 fall per 100 000. Samma mönster fast med mindre skillnader finns mellan tjocktarmscancer och ändtarmscancer. För bröstcancer, prostatacancer, malignt melanom och hudcancer är förhållandena omvända där gruppen med eftergymnasial utbildning har högre incidenser än gruppen med grundskoleutbildning. Incidenserna till Figur 41 finns redovisade i tabell C.

Figur 41. Cancerincidens efter utbildningsnivå

Antal fall per 100 000 åldersstandardiserad incidens. Fördelning efter utbildningsnivå

Utbildningsnivå

Antal tumörer per 100 000, åldersstandardiserat



Källa: Socialstyrelsen, cancerregistret

Tabell C. Fall per 100 000 efter grupper med olika utbildningsnivå.

Läge	Män					Kvinnor				
	Grundskola	Gymnasium	Eftergymnasial	Övriga	Samtliga	Grundskola	Gymnasium	Eftergymnasial	Övriga	Samtliga
Tjocktarmscancer	50,6	47,4	47,4	45,3	48,1	42,9	42,2	39,7	38	41,8
Ändtarm	36,3	32,1	29,4	24,7	32,7	23,5	23,3	21,2	17,5	22,7
Lungcancer	64,7	51,5	30,7	72,8	50,5	68,9	54,9	31,3	43	50,8
Bröstcancer	1,1	0,8	1,1	1,4	1	232	251,6	286,1	210,5	257,3
Kvinnor	0	0	0	0	0	87,6	81,1	78,2	51,6	80,8
Prostatacancer	254,8	280,3	311,3	140,1	278,5	0	0	0	0	0
Malignt melanom	32,9	44,6	56,6	19,5	44,4	32,1	43,1	49,2	21,6	43,1
Hudcancer	34,4	43,3	49,5	43,1	41,9	24,6	28,7	35,6	20,1	29,6
Övrig cancer	284,5	272,7	248,4	269,4	268,9	203,8	189,3	171,6	182,4	186,7
Samtliga	759,3	772,8	774,5	616,2	766,1	715,4	714,2	712,9	584,7	712,7

Risken att utveckla cancer

Den kumulativa incidensen, baserat på de åldersspecifika incidenserna i tabell D, används för att uppskatta sannolikheten för att utveckla cancer. Metoden beskrivs i Cancer Incidence in Five Continents. [3]. Metoden tar inte hänsyn till konkurrerande risker, såsom risk för död. Eftersom risken för död ökar med åldern, kan beräkningarna vara mindre tillförlitliga i högre åldrar. Redovisning sker därför endast för åldergrupperna upp till 75 års ålder. Risken att utveckla cancer varierar kraftigt med åldern och typ av cancer. Totalt sett är risken för att utveckla cancer innan de fyllt 75 år 30,3 procent bland män och 27,7 procent bland kvinnor.

Tabell D. Den kumulativa risken att utveckla cancer innan en viss uppnådd ålder

Icd7	Läge	Kön	< 25 år	< 35 år	< 45 år	< 55 år	< 65 år	< 75 år
140-209	Samtliga lägen	M	0.5	1.1	2.1	5.0	13.7	30.3
140-209	Samtliga lägen	F	0.5	1.3	3.4	8.0	15.8	27.7
151	Magsäck	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
153	Tjocktarm	M	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	2.3
		F	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.9
154	Ändtarm och anus	M	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.5
		F	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0
155	Lever och gallvägar	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5
157	Bukspottkörtel	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.4
		F	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.2
170	Bröst	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		F	0.0	0.2	1.0	3.0	6.0	10.1
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.7
175	Äggstock, äggledare och breda livmoder	F	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.0
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	0.0	0.0	0.0	0.7	4.3	11.8
180	Njure och njurbäcken	M	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.0
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5
181	Urinvägar utom njure	M	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	2.1
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6
190	Malignt melanom i huden	M	0.0	0.1	0.3	0.6	1.2	2.2
		F	0.0	0.2	0.5	0.9	1.5	2.1
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	2.0
		F	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.5
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.9
		F	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	1.0
195	Endokrin körtel	M	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5
		F	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.0
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	1.1
		F	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8
204	Lymfatisk leukemi	M	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.9
		F	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6
999	Övriga lägen	M	0.2	0.5	0.8	1.3	2.3	4.0
		F	0.1	0.5	0.9	1.4	2.2	3.5

Trender

Faktorer som påverkar incidensen är kodningspraxis, befolkningens åldersstruktur, obduktionsfrekvensen, förbättring av diagnostiska metoder och införande av screeningprogram. Exponering för olika riskfaktorer som rökning och UV-strålning spelar givetvis också in. Det kan därför vara svårt att dra slutsatser om orsakerna till förändring i incidenstrenderna. I tabell E redovisas skattningar av procentuella förändringar på 10 och 20 års sikt för några av de stora cancersjukdomarna och för några grupper med cancersjukdomar. Antalet fall har under de två senaste decennierna ökat och den årliga ökningen för män är 2,1 procent och för kvinnor 1,6 procent. Ungefär hälften av ökningen beror på att befolkningen blivit större och allt äldre (se figur 4 och 5). De senaste åren har antalet fall för män minskat vilket beror på att antalet prostatafall har blivit färre. Skattningarna av den årliga procentuella förändringen görs med en exponentiell modell på åldersstandardiserade incidenser. Den årliga procentuella ökningen för den åldersstandardiserade incidensen på 20 års sikt är 0,9 procent för både män och kvinnor. På 10 års sikt ökar cancerincidensen för kvinnor med 1,2 procent medan den för män minskar med 0,1 procent. Minskningen är dock inte signifikant.

Kommentarer till trendskattningar av den åldersstandardiserade incidensen för några utvalda lägen:

- Huvud och hals (ICD-7 140–148). Incidensen för cancer i huvud och hals har öka bland kvinnor (1,7 procent på 20 år och 2,7 procent på 10 år). Trenden bland män har ökat på 10 år med 1,2 procent (dock en signifikant på 99 procents konfidensnivå).
- Övre matsmältningskanalen (ICD-7 150–152) Det har skett en kraftig nedgång av incidensen både för män och för kvinnor. På 20 år har den årliga minskningen legat på 2 procent för män och 1,7 för kvinnor. På 10 år sikt är minskningen 2,7 procent för män. Den årliga minskningen har för kvinnor dock avtagit och på 10 år sikt är den 1,1 procent dock ej signifikant. Den minskande incidensen beror uteslutande på färre fall av cancer i magsäcken.
- Cancer i tjocktarmen (ICD-7 153–154) är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos både kvinnor och män. Trenden är långsamt uppåtgående med en årlig procentuell ökning på 0,7 procent för män och 1 procent för kvinnor. På 10 års sikt är den årliga ökningen 0,5 procent för män och 0,9 procent för kvinnor. Skattningarna på 10 år sikt är dock ej signifikanta.
- Hepatobiliära cancersjukdomar och cancer i bukspottskörteln (ICD-7 155–157) har de senaste två decennierna gått ner och den årliga minskningen för män är 1,3 procent och för kvinnor 1,8 procent. Senare har incidensen gått upp något och på 10 år sikt är den årliga ökningen för män 0,9 procent och för kvinnor 0,3 procent. Ökningarna på 10 års sikt är dock ej signifikanta.
- Nedre andningsvägarna (ICD-7 162–163). Till största del består denna grupp av lungcancer. Bland kvinnor ökar cancer i denna grupp med 2,9 procent per år på 20 år sikt och 1,7 procent per år på 10 års sikt, dock ej signifikant. Bland män minskar trenden med 0,5 procent på 20 år och 1,2 procent på 10 år. Incidensen är fortfarande högre bland män än bland kvinnor.

- Bröstcancer (ICD-7 170) bland kvinnor ökar med 1,4 procent per sett både på 20 och 10 års sikt. Observera att skattningarna av de procentuella förändringarna avser incidensen för tumörer och att det blivit vanligare att fler bröstcancertumörer rapporteras per kvinna (se figur 8). Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor men ovanlig bland män.
- Det är en minskning av cancer i de kvinnliga könsorganen (ICD-7 171–176). Med 0,7 procent per år sett på 20 års sikt och med 1,2 procent på 10 år.
- Prostatacancer (ICD-7 177) är den vanligaste cancersjukdomen bland män och den årliga procentuella ökningen på 20 år sikt är 1,7 procent. På 10 års sikt minskar prostatacancer med 2 procent (ej signifikant). Användandet av PSA -test antas påverka incidensutvecklingen.
- Cancer i de manliga könsorganen (ICD-7 178–179) ökar med 2,3 procent medan trenden på 10 års sikt är något lägre med en ökning på 1,8 procent (ej signifikant).
- Malignt melanom i huden (ICD-7 190) är en av de cancersjukdomar som ökar snabbast. Den årliga procentuella ökningen bland på 20 års sikt är 3,7 procent bland både män och kvinnor. Ökningstakten har däremot tilltagit och på 10 års sikt ökar malignt melanom bland män med 5,9 procent och bland kvinnor 5,7 procent.
- Övrig hudcancer (ICD-7 191) består i huvudsak av skivepitelcancer (basalcellscancer är exkluderad) och är den näst största cancersjukdomen både bland män och bland kvinnor. Hudcancer är också en av de cancersjukdomar som ökar mest. Precis som malignt melanom har ökningstakten tilltagit och på 10 års sikt är den årliga procentuella ökningen för kvinnor 4,7 procent och för män 6,9 procent.
- Malignt lymfom (ICD-7 200–202, 204.1) och leukemi (ICD-7 204–207, exklusive 204.1). Trenden för malignt lymfom ligger nästan på en konstant nivå utan procentuell ökning. För män är den årliga procentuella ökningen av malignt lymfom 0,4 procent men bland kvinnor finns ingen signifikant ökning. Inte heller på 10 års sikt finns någon signifikant årlig procentuell ökning. På 20 års sikt ökar leukemier svagt med en årlig procentuell ökning på 0,7 procent för män och 1,0 procent för kvinnor. Trenden på 10 års sikt visar inte på någon signifikant ökning.

Tabell E. Skattning av årlig, genomsnittlig procentuell förändring av incidensen

Skattning baserad på den åldersstandardiserade incidensen

Icd7	Läge	Kön	Skattad förändring		Fall per 100 000, åld.stand.		
			20 år	10 år	1993	2003	2012
140-209	Samtliga lägen (ålders-standardiserad)	M	0.9 *	-0.1	578.4	644.9	629.3
		F	0.9 *	1.2 *	445.5	476.9	523.4
140-148	Huvud och hals	M	0.0	1.2	13.1	12.5	13.8
		F	1.7 *	2.7 *	5.7	6.2	8.2
150-152	Matsmältningskanalen, övre	M	-2.0 *	-2.6 *	31.3	26.2	19.8
		F	-1.7 *	-1.1	15.8	11.3	9.9
153	Tjocktarmscancer	M	0.7 *	0.5	41.9	45.5	45.8
		F	1.0 *	0.9	34.8	36.3	39.1
154	Ändtarm och anus	M	-0.0	-0.6	28.2	28.3	27.1
		F	0.1	-0.5	17.7	18.3	17.1
155-157	Lever, gallvägar och bukspottskörtel	M	-1.3 *	0.9	29.2	21.2	22.8
		F	-1.8 *	0.3	26.0	18.1	18.3
160-161	Luftvägarna, övre	M	-1.4 *	-3.3 *	4.9	5.1	3.7
		F	0.6	0.7	1.3	1.1	1.4
162-163	Luftvägarna, nedre	M	-0.5 *	-1.2	49.2	45.5	40.4
		F	2.9 *	1.7	21.9	29.8	33.7
170	Bröst	M	-0.1	-2.9	1.0	1.3	0.9
		F	1.4 *	1.4 *	116.0	143.6	160.9
171-176	Kvinnliga könsorgan	F	-0.7 *	-1.2 *	64.7	62.1	54.1
177	Prostata	M	1.7 *	-2.0	159.6	223.9	183.9
178-179	Manliga könsorgan, exkl. Prostata	M	2.3 *	1.8	6.1	7.7	9.2
180-181	Njurar och urinvägar	M	0.1	0.3	59.9	56.2	56.3
		F	-0.0	0.7	22.6	19.7	20.2
190	Malignt melanom i huden	M	3.7 *	5.9 *	18.3	23.2	36.4
		F	3.7 *	5.7 *	16.0	20.0	32.2
191	Hud, exkl malignt melanom	M	4.0 *	4.7 *	38.0	53.7	79.2
		F	5.3 *	6.9 *	16.4	23.2	41.9
194-195	Sköldkörtel och endokringa körtlar	M	0.1	2.9	8.1	7.0	9.7
		F	0.2	2.9 *	16.5	14.6	19.6
196-197	Ben och bindväv	M	-0.4	-1.2	5.3	4.9	4.0
		F	-0.3	-1.9	4.1	4.0	3.8
200-202, 204.1	Malignt lymfom	M	0.4 *	-0.1	29.2	30.0	30.1
		F	0.4	0.4	19.1	18.4	19.7
204-207, excl 204.1	Leukemi	M	0.7 *	0.4	7.7	9.0	8.6
		F	1.0 *	0.4	5.2	6.6	6.6
140-209	Samtliga lägen (antal fall)	M	2.1 *	1.5 *	21 436	26 063	29 376
		F	1.6 *	2.1 *	20 742	23 468	27 894

Tabeller

Tabellbilagan innehåller 12 tabeller som visar innehållet i cancerregistret. Samtliga tabeller har en fördelning på *kön* och *läge* enligt 3-ställig ICD-7 kod (tabell 1 och 4 har 4-ställig ICD-7 kod)

Antal fall

Tabell 1 Fördelning på 5-års åldersgrupper. (4-ställig ICD-7 kod) År 2012.

Tabell 2 Fördelning på län. År 2012.

Tabell 3A Fördelning på sjukvårdsregionerna och kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. År 2012.

Tabell 3B Övåntade fall funna vid obduktion. Fördelning på sjukvårdsregionerna och kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. År 2012.

Tabell 3C Multipler, fall för ett visst läge där tumören är den andra eller högre i ordningen för en och samma individ. Fördelning på sjukvårdsregionerna och kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. År 2012.

Tabell 12 Antal tumörer in situ vilka ej räknats in i den övriga statistiken över maligna fall (med undantag enligt föreskrift). Endast för vissa lägen. Åren 1993-2012.

Antal per 100 000

Tabell 4 Fördelning på 5-års åldersgrupper. Dessutom *antal per 100 000 åldersstandardiserad* incidens för riket. Dels befolkningen år 2000 och dels med världspopulationen. (4-ställig ICD-7 kod) År 2012.

Antal per 100 000 åldersstandardiserad incidens

Tabell 5 Fördelning på län. Den svenska befolkningen år 2000 utgör standardpopulation, se appendix 2. År 2012.

Tabell 6 Fördelning på sjukvårdsregionerna och kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö (den svenska befolkningen år 2000 utgör standardpopulation). År 2012.

Tabell 7 Åren 1993-2012 (världspopulationen, se appendix 2)

Andel fall (procent)

Tabell 8 Andel fall som är cytologiskt eller histologiskt verifierade. Fördelning på 5-års åldersgrupper. År 2012.

Tabell 9 Andel övåntade fall som hittats vid obduktion. Fördelning på 5-års åldersgrupper. År 2012.

Tabell 10 Andel övåntade fall som hittats vid obduktion. Fördelning på sjukvårdsregionerna och kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. År 2012.

Tabell 11 Antalet individer som andel av antalet tumörer åren 1993-2012.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																			
			Samtlig																			
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
140 - 209	Samtliga lägen	M	29 376	69	44	27	72	104	152	176	306	409	655	1 175	2 051	3 625	5 531	4 835	4 039	3 277	2 829	
		F	27 894	47	34	30	56	112	197	314	548	852	1 485	1 737	2 167	3 206	4 258	3 701	3 084	2 853	3 213	
140	Läpp	M	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	8	17	15	13	17	15	
		F	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	15	14	9	9	10	
1400	Överläpp	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	2	
1401	Underläpp	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	6	14	9	11	13	14	
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	9	12	8	6	8	
1408	Läpp, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1409	Läpp, ospecificerat ställe	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	1	
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	1	1	1	-	
141	Tunga	M	150	-	-	-	-	1	-	-	1	4	12	18	15	28	34	16	12	5	4	
		F	111	-	-	-	-	-	1	-	5	4	7	11	11	19	19	10	12	6	6	
1410	Tungbasen	M	62	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	8	14	14	7	3	1	1	
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	9	6	1	1	1	-	
1417	Tunga	M	70	-	-	-	-	1	-	-	1	1	6	9	6	11	14	7	9	2	3	
		F	71	-	-	-	-	-	1	-	4	3	5	5	8	8	12	8	10	2	5	
1418	Tunga, flera lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1419	Tunga, ospecificerat ställe	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	5	2	-	2	-	
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	3	1	
142	Spottkörtel	M	68	-	1	-	-	-	1	-	2	5	1	4	4	8	16	6	5	5	10	
		F	55	-	-	-	1	1	2	4	-	2	2	4	4	3	15	3	3	5	6	
1420	Öronspottkörtel	M	54	-	1	-	-	-	1	-	2	4	1	4	4	6	11	5	3	5	7	
		F	44	-	-	-	1	1	2	3	-	2	2	3	3	3	10	2	3	4	5	
1425	Sublingualiskörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1426	Submandibulariskörtel	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	1	2	-	3	
		F	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	1	
1428	Spottkörtel, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1429	Spottkörtel, ospecificerat ställe	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
			Samtlig																		
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
143	Munbotten	M	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	4	10	5	5	2	1
		F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	6	1	3	2	1
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	93	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	3	6	13	13	20	16	9	7
		F	99	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	6	9	7	16	10	8	14	24
145	Mellansvalget	M	162	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	20	34	38	31	14	8	-	3
		F	57	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	13	8	12	5	1	4	2
146	Näs-svalgrummet	M	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	2	4	2	3	1	2	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	2	1	2	-	1	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	9	7	5	6	4
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	2	1	2	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	309	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	17	22	37	63	62	33	39	25
		F	113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	11	10	20	16	17	16	17
1500	Matstrupe specificerad del	M	263	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	17	17	31	53	53	28	31	23
		F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	7	14	14	14	14	14
1508	Matstrupe, flera lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	Matstrupe, ospecificerat	M	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	6	10	9	5	7	2
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	2	3	2	3
151	Magsäck	M	436	-	-	-	-	-	1	-	3	4	9	23	25	55	78	59	63	52	64
		F	307	-	-	-	1	-	1	-	2	6	11	15	17	26	41	59	48	36	44
1510	Magsäck övriga delar	M	186	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	10	11	20	27	28	24	25	32
		F	149	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	7	5	13	20	29	22	16	24
1511	Övre magmunnen	M	163	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	9	29	34	19	24	15	20
		F	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	11	12	5	4	8
1518	Magsäck, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	Magsäck, ospecificerat	M	87	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	6	17	12	15	12	12
		F	100	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	5	7	3	10	18	21	16	12
152	Tunntarm	M	174	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	5	12	13	49	19	20	32	13
		F	111	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	15	9	19	20	23	9	8
1520	Tolvfingertarmen	M	40	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	4	18	4	5	2	3
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	4	5	7	1	4

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
ICD-7	Läge	Kön	Samtlig	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1527	Tunntarm övriga delar	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	8	7	6	6	4
		F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	1	8	8	6	3	3
1528	Tunntarm, flera lokalisationer	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	-	3	20	4
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1529	Tunntarm, ospecificerat ställe	M	54	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	7	6	13	8	6	4	2
		F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	7	7	10	5	1
153	Tjocktarm	M	2 084	-	-	1	5	7	5	6	8	38	44	65	125	217	341	361	355	285	221
		F	2 121	-	2	1	1	3	6	6	20	21	41	60	109	181	280	314	371	366	339
1530	Tjocktarm (caecum eller ascendens)	M	695	-	-	-	-	1	2	1	3	10	11	13	31	64	105	127	130	104	93
		F	893	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	22	35	64	118	133	172	174	158
1531	Tjocktarm (transversum eller flexur)	M	383	-	-	-	-	1	1	1	3	10	7	13	21	35	52	68	79	52	40
		F	407	-	-	-	-	1	1	-	5	2	7	6	14	28	40	71	86	72	74
1532	Tjocktarm (descendens)	M	121	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	11	15	16	21	16	22	9
		F	89	-	-	-	-	-	-	2	4	-	5	3	2	4	13	17	11	16	12
1533	Tjocktarm (sigmoideum)	M	805	-	-	-	-	-	1	2	1	14	22	26	55	93	159	135	116	104	77
		F	626	-	-	-	-	-	1	-	1	8	20	19	48	71	91	89	96	98	84
1534	Blindtarm	M	53	-	-	1	5	5	1	1	1	1	2	7	6	7	5	5	3	3	-
		F	79	-	2	1	1	2	3	4	8	4	1	10	8	10	9	3	4	5	4
1538	Tjocktarm, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1539	Tjocktarm, ospecificerat ställe	M	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	5	11	-	2
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	9	1	2	1	6
154	Ändtarm och anus	M	1 255	-	-	-	-	1	2	5	8	27	28	66	85	149	226	214	200	141	103
		F	912	-	-	-	-	-	-	1	9	17	24	55	86	112	120	127	137	102	122
1540	Ändtarm	M	1 209	-	-	-	-	1	2	5	8	27	27	62	80	143	215	201	196	141	101
		F	824	-	-	-	-	-	-	1	8	16	24	43	73	97	109	115	129	95	114
1541	Anus	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	11	13	4	-	2
		F	86	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	12	11	15	11	12	8	7	8
1548	Ändtarm och anus, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
155	Lever och gallvägar	M	522	1	-	-	1	1	4	1	4	9	10	27	51	82	89	92	78	46	26
		F	413	1	-	-	-	-	1	3	6	3	13	16	22	38	74	70	68	69	29
1550	Levercancer, primär	M	367	1	-	-	1	1	4	1	3	6	5	20	39	58	62	64	56	32	14
		F	188	1	-	-	-	-	1	3	3	2	8	7	17	18	32	30	24	31	11

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																			
		Samtlig																				
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1551	Gallblåsa	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	10	5	5	6	4	
		F	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	7	27	22	20	22	3	
1552	Gallvägar utanför levern	M	62	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	4	8	8	16	12	3	3	
		F	65	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	11	8	13	12	8	6	
1553	Gallvägsmynningen	M	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	8	6	3	-	1	2	
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	4	2	6	2	2	
1558	Gallvägar, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1559	Gallvägar, ospecificerat ställe	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	5	4	3	
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	6	5	7	
156	Levercancer, ospecificerat	M	42	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7	8	6	6	5	5	2	
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	4	7	6	9	4	1	
157	Bukspottkörtel	M	520	-	-	-	-	1	1	1	-	8	14	28	30	76	114	85	77	60	25	
		F	532	-	-	-	-	1	-	-	2	6	11	20	26	66	97	101	84	64	54	
158	Bukhinna	M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	-	
		F	64	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	2	6	16	13	6	9	3	
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	36	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	1	5	8	2	6	6	
		F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	9	2	3	2	6	
1600	Näsans insida och hålrum	M	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	2	-	3	3	
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	6	2	2	2	4	
1601	Örontrumpeten	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	
1602	Överkäkshålan (sinus maxillaris)	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	
1607	Bihåla övriga delar	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	2	-	2	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	
1608	Mellanöra, näshåla och bihålor, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1609	Mellanöra, näshåla och bihålor, ospecificerat ställe	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
161	Struphuvud och stämband	M	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	14	34	26	20	14	13	
		F	37	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	9	6	4	8	-	-	
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	1 911	-	-	2	-	2	-	1	2	7	28	48	103	270	421	375	296	235	121	
		F	1 812	1	-	-	-	-	1	3	7	6	30	82	140	240	392	318	287	191	114	

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
		Samtlig																			
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1620	Luftstrupe	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1621	Lungcancer, primär inkl bronker	M	1 823	-	-	2	-	2	-	1	2	7	28	46	100	262	402	360	279	220	112
		F	1 798	1	-	-	-	-	1	3	6	6	30	81	140	240	391	315	285	188	111
1622	Lungsäck (pleura)	M	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	18	15	16	14	9
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	2	3	3
163	Lungcancer, ospecificerad	M	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	7	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	7	5	5	6	7
		F	8 490	-	-	-	1	3	29	73	175	390	751	754	818	1 184	1 436	1 109	571	567	629
1701	Höger bröst	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	2	2	3	5
		F	3 489	-	-	-	-	1	9	34	72	157	298	339	308	514	565	458	225	235	274
1702	Vänster bröst	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	2	3	3	2
		F	3 672	-	-	-	1	2	12	23	65	165	277	286	369	507	646	487	282	256	294
1707	Höger bröst, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	636	-	-	-	-	-	8	4	14	31	88	57	55	85	116	74	38	35	31
1708	Vänster bröst, flera lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	682	-	-	-	-	-	-	12	24	37	88	71	85	77	109	86	26	40	27
1709	Bröst, sidangivelse saknas	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	-	1	3
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	484	-	1	-	-	11	31	52	71	64	44	25	30	33	27	29	18	23	25
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	1 362	-	-	-	-	-	-	3	6	11	39	68	121	201	268	228	169	127	121
173	Moderkaka (placenta)	F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	95	-	-	-	-	1	2	1	-	2	10	8	13	10	13	6	15	11	3
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	694	-	-	1	3	9	4	8	7	17	40	63	72	107	123	90	68	53	29
1750	Äggstock (ovarium)	F	640	-	-	1	3	9	4	8	7	16	38	59	67	95	113	80	62	51	27
1751	Äggledare och breda livmoderbanden	F	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	12	10	10	6	2	2
1758	Äggledare och breda livmoderbanden, flera lokali-satio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	Äggledare och breda livmoderbanden, ospecificerat stäl	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Kvinnligt könsorgan	F	209	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	6	12	12	19	33	24	36	55

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
ICD-7	Läge	Kön	Samtlig a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1760	Vulva	F	118	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	6	6	7	20	14	23	33
1761	Vagina	F	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	4	5	3	6	6
1767	Kvinnligt könsorgan, annan specificerad del	F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	6	6	6	6	7
1768	Kvinnligt könsorgan, flera lokalisationer	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	Kvinnligt könsorgan, ospecificerat ställe	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	9
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	8 985	-	-	-	-	-	-	-	-	10	75	326	762	1 441	2 225	1 716	1 133	765	532
178	Testikel	M	346	4	2	-	15	37	57	53	66	40	40	13	4	5	3	6	-	-	1
179	Manligt könsorgan	M	91	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	5	12	20	17	11	9	6
1790	Penis	M	87	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	5	11	20	15	11	9	6
1791	Pungen (scrotum)	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
1797	Manligt könsorgan, annan specificerad del	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1798	Manligt könsorgan, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1799	Manligt könsorgan, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Njure och njurbäcken	M	722	4	2	-	1	-	-	4	9	18	24	36	60	93	143	131	118	63	16
		F	454	7	2	-	-	-	-	1	4	11	17	24	39	59	54	83	77	47	29
1801	Njurbäcken	M	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	4	19	11	13	11	6
		F	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	9	1	9	10	12	10
1809	Njure, ospecificerat ställe inkl njurvävnaden	M	200	-	-	-	1	-	-	2	2	5	6	7	19	25	36	39	35	19	4
		F	108	1	-	-	-	-	-	-	1	-	9	7	10	12	13	19	25	4	7
181	Urinvägar utom njure	M	1 856	-	-	-	-	1	7	3	9	14	28	63	99	173	298	364	303	260	234
		F	629	-	-	-	-	1	-	-	3	4	13	29	29	63	97	91	108	84	107
1810	Urinblåsa	M	1 791	-	-	-	-	1	7	3	9	10	27	62	94	169	288	356	290	249	226
		F	597	-	-	-	-	1	-	-	3	4	12	27	29	62	93	84	102	80	100
1811	Urinledare	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	5	3	7	5	10	9	3
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	5	4	2	7
1812	Urinröret	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	2
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
1816	Urachus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
ICD-7	Läge	Kön	Samtlig	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1817	Urinvägar, annan specificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1818	Urinvägar, flera lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1819	Urinvägar, ospecificerat ställe	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	3
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
190	Malignt melanom i huden	M	1 709	-	-	2	1	11	12	28	57	66	89	99	150	217	271	215	193	165	133
		F	1 659	-	1	-	8	18	44	55	84	111	134	127	133	176	211	143	138	111	165
1901	Melanom på ögonlock, i ögonvinkel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
1902	Melanom på öra, i yttre hörselgång	M	37	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	3	3	5	6	5	2	6
		F	17	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	3	4	2	1	1	-
1903	Melanom, annan specificerad del i ansiktet	M	122	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	4	6	7	23	15	20	17	22
		F	131	-	-	-	-	-	2	3	3	5	1	1	3	8	8	17	20	13	47
1904	Melanom i hårbotten och på halsen	M	91	-	-	-	-	1	2	2	2	2	3	3	10	8	22	10	6	11	9
		F	54	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	1	5	5	7	5	9	3	9
1905	Melanom på bålen och pungen	M	900	-	-	1	1	8	5	11	28	34	57	54	92	117	149	109	95	81	58
		F	529	-	-	-	2	11	18	25	35	51	54	49	44	60	64	33	33	25	25
1906	Melanom på övre extremitet och axill	M	358	-	-	1	-	1	2	7	13	17	12	22	22	52	50	57	47	34	21
		F	396	-	1	-	4	2	10	10	14	18	24	26	20	46	62	43	34	35	47
1907	Melanom på nedre extremitet och lumske	M	189	-	-	-	-	1	1	6	10	10	14	14	16	29	20	15	20	20	13
		F	523	-	-	-	2	5	12	17	28	33	50	47	58	53	66	43	41	31	37
1908	Melanom i huden, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
1909	Melanom i huden, ospecificerat ställe	M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	-	-	4
		F	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	3 294	-	-	-	1	-	1	3	6	12	13	40	83	166	343	402	577	662	985
		F	2 424	-	-	1	2	2	-	5	9	25	34	52	78	141	212	255	318	424	866
1911	Hudtumör på ögonlock, i ögonvinkel	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	2	1	1
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	2	9
1912	Hudtumör på öra, i yttre hörselgång	M	507	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	15	38	56	101	123	163
		F	52	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	4	6	6	4	9	16

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
ICD-7	Läge	Kön	Samtlig a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1913	Hudtumör, annan specificerad del i ansiktet	M	1 168	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	15	29	49	113	151	205	241	356
		F	1 127	-	-	-	2	1	-	2	2	2	7	10	21	48	65	104	142	225	496
1914	Hudtumör i hårbotten och på halsen	M	542	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	14	23	41	55	96	120	185
		F	128	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	3	3	9	11	12	24	60
1915	Hudtumör på bålen och pungen	M	382	-	-	-	-	-	1	-	2	5	1	9	15	16	50	46	61	66	110
		F	298	-	-	-	-	1	-	-	3	7	6	14	17	27	39	44	39	41	60
1916	Hudtumör på övre extremitet och axill	M	427	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	7	10	40	59	46	77	61	120
		F	348	-	-	1	-	-	-	-	1	3	9	8	23	26	31	32	44	59	111
1917	Hudtumör på nedre extremitet och lumske	M	192	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	9	17	31	32	29	35	34
		F	398	-	-	-	-	-	-	-	2	11	7	14	9	29	54	46	69	60	97
1918	Tumör i huden, flera lokalisationer	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	9	4	10	12
		F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	6	4	2	11
1919	Tumör i huden, ospecificerat ställe	M	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	7	1	2	5	4
		F	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	3	2	2	2	6
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	76	6	4	-	-	-	1	1	1	3	4	6	7	9	11	10	7	5	1
		F	64	3	-	1	-	-	1	-	-	3	3	5	6	9	7	14	4	6	2
1920	Öga	M	70	5	2	-	-	-	1	1	1	2	3	6	7	9	11	10	6	5	1
		F	53	1	-	-	-	-	1	-	-	3	2	5	5	8	7	12	3	4	2
1921	Synnerv	M	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1922	Ögonhåla	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
1923	Ögats bindehinna	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
1927	Öga, annan specificerad lokalisering	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1928	Öga, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	Öga, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	593	25	15	9	11	13	16	15	31	31	37	55	57	57	80	63	50	17	11
		F	693	10	10	13	9	9	11	14	25	34	65	67	65	73	116	65	55	37	15
1930	Hjärna, hjärnnerver och hjärnhinna	M	516	19	15	8	9	11	15	10	25	25	32	48	49	50	74	56	46	14	10
		F	593	9	9	11	7	9	10	12	23	28	56	59	54	61	102	54	47	30	12

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
		Samtlig																			
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1931	Ryggmärg, ryggmärgshinna	M	49	1	-	1	1	2	1	4	6	2	4	4	6	4	4	4	3	2	-
		F	66	-	1	2	1	-	1	1	1	3	7	4	6	4	13	9	6	5	2
1933	Perifera nerver	M	8	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
1938	Perifera nerver, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	Perifera nerver, ospecificerat ställe	M	19	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	1	3	2	3	1	1	-
		F	30	1	-	-	1	-	-	-	1	3	2	4	5	8	1	1	2	-	1
194	Sköldkörtel	M	154	-	-	1	1	1	5	11	13	10	15	12	8	10	22	18	10	11	6
		F	356	-	1	-	2	9	25	29	34	22	29	23	31	30	44	15	26	22	14
195	Endokrin körtel	M	315	1	1	1	6	2	4	11	10	21	26	35	36	40	49	36	21	12	3
		F	629	4	-	-	4	11	7	17	23	31	43	60	82	91	87	87	42	31	9
1950	Binjure	M	26	1	-	-	1	-	1	1	2	2	5	1	2	3	-	4	3	-	-
		F	43	4	-	-	-	1	-	1	5	3	2	6	3	3	6	7	1	-	1
1951	Bisköldkörtel	M	135	-	-	1	2	1	-	1	4	9	5	17	15	18	27	15	11	7	2
		F	448	-	-	-	3	5	3	7	7	19	37	47	61	70	64	66	33	20	6
1952	Brässen (thymus)	M	15	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	2	3	3	1	-	-	-
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	1	4	3	4	-
1953	Hypofys	M	119	-	-	-	3	1	1	7	4	6	14	14	12	13	17	15	7	5	-
		F	102	-	-	-	1	4	3	9	9	8	3	7	12	12	13	8	5	7	1
1955	Endokrin körtelvävnad i bukspottkörtel	M	12	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	2	1	-	-	-	1
		F	13	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	2	2	2	-	-	1
1957	Annan specificerad endokrin körtelvävnad	M	7	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
1958	Endokrin körtelvävnad, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	Endokrin körtelvävnad, ospecificerad körtel eller loka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	Skelettet	M	28	-	3	2	5	-	2	1	1	-	-	-	1	1	6	2	2	1	1
		F	51	-	2	4	1	1	3	3	3	1	2	3	1	3	16	2	1	3	2

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

ICD-7	Läge	Kön	Ålder vid diagnos																		
			Samtlig	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1960	Skalle, ansiktets ben och överkäksben	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
1961	Underkäksben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1962	Ryggrad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1963	Revben, bröstben och nyckelben	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
1964	Överarmsben och skulderblad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
1965	Handlovsben, mellanhandsben och fingerben	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	Höftben, korsben och svansben	M	6	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
1967	Nedre extremitetens långa ben	M	11	-	1	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	27	-	2	3	1	1	-	-	1	-	1	1	1	2	12	-	-	2	-
1968	Nedre extremitetens korta ben	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969	Skelett, flera lokalisationer eller ospecificerat stål	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	160	2	1	3	4	2	2	5	8	5	10	14	10	21	24	13	15	8	13
		F	150	2	2	2	2	3	4	5	4	8	9	6	6	12	21	18	12	14	20
1970	Huvud inkl ansikte och hals	M	20	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	4	1	1	4	3
		F	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2
1971	Bål och rygg	M	5	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	-	-	1	1
1972	Övre extremitet och skuldra	M	21	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	2	1	3	4	2	2	-	2
		F	12	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	3	-	1
1973	Nedre extremitet, höft och säte	M	58	-	-	-	2	-	1	3	3	2	6	3	2	10	11	4	5	1	5
		F	52	-	1	-	1	1	1	1	2	3	3	-	2	4	6	5	5	6	11
1974	Retroperitoneala rummet	M	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	4	1	1	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	2	1

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
			Samtlig																		
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1975	Hjärta	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1977	Bindväv, annan mjuk vävnad, annan specificerad lokalis	M	38	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	4	5	5	3	2	6	1	3
		F	40	1	-	1	1	1	3	3	1	2	2	-	1	4	8	6	2	1	3
1978	Bindväv och annan mjuk vävnad, flera lokalisationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1979	Bindväv och annan mjuk vävnad, ospecificerat ställe	M	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	16	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	-	1	1	4	-	1	1
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	554	-	-	-	1	-	1	1	6	10	13	22	42	69	95	92	79	68	55
		F	704	1	-	2	-	-	1	-	5	10	13	34	42	61	91	94	125	108	117
1991	Ospecificerat ställe i huvud, ansikte och hals	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
		F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1992	Ospecificerat ställe i bröstet (thorax)	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1993	Ospecificerat ställe i buken och matsmältningska-nalen	M	41	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	8	6	6	6	5	6
		F	188	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	13	14	28	29	37	26	32
1994	Ospecificerat ställe i lilla bäckenet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
		F	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	3	2	4	-
1995	Ospecificerat ställe i extremiteterna1Ospecificerat st	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1999	Ospecificerad lokalisation	M	501	-	-	-	1	-	-	1	6	9	12	22	41	59	86	84	72	61	47
		F	495	-	-	2	-	-	-	-	5	8	11	27	27	45	62	61	86	76	85
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	925	2	6	-	4	4	7	8	13	23	34	39	81	98	150	133	138	113	72
		F	723	-	2	1	4	3	5	7	10	12	26	41	39	76	105	103	108	87	94
2001	Malignt lymfom av non-Hodgkintyp, lymfocytärt	M	872	2	6	-	4	4	7	8	13	23	33	34	75	95	139	125	129	108	67
		F	687	-	2	1	4	3	5	7	9	12	25	37	38	71	101	95	107	81	89

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
ICD-7	Läge	Kön	Samtlig	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
2002	Malignt lymfom utan närmare specifikation	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	-	1	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	2	2
2003	Malignt lymfom av non-Hodgkintyp, Waldenströms sjukdom	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	10	6	9	4	5
		F	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	3	7	1	4	3
201	Hodgkins sjukdom	M	114	-	-	1	7	11	7	8	13	8	8	10	5	12	6	6	7	2	3
		F	105	-	1	1	10	16	6	11	9	5	9	3	6	3	3	8	7	5	2
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	110	3	-	1	-	1	2	-	1	6	8	6	9	19	21	10	13	7	3
		F	50	1	3	-	-	-	1	1	2	-	2	3	1	5	6	9	5	4	7
2021	Tumör i lymfatisk vävnad, ospecificerad	M	60	3	-	1	-	1	2	-	-	-	5	3	3	10	12	6	8	3	3
		F	37	1	3	-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	4	4	7	4	3	4
2022	Tumör i lymfatisk vävnad, mycosis fungoides	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	-	4	3	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	-	2
2024	Hårcellsleukemi	M	35	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	4	7	6	4	1	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	358	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	15	26	50	63	56	54	48	32
		F	272	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	11	20	35	42	34	31	42	46
204	Lymfatisk leukemi	M	331	17	8	3	3	3	2	2	7	5	7	7	20	43	58	57	39	31	19
		F	226	15	5	2	5	1	2	1	-	2	5	8	11	19	33	30	25	42	20
2040	Akut lymfatisk leukemi	M	51	17	8	2	2	2	2	-	7	2	-	-	-	2	3	2	1	1	-
		F	53	15	5	2	5	1	2	1	-	2	3	-	5	4	4	2	1	1	-
2041	Kronisk lymfatisk leukemi	M	258	-	-	-	1	1	-	-	-	3	6	6	19	36	50	51	37	29	19
		F	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	6	14	26	27	23	39	19
2049	Lymfatisk leukemi, ospecificerad	M	17	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	5	4	1	1	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	1
205	Myeloisk leukemi	M	272	3	1	-	4	4	7	2	8	7	19	19	13	23	35	44	26	35	22
		F	215	1	1	1	1	8	5	5	10	7	9	8	12	16	34	27	13	32	25
2050	Akut myeloisk leukemi	M	154	3	-	-	3	3	3	1	5	3	8	9	10	11	21	23	21	17	13
		F	131	1	1	1	1	5	2	3	3	3	3	3	10	9	23	13	12	22	16
2051	Kronisk myeloisk leukemi	M	60	-	1	-	1	1	3	1	3	4	5	5	2	7	8	11	1	3	4
		F	39	-	-	-	-	2	2	1	3	4	4	3	1	4	4	6	-	3	2
2059	Myeloisk leukemi, ospecificerad	M	58	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	5	1	5	6	10	4	15	5
		F	45	-	-	-	-	1	1	1	4	-	2	2	1	3	7	8	1	7	7

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
		Samtlig																			
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
206	Monocytleukem	M	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	4	-	3	-
		F	12	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	1	2	1
2060	Akut monocytleukemi	M	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	4	-	3	-
		F	12	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	1	2	1
2061	Kronisk monocyleukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	Monocytleukemi, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	44	1	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	4	2	2	11	4	6	3
		F	55	-	1	-	-	-	1	2	1	1	4	6	4	5	4	7	7	6	6
2070	Akut leukemi, ospecificerad	M	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	3	-
		F	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2
2071	Kronisk leukemi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2072	Akut erytrocytleukemi	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2073	Megakaryocytleukemi	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2079	Leukemi, ospecificerad	M	29	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	2	2	6	4	3	2
		F	47	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	6	3	3	4	7	7	5	4
208	Polycytemia vera	M	82	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	12	14	13	15	6	8	3
		F	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	16	11	11	12	10	6
209	Myelofibros	M	82	-	-	-	1	1	2	-	3	1	2	5	1	10	20	11	12	9	4
		F	63	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	12	9	11	5	8	11

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 2 : Antal nya fall efter läge, kön och län

Table 2 : Number of new cases by site, sex and county

Counties	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Counties																							
ICD-7	Site	Sex	Sweden	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
140-209	Samtliga lägen	M	29 376	5 492	955	814	1 497	1 092	728	868	175	598	4 133	1 297	4 877	929	811	852	885	837	665	479	787	605	
		F	27 894	5 516	907	744	1 334	1 023	627	806	169	499	4 042	1 106	4 978	835	791	762	836	773	581	317	657	591	
140	Läpp	M	95	20	3	1	3	2	4	2	2	1	11	4	15	2	5	2	2	5	2	3	3	3	
		F	68	17	1	1	2	1	2	1	2	3	8	6	15	1	1	4	-	1	-	1	1	-	
141	Tunga	M	150	35	7	4	3	10	3	5	1	-	19	5	23	5	7	1	5	2	1	5	6	3	
		F	111	32	1	4	6	3	2	1	4	-	11	3	21	-	3	4	3	2	1	-	8	2	
142	Spottkörtel	M	68	13	4	4	3	-	1	1	2	-	11	2	10	5	4	2	2	1	2	1	-	-	
		F	55	15	2	1	4	2	-	-	-	-	6	2	5	3	2	1	5	2	2	-	1	2	
143	Munbotten	M	35	9	2	-	4	1	-	1	-	-	6	1	6	-	1	-	1	-	1	-	-	2	
		F	24	8	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	8	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	93	17	3	3	3	10	1	3	1	1	12	5	13	1	2	3	1	5	2	2	3	2	
		F	99	17	4	4	6	2	2	4	1	4	14	6	17	3	3	4	-	5	-	-	1	2	
145	Mellansvalget	M	162	38	3	4	4	3	5	3	-	1	25	5	28	5	8	7	5	5	4	4	4	1	
		F	57	13	3	-	-	3	-	-	1	2	6	4	9	5	-	3	2	1	2	1	-	2	
146	Näs-svalgrummet	M	23	5	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	1	2	-	2	-	1	1	1	-	1	
		F	11	1	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
147	Svalget bakom struphuvudet	M	43	13	1	-	3	2	3	-	1	1	4	2	10	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
		F	15	2	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	5	-	-	2	-	-	-	1	-	-	
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	Matstrupe	M	309	51	5	11	12	6	14	8	-	11	56	9	44	14	11	12	12	14	4	3	4	8	
		F	113	19	3	2	6	2	1	4	-	2	21	1	16	5	3	5	7	5	3	2	1	5	
151	Magsäck	M	436	80	11	10	11	12	12	15	-	9	70	15	82	16	6	13	10	13	12	6	13	20	
		F	307	60	10	12	17	7	5	8	1	6	40	17	51	5	11	7	10	6	7	3	10	14	
152	Tunntarm	M	174	29	8	3	5	2	2	-	-	5	25	5	62	2	5	3	6	4	2	3	1	2	
		F	111	21	4	6	5	2	1	3	4	-	17	4	17	5	1	3	4	5	1	2	4	2	
153	Tjocktarm	M	2 084	329	71	62	100	80	59	68	14	45	276	101	369	60	64	62	82	63	37	29	68	45	
		F	2 121	369	51	76	104	73	46	61	10	46	296	81	376	74	55	70	77	58	60	29	58	51	
154	Ändtarm och anus	M	1 255	202	44	43	52	46	26	33	11	35	158	42	204	46	46	53	48	47	34	20	40	25	
		F	912	172	24	34	48	19	21	21	7	25	122	37	158	28	33	25	34	37	14	8	26	19	
155	Lever och gallvägar	M	522	116	24	10	30	17	14	18	4	9	63	24	87	14	17	15	11	15	9	4	12	9	
		F	413	85	13	11	18	15	13	17	2	6	49	12	74	6	18	14	12	17	6	2	12	11	

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 2 : Antal nya fall efter läge, kön och län

Table 2 : Number of new cases by site, sex and county

Counties	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Counties																							
ICD-7	Site	Sex	Sweden	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
156	Levercancer, ospecificerat	M	42	1	-	-	1	2	3	2	-	4	16	2	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	38	1	-	-	-	-	4	-	1	6	18	-	4	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
157	Bukspottkörtel	M	520	103	19	21	30	21	16	17	2	6	74	21	90	16	13	8	11	13	8	8	16	7	7
		F	532	116	24	10	27	27	6	24	4	9	67	19	88	21	9	11	18	17	6	5	13	11	11
158	Bukhinna	M	9	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1
		F	64	16	1	2	2	2	3	-	1	1	11	5	7	3	2	-	-	3	3	-	1	1	1
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	36	8	1	-	2	-	-	2	-	2	2	-	10	1	1	2	1	1	1	-	-	2	2
		F	35	8	1	-	-	1	3	-	-	-	4	1	6	-	4	1	2	1	-	1	2	-	-
161	Struphuvud och stämband	M	138	18	9	4	5	3	3	4	-	6	23	6	23	3	2	5	3	6	6	3	3	3	3
		F	37	10	1	1	3	1	-	-	1	1	6	-	7	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	1 911	394	67	57	108	40	47	52	8	46	327	76	283	62	59	43	75	67	21	18	36	25	25
		F	1 812	368	51	52	95	23	39	50	13	27	335	64	285	61	57	53	53	60	41	25	38	22	22
163	Lungcancer, ospecificerad	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	7	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	41	7	2	2	2	2	-	1	-	-	7	3	4	1	1	1	2	-	3	1	-	2	2
		F	8 490	1 723	305	168	404	326	189	256	39	135	1 292	290	1 460	206	236	229	255	228	211	112	236	190	190
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	484	102	16	22	38	14	8	9	2	10	60	22	78	13	20	15	10	16	7	3	10	9	9
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	1 362	243	48	49	83	52	26	48	4	17	157	40	250	45	47	39	44	45	39	18	25	43	43
173	Moderkaka (placenta)	F	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	95	10	7	7	3	4	3	7	-	3	14	2	17	4	3	3	1	-	-	-	1	6	6
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	694	125	26	24	37	30	19	26	3	4	97	24	120	30	22	20	28	16	10	7	12	14	14
176	Kvinnligt könsorgan	F	209	52	4	7	16	13	5	4	2	5	21	3	30	8	9	6	7	5	1	1	5	5	5
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	8 985	1 760	259	234	477	351	266	288	50	173	1 176	393	1 297	266	186	305	252	236	266	210	295	245	245
178	Testikel	M	346	77	14	7	22	8	7	9	3	8	52	12	50	13	10	6	13	6	6	3	10	10	10
179	Manligt könsorgan	M	91	20	1	5	7	3	-	3	1	4	8	2	13	2	2	4	2	5	3	1	2	3	3
180	Njure och njurbäcken	M	722	139	29	23	27	24	20	17	3	10	101	21	105	29	17	17	23	33	19	14	34	17	17
		F	454	78	14	14	27	25	16	20	3	8	53	14	76	17	8	10	11	18	7	5	16	14	14
181	Urinvägar utom njure	M	1 856	305	55	53	106	57	36	62	19	34	289	72	299	66	55	57	53	55	55	34	59	35	35
		F	629	133	14	22	26	16	15	26	4	9	92	19	111	15	14	14	22	18	12	11	20	16	16

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 2 : Antal nya fall efter läge, kön och län

Table 2 : Number of new cases by site, sex and county

Counties	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Counties																						
ICD-7	Site	Sex	Sweden	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25
190	Malignt melanom i huden	M	1 709	312	66	39	100	69	46	43	9	30	197	84	374	52	57	51	42	40	36	17	19	26
		F	1 659	298	71	32	91	90	33	36	11	36	223	81	342	54	53	45	39	32	25	14	26	27
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	3 294	634	93	64	184	159	66	107	16	66	514	217	594	120	97	52	66	88	43	31	42	41
		F	2 424	490	63	35	89	95	58	70	15	46	403	193	485	91	48	33	52	60	25	17	26	30
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	76	15	2	1	3	2	1	5	2	-	10	3	15	4	1	2	2	2	3	1	1	1
		F	64	11	2	4	3	3	3	4	1	2	5	1	13	1	1	2	1	1	4	-	2	-
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	593	94	22	21	27	21	11	26	5	8	85	27	121	16	16	24	15	13	12	5	14	10
		F	693	120	24	14	37	24	25	20	5	17	102	22	144	19	14	26	15	24	10	3	17	11
194	Sköldkörtel	M	154	37	3	1	-	3	2	1	1	4	29	6	40	7	1	1	2	-	3	3	4	6
		F	356	69	9	8	7	6	4	3	1	6	53	15	107	10	7	8	9	3	6	4	15	6
195	Endokrin körtel	M	315	81	5	8	7	13	8	2	3	6	59	10	53	11	11	5	6	7	-	7	7	6
		F	629	204	4	18	13	25	15	6	2	15	86	10	134	14	23	12	9	8	6	11	7	7
196	Skelettet	M	28	4	1	2	1	1	1	-	1	1	5	1	5	-	-	-	2	1	-	1	1	-
		F	51	16	2	-	1	1	-	-	1	1	8	1	5	-	-	2	2	1	-	-	-	10
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	160	28	5	7	7	3	7	3	1	3	24	11	28	1	5	3	4	4	6	4	5	1
		F	150	20	5	5	7	7	5	4	1	3	27	10	23	2	6	4	5	6	3	1	3	3
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	554	65	32	29	20	20	4	4	4	11	70	16	102	26	23	25	44	23	15	7	10	4
		F	704	125	30	37	30	24	13	15	6	14	75	28	111	26	24	24	28	20	21	11	21	21
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	925	172	36	30	51	43	15	23	6	22	115	37	152	25	28	35	33	26	14	14	34	14
		F	723	127	26	20	33	27	15	26	7	5	112	31	120	22	20	26	29	16	19	12	13	17
201	Hodgkins sjukdom	M	114	28	6	5	3	6	2	2	-	2	16	2	24	3	-	3	4	1	4	1	1	1
		F	105	29	6	2	7	1	3	1	-	-	12	7	12	2	5	4	-	4	6	1	3	-
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	110	26	2	2	7	2	7	4	1	3	19	2	25	-	2	1	-	-	2	1	3	1
		F	50	6	1	2	2	2	1	4	-	-	10	1	11	2	2	2	1	-	-	-	-	3
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	358	51	13	13	27	13	9	9	-	13	50	10	57	4	17	9	18	11	6	6	16	6
		F	272	39	16	8	15	20	9	10	1	6	26	5	45	9	9	6	17	9	7	-	7	8
204	Lymfatisk leukemi	M	331	38	10	15	17	17	3	9	1	6	52	12	65	14	15	10	10	10	9	2	10	6
		F	226	28	8	15	9	12	2	7	-	6	28	10	44	10	10	8	7	6	3	4	5	4
205	Myeloisk leukemi	M	272	46	12	9	12	10	3	11	2	6	48	15	34	5	10	7	12	8	7	3	6	6
		F	215	49	7	4	7	11	10	4	4	5	29	7	31	6	5	11	7	4	7	-	6	1
206	Monocytleukem	M	13	5	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	1	-	-	-	2	1	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 2 : Antal nya fall efter läge, kön och län

Table 2 : Number of new cases by site, sex and county

Counties	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Counties																								
ICD-7	Site	Sex	Sweden	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	44	26	2	2	-	-	-	1	-	-	2	-	4	1	1	-	3	-	2	-	-	-		
		F	55	31	1	-	-	1	-	-	4	1	1	-	3	3	1	3	3	2	1	-	-	-		
208	Polycytemia vera	M	82	17	2	1	5	4	-	2	1	3	3	8	27	2	2	-	1	2	-	-	2	-		
		F	78	24	1	2	2	7	-	2	1	2	4	5	19	1	1	-	2	2	1	-	2	-		
209	Myelofibros	M	82	21	1	4	3	3	1	1	-	1	15	3	14	4	-	-	-	3	1	3	2	2		
		F	63	12	1	2	2	2	1	3	-	4	9	3	11	2	-	1	4	2	1	1	1	1		

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 3A : Antal nya fall efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 3A : Number of new cases by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion	R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Linköping	R4: Lund-Malmö	R5: Göteborg	R6: Umeå
Stockholm	01: Län	0180: Kommun	01A: Län exklusive	0180		
Skåne	01: Län	1280: Kommun	12A: Län exklusive	1280		
Göteborg	01: Län	1480: Kommun	14A: Län exklusive	1280		

ICD-7	Läge	Kön	Sverige	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
140 -	209 Samtliga lägen	M	29 376	5 667	6 083	3 457	5 996	5 637	2 536	5 492	2 032	3 460	4 133	817	3 316	4 877	1 362	3 515
		F	27 894	5 685	5 647	3 163	5 604	5 648	2 146	5 516	2 297	3 219	4 042	871	3 171	4 978	1 482	3 496
140	Läpp	M	95	22	20	7	16	19	11	20	4	16	11	1	10	15	6	9
		F	68	19	9	4	15	19	2	17	5	12	8	-	8	15	9	6
141	Tunga	M	150	36	31	18	23	27	15	35	13	22	19	1	18	23	4	19
		F	111	36	17	10	14	23	11	32	13	19	11	5	6	21	5	16
142	Spottkörtel	M	68	15	22	4	12	12	3	13	8	5	11	1	10	10	4	6
		F	55	15	16	6	6	7	5	15	6	9	6	2	4	5	1	4
143	Munbotten	M	35	9	4	6	6	7	3	9	1	8	6	3	3	6	-	6
		F	24	8	4	1	2	8	1	8	2	6	2	-	2	8	3	5
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	93	18	18	16	16	16	9	17	7	10	12	5	7	13	1	12
		F	99	18	23	12	22	21	3	17	6	11	14	3	11	17	7	10
145	Mellansvalget	M	162	38	37	10	31	33	13	38	13	25	25	4	21	28	8	20
		F	57	14	14	3	9	12	5	13	6	7	6	-	6	9	3	6
146	Näs-svalgrummet	M	23	5	5	1	6	3	3	5	2	3	3	-	3	1	1	-
		F	11	1	3	2	3	2	-	1	1	-	2	-	2	2	1	1
147	Svalget bakom struphuvudet	M	43	14	2	5	9	11	2	13	7	6	4	-	4	10	5	5
		F	15	2	4	1	2	5	1	2	2	-	2	-	2	5	2	3
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
150	Matstrupe	M	309	51	79	26	85	49	19	51	19	32	56	11	45	44	16	28
		F	113	19	30	12	24	17	11	19	8	11	21	5	16	16	4	12
151	Magsäck	M	436	80	79	38	94	94	51	80	33	47	70	17	53	82	24	58
		F	307	61	61	32	61	58	34	60	16	44	40	12	28	51	17	34
152	Tunntarm	M	174	29	31	7	34	65	8	29	9	20	25	-	25	62	7	55
		F	111	25	28	10	20	19	9	21	9	12	17	2	15	17	9	8
153	Tjocktarm	M	2 084	343	464	248	422	428	179	329	127	202	276	64	212	369	96	273
		F	2 121	379	461	238	421	424	198	369	143	226	296	63	233	376	94	282
154	Ändtarm och anus	M	1 255	213	327	131	233	232	119	202	70	132	158	31	127	204	56	148
		F	912	179	215	88	187	176	67	172	88	84	122	24	98	158	44	114
155	Lever och gallvägar	M	522	120	106	65	96	101	34	116	40	76	63	14	49	87	22	65
		F	413	87	91	50	71	83	31	85	33	52	49	11	38	74	16	58
156	Levercancer, ospecificerat	M	42	1	-	5	25	9	2	1	-	1	16	1	15	9	3	6
		F	38	2	-	-	28	4	4	1	-	1	18	2	16	4	-	4

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 3A : Antal nya fall efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 3A : Number of new cases by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion	R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Linköping	R4: Lund-Malmö	R5: Göteborg	R6: Umeå
Stockholm	01: Län	0180: Kommun	01A: Län exklusive	0180		
Skåne	01: Län	1280: Kommun	12A: Län exklusive	1280		
Göteborg	01: Län	1480: Kommun	14A: Län exklusive	1280		

ICD-7	Läge	Kön	Sverige	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
157	Bukspottkörtel	M	520	105	101	68	106	101	39	103	45	58	74	12	62	90	26	64
		F	532	120	110	78	91	98	35	116	54	62	67	14	53	88	22	66
158	Bukhinna	M	9	-	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		F	64	17	11	4	16	11	5	16	7	9	11	3	8	7	1	6
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	36	8	7	4	4	10	3	8	1	7	2	1	1	10	2	8
		F	35	8	9	1	7	7	3	8	4	4	4	1	3	6	2	4
161	Struphuvud och stämband	M	138	18	32	12	33	28	15	18	6	12	23	2	21	23	9	14
		F	37	11	7	4	7	7	1	10	4	6	6	2	4	7	3	4
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	1 911	402	430	200	457	322	100	394	151	243	327	72	255	283	95	188
		F	1 812	381	387	168	429	321	126	368	141	227	335	69	266	285	77	208
163	Lungcancer, ospecificerad	M	8	-	3	-	1	3	1	-	-	-	1	-	1	3	-	3
		F	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M																
			7	3	1	2	1	-	-	3	2	1	1	-	1	-	-	-
		F	3	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	41	7	9	5	8	6	6	7	2	5	7	3	4	4	1	3
		F	8 490	1 762	1 626	986	1 712	1 654	749	1 723	689	1 034	1 292	292	1 000	1 460	444	1 016
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	484	104	112	61	89	89	29	102	53	49	60	9	51	78	24	54
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	1 362	247	317	183	215	275	125	243	111	132	157	33	124	250	67	183
173	Moderkaka (placenta)	F	4	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	95	10	25	14	21	18	7	10	3	7	14	5	9	17	2	15
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F																
			694	128	166	93	128	136	43	125	60	65	97	17	80	120	35	85
176	Kvinnligt könsorgan	F	209	54	46	33	31	33	12	52	28	24	21	4	17	30	7	23
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	8 985	1 810	1 738	1 116	1 763	1 542	1 016	1 760	612	1 148	1 176	180	996	1 297	362	935
178	Testikel	M	346	80	69	39	71	58	29	77	32	45	52	13	39	50	16	34
179	Manligt könsorgan	M	91	21	21	13	14	13	9	20	6	14	8	-	8	13	4	9
180	Njure och njurbäcken	M	722	142	171	68	136	121	84	139	45	94	101	16	85	105	17	88
		F	454	81	92	72	85	82	42	78	35	43	53	10	43	76	27	49
181	Urinvägar utom njure	M	1 856	324	394	225	394	336	183	305	124	181	289	70	219	299	81	218
		F	629	137	119	68	124	122	59	133	53	80	92	18	74	111	35	76
190	Malignt melanom i huden	M	1 709	321	347	212	309	422	98	312	130	182	197	30	167	374	117	257
		F	1 659	309	326	217	319	396	92	298	133	165	223	45	178	342	83	259
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	3 294	650	580	450	742	715	157	634	255	379	514	116	398	594	167	427
		F	2 424	505	382	254	595	590	98	490	215	275	403	86	317	485	169	316

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 3A : Antal nya fall efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmö och Göteborgs kommun

Table 3A : Number of new cases by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion	R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Linköping	R4: Lund-Malmö	R5: Göteborg	R6: Umeå
Stockholm	01: Län	0180: Kommun	01A: Län exklusive	0180		
Skåne	01: Län	1280: Kommun	12A: Län exklusive	1280		
Göteborg	01: Län	1480: Kommun	14A: Län exklusive	1280		

ICD-7	Läge	Kön	Sverige	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	76	17	14	10	13	16	6	15	5	10	10	1	9	15	4	11
		F	64	12	12	10	10	14	6	11	7	4	5	3	2	13	4	9
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	593	99	127	74	115	137	41	94	39	55	85	22	63	121	33	88
		F	693	125	136	81	151	159	41	120	47	73	102	17	85	144	54	90
194	Sköldkörtel	M	154	38	15	4	36	45	16	37	9	28	29	4	25	40	11	29
		F	356	70	54	16	67	118	31	69	29	40	53	17	36	107	50	57
195	Endokrin körtel	M	315	84	53	22	79	57	20	81	22	59	59	19	40	53	16	37
		F	629	206	88	44	119	141	31	204	79	125	86	25	61	134	46	88
196	Skelettet	M	28	5	6	2	7	6	2	4	1	3	5	2	3	5	3	2
		F	51	17	7	2	9	6	10	16	9	7	8	-	8	5	1	4
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	160	29	29	13	40	33	16	28	11	17	24	7	17	28	7	21
		F	150	21	33	18	43	25	10	20	10	10	27	3	24	23	6	17
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M																
			554	69	202	44	94	109	36	65	25	40	70	20	50	102	29	73
		F	704	131	189	69	110	131	74	125	48	77	75	22	53	111	25	86
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	925	178	213	117	167	174	76	172	63	109	115	28	87	152	44	108
		F	723	134	159	86	149	134	61	127	41	86	112	26	86	120	32	88
201	Hodgkins sjukdom	M	114	28	22	11	22	24	7	28	13	15	16	3	13	24	5	19
		F	105	29	23	9	17	17	10	29	14	15	12	-	12	12	4	8
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	110	27	7	13	31	25	7	26	9	17	19	5	14	25	6	19
		F	50	6	10	8	12	11	3	6	2	4	10	3	7	11	3	8
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	358	51	85	49	79	60	34	51	16	35	50	10	40	57	16	41
		F	272	40	74	45	44	47	22	39	17	22	26	6	20	45	13	32
204	Lymfatisk leukemi	M	331	39	84	43	67	71	27	38	14	24	52	13	39	65	9	56
		F	226	28	64	28	39	51	16	28	12	16	28	2	26	44	13	31
205	Myeloisk leukemi	M	272	48	63	33	64	42	22	46	17	29	48	8	40	34	14	20
		F	215	53	44	22	46	36	14	49	20	29	29	7	22	31	9	22
206	Monocyt leukem	M	13	5	1	1	3	1	2	5	3	2	3	2	1	1	-	1
		F	12	-	3	-	4	4	1	-	-	-	4	2	2	4	2	2
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	44	26	9	1	2	4	2	26	12	14	2	-	2	4	2	2
		F	55	35	13	1	2	3	1	31	19	12	1	-	1	3	-	3
208	Polycytemia vera	M	82	18	10	11	10	31	2	17	3	14	3	1	2	27	9	18
		F	78	25	9	11	8	22	3	24	8	16	4	-	4	19	3	16
209	Myelofibros	M	82	21	12	7	17	17	8	21	6	15	15	4	11	14	4	10
		F	63	12	12	7	17	11	4	12	6	6	9	1	8	11	4	7

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 3B : Antal nya oväntade fall upptäckta vid obduktion efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3B : Number of cases found incidentally at autopsy by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Linköping R4: Lund-Malmö R5: Göteborg R6: Umeå
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 01: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Göteborg 01: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Sverige	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
140 -	209 Samtliga lägen	M	173	34	46	6	48	32	7	34	18	16	28	7	21	27	10	17
		F	103	11	36	6	29	16	5	11	3	8	17	5	12	14	3	11
140	Läpp	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Tunga	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Spottkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Munbotten	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Mellansvalget	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Näs-svalgrummet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	2	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Magsäck	M	3	2	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-
		F	6	2	2	-	1	1	-	2	-	2	1	-	1	1	1	-
152	Tunntarm	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Tjocktarm	M	12	1	3	-	6	2	-	1	1	-	4	2	2	2	2	-
		F	9	1	2	3	2	1	-	1	1	-	2	1	1	1	-	1
154	Ändtarm och anus	M	4	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
155	Lever och gallvägar	M	20	5	8	1	6	-	-	5	2	3	6	2	4	-	-	-
		F	12	1	4	-	5	1	1	1	-	1	3	-	3	1	-	1
156	Levercancer, ospecificerat	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 3B : Antal nya oväntade fall upptäckta vid obduktion efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3B : Number of cases found incidentally at autopsy by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion	R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Linköping	R4: Lund-Malmö	R5: Göteborg	R6: Umeå
Stockholm	01: Län	0180: Kommun	01A: Län exklusive	0180		
Skåne	01: Län	1280: Kommun	12A: Län exklusive	1280		
Göteborg	01: Län	1480: Kommun	14A: Län exklusive	1280		

ICD-7	Läge	Kön	Sverige	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
157	Bukspottkörtel	M	14	2	5	-	4	3	-	2	2	-	2	1	1	2	-	2
		F	11	1	4	-	4	2	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1
158	Bukhinna	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Struphuvud och stämband	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	30	7	6	1	9	6	1	7	3	4	6	-	6	5	3	2
		F	13	1	3	-	5	3	1	1	-	1	4	2	2	2	-	2
163	Lungcancer, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Moderkaka (placenta)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
176	Kvinnligt könsorgan	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	30	10	11	1	5	2	1	10	6	4	3	-	3	2	1	1
178	Testikel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Manligt könsorgan	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Njure och njurbäcken	M	14	4	3	-	2	3	2	4	1	3	-	-	-	3	-	3
		F	7	1	1	3	2	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
181	Urinvägar utom njure	M	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
190	Malignt melanom i huden	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

Tabell 3B : Antal nya oväntade fall upptäckta vid obduktion efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3B : Number of cases found incidentally at autopsy by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

[illegible]

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 3C : Antal nya fall för personer som fått minst en tumör tidigare efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3C : Number of second and multiple primaries by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Linköping R4: Lund-Malmö R5: Göteborg R6: Umeå
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 01: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Göteborg 01: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Sverige	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
140 -	209 Samtliga lägen	M	5 814	1 118	1 129	701	1 281	1 237	348	1 084	446	638	898	196	702	1 077	282	795
		F	6 011	1 112	1 017	776	1 351	1 348	407	1 085	451	634	993	217	776	1 179	363	816
140	Läpp	M	32	7	6	5	6	7	1	6	1	5	4	1	3	6	1	5
		F	27	6	4	2	5	9	1	5	1	4	3	-	3	7	4	3
141	Tunga	M	29	6	9	2	3	7	2	6	3	3	2	-	2	5	2	3
		F	28	9	4	3	1	10	1	9	4	5	1	1	-	9	1	8
142	Spottkörtel	M	17	3	6	1	2	4	1	3	2	1	2	-	2	4	2	2
		F	12	4	3	1	2	1	1	4	1	3	2	2	-	-	-	-
143	Munbotten	M	6	1	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	10	4	1	1	1	3	-	4	1	3	1	-	1	3	1	2
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	29	5	7	4	6	7	-	5	1	4	3	1	2	7	-	7
		F	24	1	8	4	5	6	-	1	-	1	5	1	4	5	3	2
145	Mellansvalget	M	10	3	3	2	1	1	-	3	2	1	1	-	1	1	-	1
		F	6	2	2	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	1
146	Näs-svalgrummet	M	2	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	17	4	1	1	4	7	-	4	2	2	1	-	1	6	3	3
		F	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	51	9	10	3	20	6	3	9	4	5	14	4	10	6	4	2
		F	15	2	6	-	6	-	1	2	-	2	6	2	4	-	-	-
151	Magsäck	M	80	19	12	9	16	17	7	19	8	11	14	4	10	15	5	10
		F	46	12	7	8	10	9	-	12	4	8	6	2	4	8	1	7
152	Tunntarm	M	76	10	5	6	9	45	1	10	5	5	4	-	4	45	5	40
		F	40	10	10	2	7	7	4	7	3	4	7	1	6	6	4	2
153	Tjocktarm	M	465	81	93	59	98	101	33	78	33	45	67	11	56	84	16	68
		F	444	67	99	58	85	96	39	65	27	38	59	18	41	87	22	65
154	Ändtarm och anus	M	222	42	55	23	46	42	14	40	13	27	32	5	27	31	3	28
		F	172	28	37	14	43	37	13	26	17	9	28	6	22	32	11	21
155	Lever och gallvägar	M	85	14	15	10	23	18	5	13	7	6	12	1	11	14	2	12
		F	64	17	11	9	10	13	4	17	3	14	6	2	4	12	4	8
156	Levercancer, ospecificerat	M	8	-	-	2	3	3	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2
		F	12	-	-	-	10	1	1	-	-	-	6	1	5	1	-	1

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 3C : Antal nya fall för personer som fått minst en tumör tidigare efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3C : Number of second and multiple primaries by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion	R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Linköping	R4: Lund-Malmö	R5: Göteborg	R6: Umeå
Stockholm	01: Län	0180: Kommun	01A: Län exklusive	0180		
Skåne	01: Län	1280: Kommun	12A: Län exklusive	1280		
Göteborg	01: Län	1480: Kommun	14A: Län exklusive	1280		

ICD-7	Läge	Kön	Sverige	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
157	Bukspottkörtel	M	83	15	16	8	16	18	10	15	7	8	9	1	8	14	6	8
		F	85	21	15	15	14	16	4	21	9	12	11	3	8	14	5	9
158	Bukhinna	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	6	1	3	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	9	2	1	-	1	5	-	2	-	2	-	-	-	5	1	4
		F	4	3	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-
161	Struphuvud och stämband	M	18	3	9	1	3	1	1	3	-	3	2	-	2	1	-	1
		F	5	1	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	361	84	76	32	96	59	14	84	30	54	67	17	50	54	19	35
		F	319	60	70	36	85	55	13	59	21	38	71	14	57	50	15	35
163	Lungcancer, ospecificerad	M	4	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2
		F	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M																
			1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	9	1	3	2	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
		F	2 000	295	226	324	478	487	190	288	117	171	378	75	303	429	124	305
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	37	10	7	2	9	8	1	10	4	6	7	1	6	6	1	5
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	194	33	41	34	41	32	13	31	10	21	31	5	26	30	10	20
173	Moderkaka (placenta)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	12	2	3	1	3	3	-	2	1	1	2	1	1	3	-	3
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F																
			108	23	21	15	20	24	5	23	9	14	15	2	13	22	5	17
176	Kvinnligt könsorgan	F	55	11	11	6	11	13	3	11	5	6	8	-	8	11	4	7
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	815	166	169	101	179	136	64	158	62	96	121	25	96	120	32	88
178	Testikel	M	18	4	4	3	1	5	1	4	1	3	-	-	-	5	1	4
179	Manligt könsorgan	M	8	2	1	2	1	2	-	2	-	2	1	-	1	2	2	-
180	Njure och njurbäcken	M	167	29	34	21	30	27	26	28	13	15	22	5	17	22	4	18
		F	104	24	12	11	23	24	10	23	12	11	14	3	11	23	14	9
181	Urinvägar utom njure	M	424	66	85	51	91	92	39	62	28	34	71	13	58	85	20	65
		F	152	36	31	18	23	36	8	35	14	21	20	5	15	36	14	22
190	Malignt melanom i huden	M	415	74	79	54	88	105	15	72	36	36	62	12	50	93	26	67
		F	341	74	66	48	56	82	15	72	34	38	43	10	33	71	22	49
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	1 638	347	267	225	386	353	60	339	136	203	277	76	201	300	86	214
		F	1 014	235	152	101	259	240	27	232	99	133	170	42	128	193	63	130

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 3C : Antal nya fall för personer som fått minst en tumör tidigare efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3C : Number of second and multiple primaries by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion	R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Linköping	R4: Lund-Malmö	R5: Göteborg	R6: Umeå
Stockholm	01: Län	0180: Kommun	01A: Län exklusive	0180		
Skåne	01: Län	1280: Kommun	12A: Län exklusive	1280		
Göteborg	01: Län	1480: Kommun	14A: Län exklusive	1280		

ICD-7	Läge	Kön	Sverige	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	9	3	2	-	2	2	-	3	-	3	1	-	1	2	-	2
		F	8	-	1	-	5	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	83	12	10	10	18	28	5	12	7	5	13	4	9	25	8	17
		F	83	7	23	11	19	19	4	7	3	4	13	1	12	18	7	11
194	Sköldkörtel	M	34	6	5	-	7	13	3	6	1	5	5	1	4	9	4	5
		F	44	9	7	1	8	14	5	9	3	6	7	3	4	13	5	8
195	Endokrin körtel	M	37	7	6	1	11	9	3	7	4	3	8	1	7	8	1	7
		F	82	22	17	2	18	20	3	22	9	13	13	5	8	19	12	7
196	Skelettet	M	3	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	7	4	2	-	-	1	-	4	2	2	-	-	-	1	-	1
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	25	2	4	1	9	5	4	2	-	2	5	1	4	5	3	2
		F	26	2	9	3	10	1	1	2	2	-	5	1	4	-	-	-
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M																
		F	132	17	47	12	22	29	5	15	8	7	16	3	13	28	7	21
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	170	34	35	25	31	32	13	33	14	19	19	2	17	26	7	19
		F	124	20	30	14	25	26	9	19	5	14	13	2	11	22	4	18
201	Hodgkins sjukdom	M	9	3	2	1	1	2	-	3	1	2	1	-	1	2	-	2
		F	6	-	3	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	16	4	-	1	5	5	1	4	3	1	3	-	3	5	2	3
		F	6	1	2	-	3	-	-	1	1	-	3	1	2	-	-	-
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	54	7	12	8	13	10	4	7	2	5	9	-	9	9	2	7
		F	39	4	12	9	9	4	1	4	2	2	6	-	6	4	-	4
204	Lymfatisk leukemi	M	53	5	14	5	12	11	6	5	3	2	10	5	5	9	1	8
		F	40	4	11	5	11	4	5	4	1	3	9	-	9	2	-	2
205	Myeloisk leukemi	M	53	13	11	5	13	9	2	12	5	7	12	2	10	8	3	5
		F	45	13	7	5	9	4	7	13	6	7	6	1	5	3	-	3
206	Monocytleukem	M	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	6	2	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	1	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
208	Polycytemia vera	M	10	-	1	2	1	6	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3
		F	12	3	1	1	-	7	-	3	2	1	-	-	-	6	1	5
209	Myelofibros	M	17	2	5	1	4	4	1	2	-	2	4	1	3	4	1	3
		F	8	3	1	1	2	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																				Världsp	
		ant per																				Sv.bef. opulation	
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	2000	2009
140	- 209 Samtliga lägen	M	618,9	23,5	16,0	10,7	24,2	30,8	49,2	58,5	96,9	125,4	192,0	396,2	709,4	1 233,0	1 896,4	2 423,7	2 871,3	3 234,8	3 325,3	629,3	306,7
		F	584,4	16,9	13,0	12,6	19,9	34,8	67,2	109,2	179,4	268,6	451,6	598,8	757,2	1 081,3	1 440,7	1 741,5	1 831,2	1 985,0	1 911,7	523,4	294,3
140	Läpp	M	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,0	1,7	2,7	5,8	7,5	9,2	16,8	17,6	2,1	0,9
		F	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,0	1,0	0,7	5,1	6,6	5,3	6,3	5,9	1,2	0,6
1400	Överläpp	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	2,0	-	1,0	-	0,1	0,1
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	0,5	-	1,4	1,2	0,1	0,1
1401	Underläpp	M	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,0	1,7	2,0	4,8	4,5	7,8	12,8	16,5	1,7	0,7
		F	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,3	0,3	3,0	5,6	4,8	4,2	4,8	0,9	0,4
1408	Läpp, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409	Läpp, ospecificerat ställe	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	1,0	1,4	3,0	1,2	0,2	0,1
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	2,0	0,5	0,6	0,7	-	0,2	0,1
141	Tunga	M	3,2	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	1,2	3,5	6,1	5,2	9,5	11,7	8,0	8,5	4,9	4,7	3,0	1,9
		F	2,3	-	-	-	-	-	0,3	-	1,6	1,3	2,1	3,8	3,8	6,4	6,4	4,7	7,1	4,2	3,6	2,1	1,3
1410	Tunghäsen	M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,8	2,0	2,8	4,8	4,8	3,5	2,1	1,0	1,2	1,2	0,8
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	1,7	0,3	3,0	2,0	0,5	0,6	0,7	-	0,5	0,4
1417	Tunga	M	1,5	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	0,3	1,8	3,0	2,1	3,7	4,8	3,5	6,4	2,0	3,5	1,4	0,9
		F	1,5	-	-	-	-	0,3	-	1,3	0,9	1,5	1,7	2,8	2,7	4,1	3,8	5,9	1,4	3,0	1,4	0,8	0,8
1418	Tunga, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	Tunga, ospecificerat ställe	M	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,0	0,3	1,0	1,7	1,0	-	2,0	-	0,3	0,2
		F	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,7	0,7	0,3	0,5	0,6	2,1	0,6	0,2	0,1
142	Spottkörtel	M	1,4	-	0,4	-	-	-	0,3	-	0,6	1,5	0,3	1,3	1,4	2,7	5,5	3,0	3,6	4,9	11,8	1,4	0

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																				Världsp	
		ant per																				Sv.bef. opulation	
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen	
143	Munbotten	M	0,7	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	2,1	1,4	3,4	2,5	3,6	2,0	1,2	0,7	0,4
		F	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,7	2,0	2,0	0,5	1,8	1,4	0,6	0,4	0,3
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	2,0	-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	-	0,9	1,0	2,1	4,4	4,5	10,0	11,4	8,9	8,2	2,0	1,0
		F	2,1	-	-	-	0,4	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	2,1	3,1	2,4	5,4	4,7	4,8	9,7	14,3	1,8	0,9
145	Mellansvalget	M	3,4	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	3,5	6,7	11,8	12,9	10,6	7,0	5,7	-	3,5	3,2	2,1
		F	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	2,1	4,5	2,7	4,1	2,4	0,6	2,8	1,2	1,1	0,7
146	Näs-svalgrummet	M	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	1,5	0,7	0,7	1,4	0,7	1,5	0,7	2,0	-	0,5	0,3
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	0,3	0,7	0,3	0,9	-	0,7	-	0,2	0,2
147	Svalget bakom struphuvudet	M	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	3,1	3,1	3,5	3,6	5,9	4,7	0,9	0,4
		F	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,7	0,7	0,3	1,0	0,9	0,6	1,4	-	0,3	0,2
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,2	1,2	5,7	7,6	12,6	21,6	31,1	23,5	38,5	29,4	6,5	3,1
		F	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9	0,7	3,8	3,4	6,8	7,5	10,1	11,1	10,1	2,1	1,0
1500	Matstrupe specificerad del	M	5,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,2	1,2	5,7	5,9	10,5	18,2	26,6	19,9	30,6	27,0	5,6	2,7
		F	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	0,7	3,1	2,4	4,7	6,6	8,3	9,7	8,3	1,7	0,8
1508	Matstrupe, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	Matstrupe, ospecificerat	M	0,9	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	1,7	2,0	3,4	4,5	3,6	6,9	2,4	0,9	0,4
		F	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	1,0	2,0	0,9	1,8	1,4	1,8	0,4	0,2
151	Magsäck	M	9,2	-	-	-	-	-	0,3	-	0,9	1,2	2,6	7,8	8,6	18,7	26,7	29,6	44,8	51,3	75,2	9,6	4,3
		F	6,4	-	-	-	0,4	-	0,3	-	0,7	1,9	3,3	5,2	5,9	8,8	13,9	27,8	28,5	25,0	26,2	5,7	2,8
1510	Magsäck övriga delar	M	3,9	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,6	1,5	3,4	3,8	6,8	9,3	14,0	17,1	24,7	37,6	4,1	1,8
		F	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,4	2,4	1,7	4,4	6,8	13,6	13,1	11,1	14,3	2,7	1,3
1511	Övre magmunnen	M	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9	3,0	3,1	9,9	11,7	9,5	17,1	14,8	23,5	3,5	1,6
		F	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,7	3,4	3,7	5,6	3,0	2,8	4,8	1,0	0,5
1518	Magsäck, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	Magsäck, ospecificerat	M	1,8	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3	0,3	1,3	1,7	2,0	5,8	6,0	10,7	11,8	14,1	1,9	0,8
		F	2,1	-	-	-	0,4	-	0,3	-	0,7	0,3	0,9	1,7	2,4	1,0	3,4	8,5	12,5	11,1	7,1	1,9	0,9
152	Tunntarm	M	3,7	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	0,6	2,1	1,7	4,2	4,4	16,8	9,5	14,2	31,6	15,3	3,7	1,7
		F	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,9	1,0	5,2	3,0	6,4	9,4	13,7	6,3	4,8	2,1	1,0
1520	Tolvfingertarmen	M	0,8	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	1,4	6,2	2,0	3,6	2,0	3,5	0,8	0,4
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	1,4	0,3	1,4	2,4	4,2	0,7	2,4	0,6	0,3

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																				Världsp	
		ant per																				Sv.bef. opulation	
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen	
1527	Tunntarm övriga delar	M	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,7	0,7	1,0	2,7	3,5	4,3	5,9	4,7	0,9	0,4
		F	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3	0,3	2,1	0,3	2,7	3,8	3,6	2,1	1,8	0,7	0,4
1528	Tunntarm, flera lokalisationer	M	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	3,4	-	2,1	19,7	4,7	0,9	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1529	Tunntarm, ospecificerat ställe	M	1,1	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	0,9	0,7	2,4	2,0	4,5	4,0	4,3	3,9	2,4	1,1	0,6
		F	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,7	2,4	2,4	3,3	5,9	3,5	0,6	0,8	0,4	
153	Tjocktarm	M	43,9	-	-	0,4	1,7	2,1	1,6	2,0	2,5	11,7	12,9	21,9	43,2	73,8	116,9	181,0	252,4	281,3	259,8	45,8	20,4
		F	44,4	-	0,8	0,4	0,4	0,9	2,0	2,1	6,5	6,6	12,5	20,7	38,1	61,0	94,7	147,8	220,3	254,6	201,7	39,1	17,3
1530	Tjocktarm (caecum eller ascendens)	M	14,6	-	-	-	-	0,3	0,6	0,3	0,9	3,1	3,2	4,4	10,7	21,8	36,0	63,7	92,4	102,7	109,3	15,6	6,4
		F	18,7	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	1,9	2,4	7,6	12,2	21,6	39,9	62,6	102,1	121,1	94,0	16,3	6,6
1531	Tjocktarm (transversum eller flexur)	M	8,1	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,9	3,1	2,1	4,4	7,3	11,9	17,8	34,1	56,2	51,3	47,0	8,6	3,7
		F	8,5	-	-	-	-	0,3	0,3	-	1,6	0,6	2,1	2,1	4,9	9,4	13,5	33,4	51,1	50,1	44,0	7,5	3,0
1532	Tjocktarm (descendens)	M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,6	2,0	3,8	5,1	5,5	10,5	11,4	21,7	10,6	2,7	1,2
		F	1,9	-	-	-	-	-	-	0,7	1,3	-	1,5	1,0	0,7	1,3	4,4	8,0	6,5	11,1	7,1	1,7	0,8
1533	Tjocktarm (sigmoideum)	M	17,0	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,3	4,3	6,4	8,8	19,0	31,6	54,5	67,7	82,5	102,7	90,5	17,3	8,0
		F	13,1	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	2,5	6,1	6,6	16,8	23,9	30,8	41,9	57,0	68,2	50,0	11,5	5,4
1534	Blindtarm	M	1,1	-	-	0,4	1,7	1,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	2,4	2,1	2,4	1,7	2,5	2,1	3,0	-	1,1	0,9
		F	1,7	-	0,8	0,4	0,4	0,6	1,0	1,4	2,6	1,3	0,3	3,4	2,8	3,4	3,0	1,4	2,4	3,5	2,4	1,6	1,2
1538	Tjocktarm, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,6	-	-
1539	Tjocktarm, ospecificerat ställe	M	0,6	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	1,0	1,4	2,5	7,8	-	2,4	0,6	0,3
		F	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	1,3	3,0	0,5	1,2	0,7	3,6	0,4	0,2
154	Ändtarm och anus	M	26,4	-	-	-	-	0,3	0,6	1,7	2,5	8,3	8,2	22,3	29,4	50,7	77,5	107,3	142,2	139,2	121,1	27,1	12,8
		F	19,1	-	-	-	-	-	-	0,3	2,9	5,4	7,3	19,0	30,1	37,8	40,6	59,8	81,3	71,0	72,6	17,1	8,6
1540	Ändtarm	M	25,5	-	-	-	-	0,3	0,6	1,7	2,5	8,3	7,9	20,9	27,7	48,6	73,7	100,8	139,3	139,2	118,7	26,2	12,3
		F	17,3	-	-	-	-	-	-	0,3	2,6	5,0	7,3	14,8	25,5	32,7	36,9	54,1	76,6	66,1	67,8	15,4	7,6
1541	Anus	M	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,3	1,7	2,0	3,8	6,5	2,8	-	2,4	0,9	0,5
		F	1,8	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	4,1	3,8	5,1	3,7	5,6	4,8	4,9	4,8	1,7	0,9
1548	Ändtarm och anus, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Lever och gallvägar	M	11,0	0,3	-	-	0,3	0,3	1,3	0,3	1,3	2,8	2,9	9,1	17,6	27,9	30,5	46,1	55,4	45,4	30,6	11,0	5,7
		F	8,7	0,4	-	-	-	-	0,3	1,0	2,0	0,9	4,0	5,5	7,7	12,8	25,0	32,9	40,4	48,0	17,3	7,7	3,8

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																				Världsp	
		ant per																				Sv.bef. opulatio	
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen	
1550	Levercancer, primär	M	7,7	0,3	-	-	0,3	0,3	1,3	0,3	0,9	1,8	1,5	6,7	13,5	19,7	21,3	32,1	39,8	31,6	16,5	7,7	4,1
		F	3,9	0,4	-	-	-	-	0,3	1,0	1,0	0,6	2,4	2,4	5,9	6,1	10,8	14,1	14,3	21,6	6,5	3,5	1,9
1551	Gallblåsa	M	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	1,4	1,7	3,4	2,5	3,6	5,9	4,7	0,9	0,4
		F	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,0	0,7	2,4	9,1	10,4	11,9	15,3	1,8	2,0	0,9
1552	Gallvägar utanför levern	M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,3	1,3	1,4	2,7	2,7	8,0	8,5	3,0	3,5	1,3	0,7
		F	1,4	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,3	0,7	0,7	3,7	2,7	6,1	7,1	5,6	3,6	1,2	0,6
1553	Gallvägsmynningen	M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	0,3	1,0	2,7	2,1	1,5	-	1,0	2,4	0,5	0,3
		F	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	1,0	0,3	-	1,4	0,9	3,6	1,4	1,2	0,4	0,2
1558	Gallvägar, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-
1559	Gallvägar, ospecificerat ställe	M	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	1,0	2,0	3,6	3,9	3,5	0,5	0,2
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	1,0	1,4	3,6	3,5	4,2	0,5	0,2
156	Levercancer, ospecificerat	M	0,9	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,7	2,4	2,7	2,1	3,0	3,6	4,9	2,4	0,9	0,5
		F	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,0	1,3	2,4	2,8	5,3	2,8	0,6	0,7	0,4
157	Bukspottkörtel	M	11,0	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	2,5	4,1	9,4	10,4	25,9	39,1	42,6	54,7	59,2	29,4	10,9	5,4
		F	11,1	-	-	-	-	0,3	-	-	0,7	1,9	3,3	6,9	9,1	22,3	32,8	47,5	49,9	44,5	32,1	9,8	4,8
158	Bukhinna	M	0,2	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	-	-	0,7	1,5	0,7	1,0	-	0,2	0,1
		F	1,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,9	1,7	0,7	2,0	5,4	6,1	3,6	6,3	1,8	1,2	0,6
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,7	1,4	0,3	1,7	4,0	1,4	5,9	7,1	0,8	0,4
		F	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9	1,0	1,0	1,0	3,0	0,9	1,8	1,4	3,6	0,6	0,4
1600	Näsans insida och hålrum	M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	1,0	0,3	1,0	1,0	-	3,0	3,5	0,3	0,2
		F	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	0,3	0,7	2,0	0,9	1,2	1,4	2,4	0,4	0,2
1601	Örontrumpeten	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	0,6	0,1	-
1602	Överkäskshålan (sinus maxillaris)	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,5	1,4	1,0	2,4	0,2	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	0,6	-	0,6	0,1	-	-
1607	Bihåla övriga delar	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	0,3	-	-	1,0	-	2,0	-	0,2	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-	0,1	-
1608	Mellanöra, näshåla och bihålor, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	Mellanöra, näshåla och bihålor, ospecificerat ställe	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	-	-	1,2	0,1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																				Världsp		
		ant per																			Sv.bef. opulatio			
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen		
161	Struphuvud och stämband	M	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	4,8	4,8	11,7	13,0	14,2	13,8	15,3	2,9	1,3
		F	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,3	0,3	0,3	1,7	3,0	2,0	1,9	4,8	-	-	0,7	0,4
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	40,3	-	-	0,8	-	0,6	-	0,3	0,6	2,1	8,2	16,2	35,6	91,8	144,3	188,0	210,4	232,0	142,2	40,2	18,8	
		F	38,0	0,4	-	-	-	-	-	0,3	1,0	2,3	1,9	9,1	28,3	48,9	80,9	132,6	149,6	170,4	132,9	67,8	33,6	17,2
1620	Luftstrupe	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	0,7	1,0	-	0,1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1621	Lungcancer, primär inkl bronker	M	38,4	-	-	0,8	-	0,6	-	0,3	0,6	2,1	8,2	15,5	34,6	89,1	137,8	180,5	198,3	217,2	131,6	38,3	18,0	
		F	37,7	0,4	-	-	-	-	-	0,3	1,0	2,0	1,9	9,1	27,9	48,9	80,9	132,3	148,2	169,2	130,8	66,0	33,4	17,1
1622	Lungsäck (pleura)	M	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	2,7	6,2	7,5	11,4	13,8	10,6	1,8	0,7
		F	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	1,4	1,2	2,1	1,8	0,3	0,1
163	Lungcancer, ospecificerad	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	0,3	0,7	0,5	0,7	-	1,2	0,2	0,1	
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	0,6	-	0,6	0,1	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	0,1	-	-	0,4	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	1,0	-	0,1	0,1	
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
170	Bröst	M	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,7	1,0	1,4	2,4	2,5	3,6	5,9	8,2	0,9	0,4	
		F	177,9	-	-	-	0,4	0,9	9,9	25,4	57,3	123,0	228,4	259,9	285,8	399,3	485,9	521,8	339,0	394,5	374,2	160,9	99,6	
1701	Höger bröst	M	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,3	1,4	1,0	1,0	1,4	3,0	5,9	0,5	0,2
		F	73,1	-	-	-	-	0,3	3,1	11,8	23,6	49,5	90,6	116,9	107,6	173,4	191,2	215,5	133,6	163,5	163,0	66,1	40,9	
1702	Vänster bröst	M	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,7	-	1,4	1,0	2,1	3,0	2,4	0,4	0,2	
		F	76,9	-	-	-	0,4	0,6	4,1	8,0	21,3	52,0	84,2	98,6	128,9	171,0	218,6	229,2	167,4	178,1	174,9	69,1	41,8	
1707	Höger bröst, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	13,3	-	-	-	-	-	-	2,7	1,4	4,6	9,8	26,8	19,7	19,2	28,7	39,2	34,8	22,6	24,4	18,4	12,1	8,0
1708	Vänster bröst, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	
		F	14,3	-	-	-	-	-	-	-	4,2	7,9	11,7	26,8	24,5	29,7	26,0	36,9	40,5	15,4	27,8	16,1	13,3	8,8
1709	Bröst, sidangivelse saknas	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	1,9	-	0,7	1,8	0,2	0,1
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	10,1	-	0,4	-	-	3,4	10,6	18,1	23,2	20,2	13,4	8,6	10,5	11,1	9,1	13,6	10,7	16,0	14,9	10,0	7,8	
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	28,5	-	-	-	-	-	-	1,0	2,0	3,5	11,9	23,4	42,3	67,8	90,7	107,3	100,3	88,4	72,0	25,1	13,3	
173	Moderkaka (placenta)	F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	2,0	-	-	-	-	0,3	0,7	0,3	-	0,6	3,0	2,8	4,5	3,4	4,4	2,8	8,9	7,7	1,8	1,9	1,1	
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	14,5	-	-	0,4	1,1	2,8	1,4	2,8	2,3	5,4	12,2	21,7	25,2	36,1	41,6	42,3	40,4	36,9	17,3	13,3	8,1	
1750		F	13,4	-	-	0,4	1,1	2,8	1,4	2,8	2,3	5,0	11,6	20,3	23,4	32,0	38,2	37,6	36,8	35,5	16,1	12,3	7,5	
1751	Äggledare och breda livmoderbanden	F	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	1,4	1,7	4,0	3,4	4,7	3,6	1,4	1,2	1,0	0,6	

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																				Världsp	
		ant per																				Sv.bef. opulatio	
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen	
1758	Äggledare och breda livmoderbanden, flera lokalisationer	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1759	Äggledare och breda livmoderbanden, ospecificerat ställe	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
176	Kvinnligt könsorgan	F	4,4	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,6	2,4	2,1	4,2	4,0	6,4	15,5	14,3	25,0	32,7	3,7	1,6
1760	Vulva	F	2,5	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	1,2	1,0	2,1	2,0	2,4	9,4	8,3	16,0	19,6	2,1	0,9
1761	Vagina	F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	-	0,3	0,7	1,4	2,4	1,8	4,2	3,6	0,5	0,2
1767	Kvinnligt könsorgan, annan specificerad del	F	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	0,7	1,4	1,0	2,0	2,8	3,6	4,2	4,2	0,8	0,4
1768	Kvinnligt könsorgan, flera lokalisationer	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	Kvinnligt könsorgan, ospecificerat ställe	F	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,7	0,9	0,6	0,7	5,4	0,3	0,1
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	189,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	22,0	109,9	263,6	490,1	762,9	860,2	805,4	755,1	625,3	183,9	92,2
178	Testikel	M	7,3	1,4	0,7	-	5,0	11,0	18,5	17,6	20,9	12,3	11,7	4,4	1,4	1,7	1,0	3,0	-	-	1,2	7,3	7,2
179	Manligt könsorgan	M	1,9	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	1,2	2,0	1,7	4,1	6,9	8,5	7,8	8,9	7,1	1,9	1,0
1790	Penis	M	1,8	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,9	2,0	1,7	3,7	6,9	7,5	7,8	8,9	7,1	1,8	0,9
1791	Pungen (scrotum)	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	1,0	-	-	-	0,1	-
1797	Manligt könsorgan, annan specificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
1798	Manligt könsorgan, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1799	Manligt könsorgan, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Njure och njurbäcken	M	15,2	1,4	0,7	-	0,3	-	-	1,3	2,8	5,5	7,0	12,1	20,8	31,6	49,0	65,7	83,9	62,2	18,8	15,1	8,0
		F	9,5	2,5	0,8	-	-	-	-	0,3	1,3	3,5	5,2	8,3	13,6	19,9	18,3	39,1	45,7	32,7	17,3	8,7	4,8
1801	Njurbäcken	M	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	2,8	1,4	6,5	5,5	9,2	10,9	7,1	1,6	0,7
		F	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	1,0	3,0	0,3	4,2	5,9	8,3	5,9	1,0	0,4
1809	Njure, ospecificerat ställe inkl njurvävnaden	M	4,2	-	-	-	0,3	-	-	0,7	0,6	1,5	1,8	2,4	6,6	8,5	12,3	19,5	24,9	18,8	4,7	4,2	2,2
		F	2,3	0,4	-	-	-	-	-	-	0,3	-	2,7	2,4	3,5	4,0	4,4	8,9	14,8	2,8	4,2	2,1	1,1
181	Urinvägar utom njure	M	39,1	-	-	-	-	0,3	2,3	1,0	2,8	4,3	8,2	21,2	34,2	58,8	102,2	182,5	215,4	256,7	275,0	41,1	17,5
		F	13,2	-	-	-	-	0,3	-	-	1,0	1,3	4,0	10,0	10,1	21,2	32,8	42,8	64,1	58,4	63,7	11,5	5,2
1810	Urinblåsa	M	37,7	-	-	-	-	0,3	2,3	1,0	2,8	3,1	7,9	20,9	32,5	57,5	98,7	178,5	206,2	245,8	265,6	39,7	16,9
		F	12,5	-	-	-	-	0,3	-	-	1,0	1,3	3,6	9,3	10,1	20,9	31,5	39,5	60,6	55,7	59,5	10,9	5,0

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

			Ålder																			Världsp	
			ant per																			Sv.bef. opulation	
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen	
1811	Urinledare	M	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	1,7	1,0	2,4	2,5	7,1	8,9	3,5	1,0	0,4
		F	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	-	0,3	1,0	2,4	2,4	1,4	4,2	0,5	0,2
1812	Urinröret	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,7	1,0	0,7	-	2,4	0,2	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	-	0,1	-
1816	Urachus	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1817	Urinvägar, annan specificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1818	Urinvägar, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1819	Urinvägar, ospecificerat ställe	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	0,5	1,4	2,0	3,5	0,3	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9	-	-	-	0,1	-
190	Malignt melanom i huden	M	36,0	-	-	0,8	0,3	3,3	3,9	9,3	18,0	20,2	26,1	33,4	51,9	73,8	92,9	107,8	137,2	162,9	156,3	36,4	19,7
		F	34,8	-	0,4	-	2,8	5,6	15,0	19,1	27,5	35,0	40,8	43,8	46,5	59,4	71,4	67,3	81,9	77,2	98,2	32,2	20,9
1901	Melanom på ögonlock, i ögonvinkel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-
1902	Melanom på öra, i yttre hörselgång	M	0,8	-	-	-	-	-	-	0,7	0,3	0,6	-	0,7	1,0	1,0	1,7	3,0	3,6	2,0	7,1	0,8	0,4
		F	0,4	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3	0,7	1,0	1,4	0,9	0,6	0,7	-	0,3	0,2
1903	Melanom, annan specificerad del i ansiktet	M	2,6	-	-	-	-	-	0,6	-	0,6	0,3	0,9	1,3	2,1	2,4	7,9	7,5	14,2	16,8	25,9	2,7	1,1
		F	2,7	-	-	-	-	-	0,7	1,0	1,0	1,6	0,3	0,3	1,0	2,7	2,7	8,0	11,9	9,0	28,0	2,3	1,0
1904	Melanom i hårbotten och på halsen	M	1,9	-	-	-	-	0,3	0,6	0,7	0,6	0,6	0,9	1,0	3,5	2,7	7,5	5,0	4,3	10,9	10,6	1,9	1,0
		F	1,1	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	1,5	0,3	1,7	1,7	2,4	2,4	5,3	2,1	5,4	1,0	0,6
1905	Melanom på bålen och pungen	M	19,0	-	-	0,4	0,3	2,4	1,6	3,7	8,9	10,4	16,7	18,2	31,8	39,8	51,1	54,6	67,5	80,0	68,2	19,0	10,6
		F	11,1	-	-	-	0,7	3,4	6,1	8,7	11,5	16,1	16,4	16,9	15,4	20,2	21,7	15,5	19,6	17,4	14,9	10,6	7,6
1906	Melanom på övre extremitet och axill	M	7,5	-	-	0,4	-	0,3	0,6	2,3	4,1	5,2	3,5	7,4	7,6	17,7	17,1	28,6	33,4	33,6	24,7	7,7	4,1
		F	8,3	-	0,4	-	1,4	0,6	3,4	3,5	4,6	5,7	7,3	9,0	7,0	15,5	21,0	20,2	20,2	24,4	28,0	7,5	4,6
1907	Melanom på nedre extremitet och lumske	M	4,0	-	-	-	-	0,3	0,3	2,0	3,2	3,1	4,1	4,7	5,5	9,9	6,9	7,5	14,2	19,7	15,3	4,1	2,3
		F	11,0	-	-	-	0,7	1,6	4,1	5,9	9,2	10,4	15,2	16,2	20,3	17,9	22,3	20,2	24,3	21,6	22,0	10,3	6,8

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																				Världsp	
		ant per																				Sv.bef. opulatio	
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen	
1908	Melanom i huden, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	
1909	Melanom i huden, ospecificerat ställe	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	0,3	0,3	1,5	-	-	4,7	0,2	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	0,1	0,1
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	69,4	-	-	-	0,3	-	0,3	1,0	1,9	3,7	3,8	13,5	28,7	56,5	117,6	201,5	410,2	653,5	1 157,8	79,2	25,5
		F	50,8	-	-	0,4	0,7	0,6	-	1,7	2,9	7,9	10,3	17,9	27,3	47,6	71,7	120,0	188,8	295,0	515,3	41,9	15,9
1911	Hudtumör på ögonlock, i ögonvinkel	M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	-	3,0	1,4	1,0	1,2	0,3	0,1
		F	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,0	1,9	1,2	1,4	5,4	0,4	0,1
1912	Hudtumör på öra, i yttre hörselgång	M	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	1,0	2,1	5,1	13,0	28,1	71,8	121,4	191,6	12,6	3,6
		F	1,1	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	0,3	1,0	1,3	2,0	2,8	2,4	6,3	9,5	0,9	0,4
1913	Hudtumör, annan specificerad del i ansiktet	M	24,6	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,9	1,5	5,1	10,0	16,7	38,7	75,7	145,7	237,9	418,4	28,3	8,9
		F	23,6	-	-	-	0,7	0,3	-	0,7	0,7	0,6	2,1	3,4	7,3	16,2	22,0	48,9	84,3	156,5	295,1	18,9	6,2
1914	Hudtumör i hårbotten och på halsen	M	11,4	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	0,6	1,3	4,8	7,8	14,1	27,6	68,2	118,5	217,5	13,3	4,0
		F	2,7	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	1,2	-	1,0	1,0	3,0	5,2	7,1	16,7	35,7	2,1	0,7
1915	Hudtumör på bålen och pungen	M	8,0	-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	1,5	0,3	3,0	5,2	5,4	17,1	23,1	43,4	65,1	129,3	9,0	3,1
		F	6,2	-	-	-	-	0,3	-	-	1,0	2,2	1,8	4,8	5,9	9,1	13,2	20,7	23,2	28,5	35,7	5,4	2,5
1916	Hudtumör på övre extremitet och axill	M	9,0	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	1,2	2,4	3,5	13,6	20,2	23,1	54,7	60,2	141,1	10,0	3,6
		F	7,3	-	-	0,4	-	-	-	-	0,3	0,9	2,7	2,8	8,0	8,8	10,5	15,1	26,1	41,0	66,0	6,1	2,5
1917	Hudtumör på nedre extremitet och ljumske	M	4,0	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	-	-	0,7	3,1	5,8	10,6	16,0	20,6	34,5	40,0	4,3	1,7
		F	8,3	-	-	-	-	-	-	-	0,7	3,5	2,1	4,8	3,1	9,8	18,3	21,6	41,0	41,7	57,7	7,1	3,0
1918	Tumör i huden, flera lokalisationer	M	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	4,5	2,8	9,9	14,1	1,0	0,3
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,3	0,7	0,7	2,8	2,4	1,4	6,5	0,6
1919	Tumör i huden, ospecificerat ställe	M	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	2,4	0,5	1,4	4,9	4,7	0,5	0,2
		F	0,4	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	0,7	0,3	-	1,0	0,9	1,2	1,4	3,6	0,4	0,2
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	1,6	2,0	1,5	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,9	1,2	2,0	2,4	3,1	3,8	5,0	5,0	4,9	1,2	1,6	1,2
		F	1,3	1,1	-	0,4	-	-	0,3	-	-	0,9	0,9	1,7	2,1	3,0	2,4	6,6	2,4	4,2	1,2	1,2	0,9

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																				Världsp	
				ant per																		Sv.bef. opulatio	
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen	
1920	Öga	M	1,5	1,7	0,7	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,6	0,9	2,0	2,4	3,1	3,8	5,0	4,3	4,9	1,2	1,4	1,0
		F	1,1	0,4	-	-	-	-	0,3	-	-	0,9	0,6	1,7	1,7	2,7	2,4	5,6	1,8	2,8	1,2	1,0	0,6
1921	Synerg	M	0,1	0,3	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
		F	-	0,4	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
1922	Ögonhåla	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	0,7	-	0,1	-
1923	Ögats bindehinna	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	0,7	-	-	0,1	-
		F	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,6	0,7	-	0,1	0,1
1927	Öga, annan specificerad lokalisation	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	Öga, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	Öga, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	12,5	8,5	5,4	3,6	3,7	3,9	5,2	5,0	9,8	9,5	10,8	18,5	19,7	19,4	27,4	31,6	35,5	16,8	12,9	12,4	9,5
		F	14,5	3,6	3,8	5,5	3,2	2,8	3,8	4,9	8,2	10,7	19,8	23,1	22,7	24,6	39,2	30,6	32,7	25,7	8,9	13,8	10,1
1930	Hjärna, hjärnnerv och hjärnhinna	M	10,9	6,5	5,4	3,2	3,0	3,3	4,9	3,3	7,9	7,7	9,4	16,2	16,9	17,0	25,4	28,1	32,7	13,8	11,8	10,8	8,2
		F	12,4	3,2	3,4	4,6	2,5	2,8	3,4	4,2	7,5	8,8	17,0	20,3	18,9	20,6	34,5	25,4	27,9	20,9	7,1	11,8	8,7
1931	Ryggmärg, ryggmärgshinna	M	1,0	0,3	-	0,4	0,3	0,6	0,3	1,3	1,9	0,6	1,2	1,3	2,1	1,4	1,4	2,0	2,1	2,0	-	1,0	0,8
		F	1,4	-	0,4	0,8	0,4	-	0,3	0,3	0,3	0,9	2,1	1,4	2,1	1,3	4,4	4,2	3,6	3,5	1,2	1,3	0,9
1933	Perifera nerver	M	0,2	1,4	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	1,2	0,2	0,2
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	1,4	-	0,1	-
1938	Perifera nerver, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	Perifera nerver, ospecificerat ställe	M	0,4	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-	1,2	-	0,7	0,3	1,0	0,7	1,5	0,7	1,0	-	0,4	0,3
		F	0,6	0,4	-	-	0,4	-	-	-	0,3	0,9	0,6	1,4	1,7	2,7	0,3	0,5	1,2	-	0,6	0,6	0,5
194	Sköldkörtel	M	3,2	-	-	0,4	0,3	0,3	1,6	3,7	4,1	3,1	4,4	4,0	2,8	3,4	7,5	9,0	7,1	10,9	7,1	3,3	2,1
		F	7,5	-	0,4	-	0,7	2,8	8,5	10,1	11,1	6,9	8,8	7,9	10,8	10,1	14,9	7,1	15,4	15,3	8,3	7,2	5,3
195	Endokrin körtel	M	6,6	0,3	0,4	0,4	2,0	0,6	1,3	3,7	3,2	6,4	7,6	11,8	12,5	13,6	16,8	18,0	14,9	11,8	3,5	6,5	4,4
		F	13,2	1,4	-	-	1,4	3,4	2,4	5,9	7,5	9,8	13,1	20,7	28,7	30,7	29,4	40,9	24,9	21,6	5,4	12,4	8,4
1950	Binjure	M	0,5	0,3	-	-	0,3	-	0,3	0,3	0,6	0,6	1,5	0,3	0,7	1,0	-	2,0	2,1	-	-	0,5	0,4
		F	0,9	1,4	-	-	-	0,3	-	0,3	1,6	0,9	0,6	2,1	1,0	1,0	2,0	3,3	0,6	-	0,6	0,9	0,7

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

			Ålder																			Världsp	
			ant per																			Sv.bef. opulation	
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen	
1951	Bisköldkörtel	M	2,8	-	-	0,4	0,7	0,3	-	0,3	1,3	2,8	1,5	5,7	5,2	6,1	9,3	7,5	7,8	6,9	2,4	2,8	1,8
		F	9,4	-	-	-	1,1	1,6	1,0	2,4	2,3	6,0	11,3	16,2	21,3	23,6	21,7	31,1	19,6	13,9	3,6	8,8	5,8
1952	Brässen (thymus)	M	0,3	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,9	-	0,3	0,7	1,0	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,2
		F	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	1,0	1,3	0,3	1,9	1,8	2,8	-	0,4	0,2
1953	Hypofys	M	2,5	-	-	-	1,0	0,3	0,3	2,3	1,3	1,8	4,1	4,7	4,2	4,4	5,8	7,5	5,0	4,9	-	2,5	1,7
		F	2,1	-	-	-	0,4	1,2	1,0	3,1	2,9	2,5	0,9	2,4	4,2	4,0	4,4	3,8	3,0	4,9	0,6	2,1	1,5
1955	Endokrin körtelvävnad i bukspottkörtel	M	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	1,4	0,7	0,3	-	-	-	1,2	0,2	0,2
		F	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	0,3	-	0,7	0,7	0,7	0,9	-	-	0,6	0,2	0,2
1957	Annan specificerad endokrin körtelvävnad	M	0,1	-	0,4	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,5	-	-	-	0,1	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	-	-	-	0,1	-
1958	Endokrin körtelvävnad, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	Endokrin körtelvävnad, ospecificerad körtel eller lokalisation	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	Skelettet	M	0,6	-	1,1	0,8	1,7	-	0,6	0,3	0,3	-	-	-	0,3	0,3	2,1	1,0	1,4	1,0	1,2	0,6	0,6
		F	1,1	-	0,8	1,7	0,4	0,3	1,0	1,0	1,0	0,3	0,6	1,0	0,3	1,0	5,4	0,9	0,6	2,1	1,2	1,0	0,9
1960	Skalle, ansiktets ben och överkäksben	M	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,6	0,1	0,1
1961	Underkäksben	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	-	-	-	-
1962	Ryggrad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1963	Revben, bröstben och nyckelben	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	0,1	-
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,1	0,1
1964	Överarmsben och skulderblad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	0,1	-	-	0,4	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	-	-	-	0,1	0,1
1965	Handlovsben, mellanhandsben och fingerben	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

			Ålder																			Världsp Sv.bef. opulatio nen	
ICD-7	Läge	Kön	ant per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000		
1966	Höftben, korsben och svansben	M	0,1	-	0,4	-	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	-	-	-	0,1	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	-	-	-	0,1	0,1
1967	Nedre extremitetens långa ben	M	0,2	-	0,4	0,8	1,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,0	-	0,3	0,3
		F	0,6	-	0,8	1,3	0,4	0,3	-	-	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,7	4,1	-	-	1,4	-	0,5	0,5
1968	Nedre extremitetens korta ben	M	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969	Skelett, flera lokalisationer eller ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	3,4	0,7	0,4	1,2	1,3	0,6	0,6	1,7	2,5	1,5	2,9	4,7	3,5	7,1	8,2	6,5	10,7	7,9	15,3	3,4	2,2
		F	3,1	0,7	0,8	0,8	0,7	0,9	1,4	1,7	1,3	2,5	2,7	2,1	2,1	4,0	7,1	8,5	7,1	9,7	11,9	2,8	1,9
1970	Huvud inkl ansikte och hals	M	0,4	-	0,4	0,4	-	-	-	-	0,3	-	-	0,7	-	0,7	1,4	0,5	0,7	3,9	3,5	0,4	0,2
		F	0,2	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,2	2,1	1,2	0,2	0,1
1971	Bål och rygg	M	0,1	-	-	-	0,7	0,3	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,3	-	0,3	-	0,7	-	-	0,7	0,6	0,2
1972	Övre extremitet och skuldra	M	0,4	-	-	0,4	-	0,3	0,3	-	0,3	-	0,3	0,7	0,3	1,0	1,4	1,0	1,4	-	2,4	0,4	0,3
		F	0,3	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	0,3	0,3	0,3	0,5	1,8	-	0,6	0,3	0,2
1973	Nedre extremitet, höft och säte	M	1,2	-	-	-	0,7	-	0,3	1,0	0,9	0,6	1,8	1,0	0,7	3,4	3,8	2,0	3,6	1,0	5,9	1,2	0,8
		F	1,1	-	0,4	-	0,4	0,3	0,3	0,3	0,7	0,9	0,9	-	0,7	1,3	2,0	2,4	3,0	4,2	6,5	0,9	0,6
1974	Retroperitoneala rummet	M	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,3	0,3	0,3	2,0	0,7	1,0	-	0,2	0,2
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,7	0,3	-	-	1,4	0,6	0,2	0,1
1975	Hjärta	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	-	-	-	-	-
1977	Bindväv, annan mjuk vävnad, annan specificerad lokalisering	M	0,8	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	0,9	0,3	1,3	1,7	1,7	1,0	1,0	4,3	1,0	3,5	0,8	0,5
		F	0,8	0,4	-	0,4	0,4	0,3	1,0	1,0	0,3	0,6	0,6	-	0,3	1,3	2,7	2,8	1,2	0,7	1,8	0,8	0,6
1978	Bindväv och annan mjuk vävnad, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	1,0	-	0,1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
1979	Bindväv och annan mjuk vävnad, ospecificerat ställe	M	0,1	0,3	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	0,1	0,1
		F	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,6	0,6	1,0	-	0,3	0,3	1,9	-	0,7	0,6	0,3	0,2
199	Övriga och ospecificerade lokaliseringar	M	11,7	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	1,9	3,1	3,8	7,4	14,5	23,5	32,6	46,1	56,2	67,1	64,6	12,0	5,6
		F	14,7	0,4	-	0,8	-	-	0,3	-	1,6	3,2	4,0	11,7	14,7	20,6	30,8	44,2	74,2	75,1	69,6	13,1	5,9

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																				Världsp		
		ant per																				Sv.bef. opulation		
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen		
1991	Ospecificerat ställe i huvud, ansikte och hals	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	-	0,7	1,0	-	0,1	-
		F	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	0,7	-	0,1	0,1
1992	Ospecificerat ställe i bröstet (thorax)	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	2,4	0,1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,7	-	-	-
1993	Ospecificerat ställe i buken och matsmältningskanalen	M	0,9	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	0,3	-	0,3	2,7	2,1	3,0	4,3	4,9	7,1	0,9	0,4	
		F	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	2,1	4,5	4,7	9,5	13,6	22,0	18,1	19,0	3,5	1,5	
1994	Ospecificerat ställe i lilla bäckenet	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,5	-	1,0	-	0,1	-	
		F	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3	0,7	-	0,3	1,4	1,2	2,8	-	0,3	0,1
1995	Ospecificerat ställe i extremiteterna	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	
1999	Ospecificerad lokalisation	M	10,6	-	-	-	0,3	-	-	0,3	1,9	2,8	3,5	7,4	14,2	20,1	29,5	42,1	51,2	60,2	55,2	10,8	5,1	
		F	10,4	-	-	0,8	-	-	-	-	1,6	2,5	3,3	9,3	9,4	15,2	21,0	28,7	51,1	52,9	50,6	9,2	4,2	
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	19,5	0,7	2,2	-	1,3	1,2	2,3	2,7	4,1	7,1	10,0	13,2	28,0	33,3	51,4	66,7	98,1	111,5	84,6	20,1	10,1	
		F	15,1	-	0,8	0,4	1,4	0,9	1,7	2,4	3,3	3,8	7,9	14,1	13,6	25,6	35,5	48,5	64,1	60,5	55,9	13,5	7,0	
2001	Malignt lymfom av non-Hodgkintyp, lymfocytärt	M	18,4	0,7	2,2	-	1,3	1,2	2,3	2,7	4,1	7,1	9,7	11,5	25,9	32,3	47,7	62,7	91,7	106,6	78,8	18,9	9,5	
		F	14,4	-	0,8	0,4	1,4	0,9	1,7	2,4	2,9	3,8	7,6	12,8	13,3	23,9	34,2	44,7	63,5	56,4	53,0	12,9	6,7	
2002	Malignt lymfom utan närmare specifikation	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3	1,0	-	1,0	-	0,2	0,1	
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7	0,3	0,5	-	1,4	1,2	0,2	0,1	
2003	Malignt lymfom av non-Hodgkintyp, Waldenströms sjukdom	M	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,7	0,7	3,4	3,0	6,4	3,9	5,9	1,0	0,4
		F	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,7	0,3	1,0	1,0	3,3	0,6	2,8	1,8	0,5	0,3	
201	Hodgkins sjukdom	M	2,4	-	-	0,4	2,4	3,3	2,3	2,7	4,1	2,5	2,3	3,4	1,7	4,1	2,1	3,0	5,0	2,0	3,5	2,4	2,0	
		F	2,2	-	0,4	0,4	3,6	5,0	2,0	3,8	2,9	1,6	2,7	1,0	2,1	1,0	1,0	3,8	4,2	3,5	1,2	2,2	2,0	
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	2,3	1,0	-	0,4	-	0,3	0,6	-	0,3	1,8	2,3	2,0	3,1	6,5	7,2	5,0	9,2	6,9	3,5	2,2	1,4	
		F	1,0	0,4	1,1	-	-	-	0,3	0,3	0,7	-	0,6	1,0	0,3	1,7	2,0	4,2	3,0	2,8	4,2	1,0	0,6	

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																				Världsp	
		ant per																				Sv.bef. opulatio	
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen	
2021	Tumör i lymfatisk vävnad, ospecificerad	M	1,3	1,0	-	0,4	-	0,3	0,6	-	-	-	1,5	1,0	1,0	3,4	4,1	3,0	5,7	3,0	3,5	1,2	0,8
		F	0,8	0,4	1,1	-	-	-	0,3	0,3	0,7	-	0,3	0,7	-	1,3	1,4	3,3	2,4	2,1	2,4	0,7	0,5
2022	Tumör i lymfatisk vävnad, mycosis fungoides	M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,7	0,7	1,0	-	2,8	3,0	-	0,3	0,1
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,9	0,6	-	1,2	0,2	0,1
2024	Härcellsleukemi	M	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,5	0,9	1,0	1,4	2,4	2,1	2,0	0,7	1,0	-	0,7	0,5
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	-	-
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	7,5	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	3,5	5,1	9,0	17,0	21,6	28,1	38,4	47,4	37,6	7,7	3,6
		F	5,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,3	2,1	3,8	7,0	11,8	14,2	16,0	18,4	29,2	27,4	4,9	2,4
204	Lymfatisk leukemi	M	7,0	5,8	2,9	1,2	1,0	0,9	0,6	0,7	2,2	1,5	2,1	2,4	6,9	14,6	19,9	28,6	27,7	30,6	22,3	6,9	4,4
		F	4,7	5,4	1,9	0,8	1,8	0,3	0,7	0,3	-	0,6	1,5	2,8	3,8	6,4	11,2	14,1	14,8	29,2	11,9	4,2	2,8
2040	Akut lymfatisk leukemi	M	1,1	5,8	2,9	0,8	0,7	0,6	0,6	-	2,2	0,6	-	-	-	0,7	1,0	1,0	0,7	1,0	-	1,0	1,5
		F	1,1	5,4	1,9	0,8	1,8	0,3	0,7	0,3	-	0,6	0,9	-	1,7	1,3	1,4	0,9	0,6	0,7	-	1,1	1,5
2041	Kronisk lymfatisk leukemi	M	5,4	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	0,9	1,8	2,0	6,6	12,2	17,1	25,6	26,3	28,6	22,3	5,4	2,6
		F	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,8	2,1	4,7	8,8	12,7	13,7	27,1	11,3	3,0	1,3
2049	Lymfatisk leukemi, ospecificerad	M	0,4	-	-	0,4	-	-	-	0,7	-	-	-	-	0,3	0,7	1,7	2,0	0,7	1,0	-	0,3	0,2
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	0,5	0,6	-	0,6	0,1	0,1
205	Myeloisk leukemi	M	5,7	1,0	0,4	-	1,3	1,2	2,3	0,7	2,5	2,1	5,6	6,4	4,5	7,8	12,0	22,1	18,5	34,5	25,9	5,9	3,3
		F	4,5	0,4	0,4	0,4	0,4	2,5	1,7	1,7	3,3	2,2	2,7	2,8	4,2	5,4	11,5	12,7	7,7	22,3	14,9	4,0	2,5
2050	Akut myeloisk leukemi	M	3,2	1,0	-	-	1,0	0,9	1,0	0,3	1,6	0,9	2,3	3,0	3,5	3,7	7,2	11,5	14,9	16,8	15,3	3,4	1,9
		F	2,7	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6	0,7	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	3,5	3,0	7,8	6,1	7,1	15,3	9,5	2,4	1,4
2051	Kronisk myeloisk leukemi	M	1,3	-	0,4	-	0,3	0,3	1,0	0,3	0,9	1,2	1,5	1,7	0,7	2,4	2,7	5,5	0,7	3,0	4,7	1,2	0,9
		F	0,8	-	-	-	-	0,6	0,7	0,3	1,0	1,3	1,2	1,0	0,3	1,3	1,4	2,8	-	2,1	1,2	0,8	0,6
2059	Myeloisk leukemi, ospecificerad	M	1,2	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	1,8	1,7	0,3	1,7	2,1	5,0	2,8	14,8	5,9	1,3	0,6
		F	0,9	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	1,3	-	0,6	0,7	0,3	1,0	2,4	3,8	0,6	4,9	4,2	0,8	0,5
206	Monocytleukem	M	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	0,3	-	-	1,0	2,0	-	3,0	-	0,3	0,1
		F	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-	0,9	0,6	1,4	0,6	0,2
2060	Akut monocytleukemi	M	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	0,3	-	-	1,0	2,0	-	3,0	-	0,3	0,1
		F	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-	0,9	0,6	1,4	0,6	0,2
2061	Kronisk monocyleukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	Monocytleukemi, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																				Världsp	
		ant per																				Sv.bef. opulation	
ICD-7	Läge	Kön	100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	nen	
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	0,9	0,3	-	-	-	-	0,3	-	0,6	0,9	0,9	0,7	1,4	0,7	0,7	5,5	2,8	5,9	3,5	1,0	0,5
		F	1,2	-	0,4	-	-	-	0,3	0,7	0,3	0,3	1,2	2,1	1,4	1,7	1,4	3,3	4,2	4,2	3,6	1,1	0,6
2070	Akut leukemi, ospecificerad	M	0,2	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	0,3	-	-	-	2,0	-	3,0	-	0,2	0,1
		F	0,1	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	0,7	1,2	0,1	0,1
2071	Kronisk leukemi, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
2072	Akut erythrocytleukemi	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,5	-	-	1,2	0,1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2073	Megakaryocytleukemi	M	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
2079	Leukemi, ospecificerad	M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3	0,9	0,3	1,0	0,7	0,7	3,0	2,8	3,0	2,4	0,6	0,3
		F	1,0	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,3	-	1,2	2,1	1,0	1,0	1,4	3,3	4,2	3,5	2,4	0,9	0,5
208	Polycythemia vera	M	1,7	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	0,3	0,9	1,3	4,2	4,8	4,5	7,5	4,3	7,9	3,5	1,7	0,9
		F	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9	1,0	1,7	5,4	3,7	5,2	7,1	7,0	3,6	1,4	0,8
209	Myelofibros	M	1,7	-	-	-	0,3	0,3	0,6	-	0,9	0,3	0,6	1,7	0,3	3,4	6,9	5,5	8,5	8,9	4,7	1,7	0,9
		F	1,3	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	0,3	0,3	1,0	4,0	3,0	5,2	3,0	5,6	6,5	1,1	0,6

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 5 : Antal nya fall per 100 000 personer, åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000 efter läge, kön och län

Table 5 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex and year of county

Län	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Län																						
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25
140 -	209 Samtliga lägen	M	629,3	647,5	617,9	558,8	689,1	633,5	736,6	638,7	535,7	683,9	682,0	821,7	635,1	601,8	561,0	637,6	551,7	534,1	475,5	641,0	583,9	421,2
		F	523,4	533,2	509,7	463,4	547,4	527,4	589,6	524,9	458,3	531,0	571,3	632,8	568,7	480,1	489,8	503,2	486,5	448,4	383,3	408,6	447,4	387,6
140	Läpp	M	2,1	2,5	1,7	0,4	1,6	1,4	4,1	1,3	5,3	1,3	1,9	2,6	2,2	1,6	3,7	1,4	1,1	3,0	1,0	4,1	2,7	2,2
		F	1,2	1,6	0,6	0,4	0,9	0,5	1,4	0,5	7,1	3,0	1,0	3,5	1,7	0,9	0,4	2,3	-	0,5	-	1,0	0,8	-
141	Tunga	M	3,0	3,6	4,0	2,7	1,4	5,1	3,4	3,8	3,1	-	2,9	2,8	2,8	3,6	5,3	0,6	2,5	1,1	0,8	6,6	4,2	2,0
		F	2,1	3,2	0,4	2,4	2,6	1,5	1,8	0,8	10,2	-	1,7	1,7	2,3	-	1,9	3,0	1,9	1,1	1,0	-	6,1	1,5
142	Spottkörtel	M	1,3	1,3	2,1	2,7	1,5	-	1,1	0,6	6,0	-	1,8	1,2	1,3	3,9	2,7	1,9	1,5	0,5	1,3	0,9	-	-
		F	0,9	1,3	1,2	0,4	1,6	1,4	-	-	-	-	0,9	1,3	0,6	2,0	1,5	0,8	2,2	1,1	1,6	-	0,7	1,3
143	Munbotten	M	0,6	1,0	1,3	-	2,0	0,4	-	0,8	-	-	0,8	0,4	0,8	-	0,6	-	0,6	-	0,6	-	-	1,6
		F	0,3	0,7	-	1,0	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-	0,9	-	-	-	0,7	0,7	-	-	0,9	-
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	1,9	2,1	1,9	1,6	1,7	6,0	0,7	2,2	3,1	1,3	2,1	3,1	1,6	0,8	1,4	2,1	0,6	3,1	1,6	2,8	2,4	1,0
		F	1,7	1,5	2,4	2,8	2,5	0,9	2,4	2,8	2,6	4,5	1,7	3,3	1,9	1,3	1,4	2,4	-	2,8	-	-	0,8	1,3
145	Mellansvalget	M	3,2	3,8	1,6	2,6	1,9	1,8	4,3	2,0	-	0,8	3,6	2,9	3,5	3,1	5,3	5,0	3,2	3,0	3,2	4,7	3,2	0,7
		F	1,0	1,3	1,6	-	-	1,5	-	-	3,7	1,9	0,9	2,2	1,1	2,8	-	2,0	1,7	0,6	1,2	0,9	-	1,3
146	Näs-svalgrummet	M	0,3	0,5	-	-	-	0,4	-	-	-	1,2	0,5	2,4	0,1	1,2	-	1,6	-	0,5	0,8	1,5	-	0,5
		F	0,1	0,1	0,6	-	-	0,8	-	0,6	-	1,6	0,3	-	0,2	0,5	-	-	-	0,4	-	-	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	0,8	1,5	0,6	-	1,5	1,3	3,1	-	3,9	0,8	0,5	1,5	1,2	-	0,6	-	-	-	0,6	-	-	0,8
		F	0,1	0,2	-	1,8	-	0,6	-	-	-	-	0,2	-	0,6	-	-	1,2	-	-	-	1,3	-	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	6,5	5,8	3,5	8,6	5,4	3,3	13,9	5,4	-	13,6	9,0	5,5	5,5	9,7	7,5	9,4	7,3	8,5	3,3	3,3	3,4	5,3
		F	2,0	1,8	1,5	1,1	2,3	0,9	1,1	2,0	-	1,8	3,1	0,4	1,8	2,7	1,9	3,5	3,4	2,7	2,3	2,5	0,5	3,2
151	Magsäck	M	9,5	9,9	7,0	6,2	5,2	7,1	12,6	10,9	-	10,7	11,9	9,0	11,1	10,6	3,9	10,0	5,9	9,0	8,5	8,3	9,8	14,6
		F	5,6	5,9	5,1	7,7	6,6	2,9	4,1	6,3	2,7	7,5	5,5	9,0	5,9	3,0	6,5	4,6	6,1	3,7	4,1	4,0	6,5	8,8
152	Tunntarm	M	3,6	2,8	5,7	2,3	2,8	1,0	2,4	-	-	5,5	4,0	3,3	8,1	1,1	3,3	1,7	3,3	2,3	1,8	3,8	0,9	1,9
		F	2,1	2,2	1,9	3,6	2,0	1,1	1,1	2,0	8,0	-	2,6	2,5	1,8	3,2	0,5	2,4	2,3	3,0	0,6	2,4	2,7	1,2
153	Tjocktarm	M	45,8	40,3	46,6	44,0	47,1	47,4	61,9	51,3	43,7	52,7	47,0	65,9	48,0	38,5	46,0	47,2	53,1	40,2	27,4	41,2	52,6	32,8
		F	39,0	36,0	27,3	47,2	41,0	35,8	41,7	37,8	26,7	45,6	40,9	44,4	42,2	41,0	33,0	45,3	43,5	33,3	36,8	37,2	38,1	33,6
154	Ändtarm och anus	M	27,0	24,0	27,8	30,1	24,0	27,3	26,6	23,6	33,6	41,9	25,9	26,2	26,4	30,1	32,3	42,7	29,8	31,0	22,7	28,7	30,3	18,7
		F	17,1	17,3	13,7	19,5	20,1	10,0	19,1	13,2	16,4	24,7	17,4	21,8	17,7	16,8	19,1	16,7	19,1	21,4	10,0	9,1	18,1	11,5
155	Lever och gallvägar	M	11,0	13,2	15,7	7,0	14,8	9,8	14,0	14,2	12,3	10,1	10,3	15,7	10,5	9,4	11,8	11,2	6,8	9,6	6,2	5,7	8,0	5,8
		F	7,7	8,5	7,4	6,7	7,4	7,6	11,7	11,0	6,5	6,6	7,0	6,3	8,2	3,4	11,4	9,5	6,5	9,7	3,8	2,7	7,9	7,1

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 5 : Antal nya fall per 100 000 personer, åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000 efter läge, kön och län

Table 5 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex and year of county

Län	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Län																							
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
156	Levercancer, ospecificerat	M	0,9	0,1	-	-	0,6	0,8	2,8	1,3	-	4,9	2,7	1,4	1,2	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	
		F	0,7	0,1	-	-	-	-	4,1	-	3,0	6,2	2,6	-	0,5	-	-	-	-	-	0,6	1,0	0,7	0,7	
157	Bukspottkörtel	M	10,8	12,4	12,6	14,6	13,6	11,8	16,3	11,4	8,6	5,8	11,7	13,3	11,6	8,9	8,9	6,5	6,0	6,7	6,1	9,3	12,3	4,8	
		F	9,7	11,8	13,9	5,8	10,0	12,7	5,1	15,0	9,4	9,4	9,7	10,6	10,2	11,6	5,1	7,0	9,7	10,0	3,6	6,1	7,7	6,7	
158	Bukhinna	M	0,1	-	-	-	0,3	-	-	-	-	1,0	-	0,8	0,2	1,5	-	-	0,6	-	-	-	-	1,1	
		F	1,1	1,6	0,8	1,3	0,8	1,1	3,2	-	3,3	1,0	1,4	2,8	0,7	1,5	1,2	-	-	1,3	2,1	-	0,9	0,5	
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	0,7	1,1	0,6	-	0,6	-	-	1,9	-	2,1	0,4	-	1,3	0,5	0,7	1,8	0,7	0,8	0,8	-	-	1,6	
		F	0,5	0,7	0,6	-	-	0,3	3,0	-	-	-	0,6	0,5	0,6	-	2,4	0,8	1,1	0,6	-	1,0	1,5	-	
161	Struphuvud och stämband	M	2,9	2,3	5,9	3,3	2,5	1,5	2,4	2,5	-	7,3	3,6	3,2	3,1	2,1	1,4	4,0	1,9	3,9	4,0	3,3	2,1	1,6	
		F	0,6	1,0	0,5	0,6	1,4	0,6	-	-	2,4	0,9	0,9	-	0,9	-	-	1,3	-	1,7	0,8	-	-	-	
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	40,1	47,1	41,3	37,4	49,1	23,2	49,1	36,2	21,7	48,5	53,8	46,7	35,6	38,0	39,7	32,1	45,6	42,4	13,6	25,5	26,6	16,1	
		F	33,6	36,3	29,1	31,7	38,8	11,7	35,7	31,7	35,1	26,0	47,0	37,5	32,5	33,8	35,8	32,7	29,9	33,9	26,5	30,9	25,1	13,1	
163	Lungcancer, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,3	-	1,5	-	-	0,9	1,0	-	-	-	
		F	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	0,3	-	-	0,5	-	-	1,1	-	-	0,2	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	
		F	-	0,1	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	
170	Bröst	M	0,9	1,0	1,3	1,0	0,9	1,3	-	0,9	-	-	1,2	1,8	0,5	0,7	0,6	0,8	1,1	-	2,6	1,4	-	1,2	
		F	160,9	165,5	171,3	102,6	166,2	171,4	182,7	167,1	101,3	151,7	184,8	169,2	169,8	120,2	147,8	152,5	155,1	134,3	142,9	145,9	167,1	128,5	
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	10,0	9,6	9,6	17,1	18,6	8,2	8,4	8,1	5,8	12,6	9,2	14,8	9,6	9,2	13,8	12,2	6,5	10,9	5,0	4,3	8,5	7,1	
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	25,1	23,6	27,6	29,5	31,6	26,4	24,9	30,8	11,2	18,3	22,0	20,9	28,3	25,1	27,7	24,7	24,5	25,2	26,3	21,4	16,5	26,9	
173	Moderkaka (placenta)	F	0,1	0,1	0,7	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	1,7	0,9	3,9	4,0	1,2	2,3	3,3	4,9	-	3,4	2,2	1,2	2,1	2,2	2,1	2,1	0,6	-	-	-	0,8	4,0	
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	13,2	12,2	15,2	15,5	16,6	15,7	17,2	18,0	7,3	4,7	14,2	13,8	13,5	17,3	13,2	13,3	16,7	9,8	6,8	9,4	8,2	9,7	
176	Kvinnligt könsorgan	F	3,6	5,0	2,4	3,9	6,2	6,3	4,3	2,3	6,1	5,2	2,8	1,4	3,3	3,9	5,4	4,2	3,6	2,2	0,6	0,9	3,4	3,0	
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	183,9	196,4	161,6	153,0	210,0	196,3	260,9	200,4	143,6	187,5	186,3	233,8	162,4	163,8	125,0	215,9	149,0	145,4	183,8	271,0	209,3	161,3	
178	Testikel	M	7,2	6,7	7,5	5,4	10,0	5,0	7,5	8,6	11,0	12,2	8,1	9,3	6,2	9,6	7,4	5,5	11,5	4,5	5,6	4,7	7,6	8,7	
179	Manligt könsorgan	M	1,9	2,3	0,6	2,5	3,1	1,8	-	2,0	2,3	4,1	1,4	1,2	1,6	1,3	1,4	3,0	1,1	3,6	1,7	1,7	1,8	2,6	
180	Njure och njurbäcken	M	15,1	15,7	18,5	16,3	12,3	12,9	20,0	11,3	9,8	11,1	16,3	13,8	13,7	18,9	11,9	11,7	13,1	20,7	13,3	17,8	24,5	11,2	
		F	8,7	7,9	8,5	8,8	11,3	13,2	15,2	13,2	8,4	8,0	7,9	8,8	8,6	10,1	5,2	6,7	6,3	11,0	4,6	6,8	10,3	9,1	
181	Urinvägar utom njure	M	41,1	38,1	38,7	38,6	47,8	34,6	37,5	45,6	63,3	41,3	48,5	47,0	41,2	43,2	38,4	44,6	32,9	35,6	39,1	45,9	44,9	25,3	
		F	11,5	13,3	7,9	13,4	9,8	7,2	13,5	16,2	11,8	9,4	12,6	11,0	12,1	8,7	8,8	8,7	12,0	9,9	7,5	12,8	12,9	9,4	

(Continued)

Tabell 5 : Antal nya fall per 100 000 personer, åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000 efter läge, kön och län
Table 5 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex and year of county

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 5 : Antal nya fall per 100 000 personer, åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000 efter läge, kön och län

Table 5 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex and year of county

Län	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Län																							
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	0,8	3,0	1,3	1,3	-	-	-	0,9	-	-	0,4	-	0,5	0,9	0,9	-	2,0	-	1,5	-	-	-	
		F	1,0	3,1	0,5	-	-	0,5	-	-	11,2	1,7	0,1	-	0,3	2,1	0,9	2,0	2,0	1,1	0,8	-	-	-	
208	Polycytemia vera	M	1,6	1,7	1,2	0,6	2,7	2,0	-	1,5	2,3	3,2	0,5	4,4	3,4	1,6	1,3	-	0,8	1,2	-	-	1,6	-	
		F	1,4	2,4	0,6	1,1	0,8	3,3	-	1,3	2,4	2,6	0,6	2,3	2,1	0,6	0,6	-	1,3	1,2	0,8	-	1,4	-	
209	Myelofibros	M	1,5	2,6	0,6	2,8	1,1	1,3	0,7	0,5	-	0,8	2,4	1,7	1,8	2,5	-	-	-	1,9	0,7	5,0	1,6	1,0	
		F	1,0	1,1	0,6	1,1	0,9	1,0	0,8	1,7	-	3,9	1,1	1,4	1,3	1,0	-	0,6	2,0	1,2	0,7	1,5	0,5	0,6	

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 6 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000,Fördelning efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 6 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion	R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Linköping	R4: Lund-Malmö	R5: Göteborg	R6: Umeå
Stockholm	01: Län	0180: Kommun	01A: Län Exklusive	0180		
Skåne	01: Län	1280: Kommun	12A: Län Exklusive	1280		
Göteborg	01: Län	1480: Kommun	14A: Län Exklusive	1280		

		Län																
ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
140 -	209 Samtliga lägen	M	629,3	643,1	579,3	656,5	698,9	655,5	512,9	647,5	637,6	655,5	682,0	677,8	681,3	635,1	659,3	626,4
		F	523,4	530,6	483,8	536,4	569,7	579,0	406,5	533,2	542,2	525,7	571,3	565,1	574,0	568,7	575,9	567,4
140	Läpp	M	2,1	2,6	1,9	1,5	1,9	2,4	2,3	2,5	1,4	3,2	1,9	1,1	2,1	2,2	3,1	1,8
		F	1,2	1,8	0,7	0,7	1,4	1,9	0,4	1,6	1,1	2,0	1,0	-	1,3	1,7	3,8	0,9
141	Tunga	M	3,0	3,6	2,9	3,2	2,6	2,9	2,9	3,6	3,3	3,8	2,9	1,0	3,4	2,8	1,7	3,2
		F	2,1	3,4	1,5	1,8	1,5	2,3	2,4	3,2	3,2	3,1	1,7	3,4	1,2	2,3	1,9	2,4
142	Spottkörtel	M	1,3	1,5	2,2	0,8	1,4	1,4	0,5	1,3	2,2	0,7	1,8	0,7	2,2	1,3	2,0	1,1
		F	0,9	1,3	1,3	1,1	0,6	0,7	1,0	1,3	1,3	1,4	0,9	1,5	0,7	0,6	0,4	0,7
143	Munbotten	M	0,6	1,0	0,4	1,1	0,6	0,8	0,6	1,0	0,5	1,3	0,8	2,0	0,6	0,8	-	1,1
		F	0,3	0,7	0,3	0,1	0,2	0,8	0,3	0,7	0,4	1,0	0,3	-	0,4	0,9	1,1	0,8
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	1,9	2,2	1,6	3,2	1,9	1,8	1,8	2,1	2,3	2,0	2,1	4,2	1,5	1,6	0,4	2,1
		F	1,7	1,5	1,8	2,0	2,1	2,1	0,6	1,5	1,1	1,7	1,7	1,8	1,7	1,9	2,6	1,7
145	Mellansvalget	M	3,2	3,6	3,3	1,9	3,2	3,7	2,7	3,8	3,6	3,9	3,6	3,0	3,8	3,5	3,7	3,6
		F	1,0	1,3	1,2	0,5	1,0	1,2	0,9	1,3	1,5	1,1	0,9	-	1,2	1,1	1,3	1,0
146	Näs-svalgrummet	M	0,3	0,5	0,5	0,1	0,7	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	-	0,7	0,1	0,4	-
		F	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,2	-	0,1	0,3	-	0,3	-	0,4	0,2	0,3	0,3
147	Svalget bakom struphuvudet	M	0,8	1,6	0,2	1,1	0,9	1,2	0,4	1,5	2,1	1,3	0,5	-	0,6	1,2	2,0	0,9
		F	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,4	-	0,2	-	0,3	0,6	0,9	0,5
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-
150	Matstrupe	M	6,5	5,5	7,8	4,7	9,7	5,5	3,9	5,8	6,1	5,6	9,0	9,3	9,0	5,5	7,8	4,7
		F	2,0	1,7	2,4	1,8	2,5	1,7	2,0	1,8	1,9	1,8	3,1	3,8	3,0	1,8	1,8	1,8
151	Magsäck	M	9,5	9,5	7,5	7,3	11,2	11,3	10,6	9,9	10,3	9,6	11,9	14,8	11,0	11,1	12,6	10,5
		F	5,6	5,8	5,2	5,3	6,0	5,9	6,2	5,9	3,5	7,5	5,5	6,6	5,0	5,9	7,2	5,4
152	Tunntarm	M	3,6	2,7	2,8	1,5	4,0	7,6	1,8	2,8	2,4	3,0	4,0	-	4,9	8,1	3,3	9,8
		F	2,1	2,4	2,5	1,7	2,2	1,8	1,6	2,2	2,5	2,1	2,6	1,4	2,9	1,8	3,2	1,2
153	Tjocktarm	M	45,8	40,5	45,1	48,5	50,7	50,0	37,7	40,3	41,9	39,6	47,0	52,3	45,6	48,0	47,6	48,0
		F	39,0	35,6	38,5	38,4	41,5	42,6	36,3	36,0	33,3	37,5	40,9	40,2	41,0	42,2	37,1	44,4
154	Ändtarm och anus	M	27,0	24,4	31,8	25,1	27,3	26,7	24,5	24,0	22,7	25,3	25,9	25,0	26,1	26,4	25,4	26,5
		F	17,1	17,2	18,1	15,1	19,0	17,8	12,6	17,3	21,6	14,5	17,4	15,4	18,1	17,7	17,3	17,8
155	Lever och gallvägar	M	11,0	13,2	10,3	12,9	11,1	11,0	6,5	13,2	12,1	14,0	10,3	11,9	9,7	10,5	9,2	10,8
		F	7,7	8,4	7,8	8,4	7,2	8,2	5,8	8,5	8,3	8,8	7,0	7,8	6,9	8,2	5,9	9,0

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 6 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000,Fördelning efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 6 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion	R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Linköping	R4: Lund-Malmö	R5: Göteborg	R6: Umeå
Stockholm	01: Län	0180: Kommun	01A: Län Exklusive	0180		
Skåne	01: Län	1280: Kommun	12A: Län Exklusive	1280		
Göteborg	01: Län	1480: Kommun	14A: Län Exklusive	1280		

		Län																
ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
156	Levercancer, ospecificerat	M	0,9	0,1	-	0,8	3,0	1,0	0,4	0,1	-	0,2	2,7	1,1	3,1	1,2	1,4	1,0
		F	0,7	0,2	-	-	2,9	0,4	0,7	0,1	-	0,1	2,6	1,5	2,9	0,5	-	0,6
157	Bukspottkörtel	M	10,8	12,2	9,1	12,5	11,9	11,7	7,9	12,4	14,6	11,2	11,7	10,0	12,2	11,6	12,2	11,3
		F	9,7	11,7	9,1	12,2	9,4	10,1	6,0	11,8	14,2	10,2	9,7	10,5	9,5	10,2	8,8	10,7
158	Bukhinna	M	0,1	-	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,3
		F	1,1	1,7	0,9	0,7	1,6	1,0	1,0	1,6	1,8	1,6	1,4	1,9	1,3	0,7	0,3	0,8
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	0,7	1,1	0,7	0,7	0,5	1,2	0,7	1,1	0,3	1,7	0,4	1,0	0,2	1,3	1,1	1,4
		F	0,5	0,7	0,8	0,1	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,9	0,5
161	Struphuvud och stämband	M	2,9	2,2	3,2	2,2	3,6	3,2	2,7	2,3	2,2	2,3	3,6	1,6	4,1	3,1	4,5	2,6
		F	0,6	1,0	0,6	0,8	0,7	0,8	0,2	1,0	1,3	0,8	0,9	1,2	0,8	0,9	1,3	0,7
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	40,1	46,1	39,6	37,2	52,8	36,2	19,6	47,1	49,1	46,5	53,8	62,7	51,6	35,6	46,4	31,9
		F	33,6	36,3	32,4	28,1	42,9	32,9	22,9	36,3	34,8	37,2	47,0	46,4	47,4	32,5	31,9	32,9
163	Lungcancer, ospecificerad	M	-	-	0,3	-	0,1	0,3	0,3	-	-	-	0,2	-	0,3	0,3	-	0,4
		F	-	-	0,3	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	0,2	0,1	0,4	0,1	-	-	0,3	0,4	0,1	0,2	-	0,2	-	-	-
		F	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	0,9	1,0	0,8	1,0	1,0	0,7	1,3	1,0	0,7	1,2	1,2	2,6	0,8	0,5	0,4	0,6
		F	160,9	163,4	140,9	168,6	177,1	172,5	146,1	165,5	164,7	166,3	184,8	191,9	182,8	169,8	172,2	169,1
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	10,0	9,5	11,3	12,8	10,1	9,9	6,6	9,6	11,5	7,9	9,2	5,6	10,8	9,6	9,0	9,8
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	25,1	23,2	26,3	29,6	21,6	27,7	22,8	23,6	27,2	21,1	22,0	22,2	21,9	28,3	26,4	29,1
173	Moderkaka (placenta)	F	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,2	-	-	-	-	0,2	-	0,2
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	1,7	0,9	2,1	2,5	2,4	2,0	1,4	0,9	0,7	1,1	2,2	3,6	1,8	2,1	0,6	2,6
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	13,2	12,1	14,5	16,8	13,4	13,7	8,4	12,2	14,5	10,8	14,2	10,7	15,2	13,5	13,9	13,2
176	Kvinnligt könsorgan	F	3,6	5,0	3,6	5,2	3,0	3,2	2,1	5,0	6,5	3,9	2,8	2,6	3,0	3,3	2,9	3,5
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	183,9	194,4	158,2	202,5	196,8	172,0	197,2	196,4	184,8	202,9	186,3	147,0	195,8	162,4	168,1	159,7
178	Testikel	M	7,2	6,8	7,4	8,0	8,3	6,6	6,8	6,7	6,4	7,1	8,1	7,7	8,4	6,2	5,2	6,7
179	Manligt könsorgan	M	1,9	2,3	1,9	2,4	1,6	1,5	2,0	2,3	2,3	2,5	1,4	-	1,7	1,6	2,2	1,5
180	Njure och njurbäcken	M	15,1	15,5	16,0	12,3	15,7	14,1	16,3	15,7	13,0	17,2	16,3	12,3	17,2	13,7	7,5	15,9
		F	8,7	8,0	8,1	12,5	9,1	8,3	7,8	7,9	8,7	7,3	7,9	6,4	8,3	8,6	10,2	7,9
181	Urinvägar utom njure	M	41,1	39,1	38,7	42,8	47,2	41,1	37,5	38,1	41,2	35,8	48,5	58,1	45,9	41,2	43,3	40,5
		F	11,5	13,2	10,0	10,6	12,4	12,0	10,3	13,3	13,3	13,3	12,6	12,5	12,8	12,1	13,8	11,5

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 6 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000,Fördelning efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 6 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion	R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Linköping	R4: Lund-Malmö	R5: Göteborg	R6: Umeå
Stockholm	01: Län	0180: Kommun	01A: Län Exklusive	0180		
Skåne	01: Län	1280: Kommun	12A: Län Exklusive	1280		
Göteborg	01: Län	1480: Kommun	14A: Län Exklusive	1280		

		Län																
ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
190	Malignt melanom i huden	M	36,4	35,6	33,1	40,4	36,1	48,2	20,1	35,9	40,0	33,5	32,5	23,8	34,7	47,8	53,5	45,8
		F	32,1	28,5	29,3	40,2	33,6	41,8	18,4	28,4	30,6	27,0	32,2	27,9	33,6	39,9	32,7	43,6
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	79,2	89,3	61,2	92,6	95,0	91,9	36,7	90,7	92,0	90,3	95,4	110,6	91,5	85,8	93,5	83,0
		F	41,8	45,7	29,9	38,2	54,6	56,1	16,9	45,9	45,8	45,6	52,0	49,0	52,7	51,1	61,6	46,7
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	1,5	1,8	1,4	1,9	1,4	2,0	1,3	1,7	1,4	1,9	1,4	0,5	1,6	2,1	2,0	2,1
		F	1,2	1,2	1,2	1,6	1,0	1,5	1,2	1,1	1,8	0,6	0,7	1,7	0,4	1,5	1,6	1,5
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	12,4	9,7	12,0	14,8	13,0	15,9	8,5	9,6	10,0	9,3	13,2	16,0	12,4	15,6	15,7	15,6
		F	13,8	11,9	12,4	15,1	16,6	16,7	8,3	11,8	11,2	12,2	15,7	12,1	16,5	16,9	21,1	15,4
194	Sköldkörtel	M	3,2	3,8	1,5	0,8	4,2	5,2	3,2	3,8	2,6	4,8	4,7	3,6	5,2	5,1	4,7	5,5
		F	7,2	6,3	5,1	3,1	7,4	13,3	6,3	6,4	5,8	6,6	8,0	11,2	7,1	13,4	19,3	11,0
195	Endokrin körtel	M	6,4	8,5	4,9	3,9	9,2	6,5	3,8	8,5	5,9	10,1	9,5	13,6	8,0	6,8	6,7	6,6
		F	12,4	19,3	8,1	8,3	12,5	15,4	6,4	19,7	19,0	20,0	12,7	17,2	11,5	16,2	18,4	15,4
196	Skelettet	M	0,4	0,5	0,6	0,4	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,4	0,8	1,3	0,6	0,6	1,5	0,3
		F	0,8	1,6	0,8	0,5	1,0	0,6	1,5	1,5	2,1	1,1	1,2	-	1,7	0,6	0,5	0,6
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	3,3	2,8	2,7	2,6	4,7	3,9	3,5	2,8	3,0	2,8	3,8	4,7	3,4	3,6	3,4	3,9
		F	2,8	1,9	3,0	3,0	4,4	2,5	1,8	1,9	2,3	1,6	3,6	2,1	4,1	2,6	2,4	2,9
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M																
		F	11,9	8,3	19,0	8,3	11,0	13,3	7,1	8,3	8,1	8,5	11,3	16,6	10,0	14,0	15,2	13,5
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	20,0	21,0	20,5	22,7	19,4	20,2	16,1	21,0	21,2	20,8	19,2	23,6	17,9	19,6	19,4	19,7
		F	13,5	12,7	13,6	14,7	15,0	13,4	11,1	12,4	9,7	14,2	15,8	16,9	15,2	13,3	11,7	14,0
201	Hodgkins sjukdom	M	2,4	2,7	2,3	2,1	2,5	2,7	1,5	2,8	3,3	2,5	2,4	1,8	2,6	3,0	1,7	3,6
		F	2,1	2,7	2,5	1,8	1,8	1,9	2,1	2,7	2,9	2,5	1,7	-	2,2	1,6	1,6	1,7
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	2,1	2,5	0,6	2,4	3,5	2,8	1,4	2,5	2,3	2,7	3,1	4,2	2,8	3,2	3,5	3,2
		F	0,8	0,5	0,8	1,5	1,2	1,3	0,6	0,5	0,4	0,6	1,5	2,3	1,3	1,4	1,4	1,5
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	7,7	5,9	8,1	9,5	9,3	7,0	6,8	6,2	5,0	6,9	8,4	8,6	8,4	7,5	9,2	7,0
		F	4,9	3,5	6,0	7,2	4,2	4,7	4,2	3,6	3,7	3,6	3,4	3,5	3,4	5,0	5,3	4,9
204	Lymfatisk leukemi	M	6,8	4,2	7,8	8,2	7,6	7,9	5,3	4,2	4,0	4,3	8,4	9,0	8,0	8,1	4,1	9,5
		F	4,1	2,5	5,4	4,3	4,0	5,3	3,0	2,6	2,7	2,6	4,1	1,4	4,8	5,2	5,3	5,1
205	Myeloisk leukemi	M	5,8	5,5	6,1	6,7	7,5	4,9	4,5	5,6	5,1	5,6	7,8	4,8	8,4	4,5	6,7	3,5
		F	3,9	4,8	3,8	3,8	4,7	3,6	2,7	4,6	5,0	4,5	4,1	4,8	3,9	3,5	3,5	3,6
206	Monocytleukem	M	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,6	0,9	0,3	0,4	1,5	0,2	0,1	-	0,2
		F	-	-	0,3	-	0,4	0,5	0,2	-	-	-	0,5	1,0	0,3	0,5	0,7	0,5

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 6 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000,Fördelning efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 6 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion	R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Linköping	R4: Lund-Malmö	R5: Göteborg	R6: Umeå
Stockholm	01: Län	0180: Kommun	01A: Län Exklusive	0180		
Skåne	01: Län	1280: Kommun	12A: Län Exklusive	1280		
Göteborg	01: Län	1480: Kommun	14A: Län Exklusive	1280		

		Län																
ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	0,8	2,9	0,9	0,2	0,2	0,5	0,4	3,0	3,8	2,6	0,4	-	0,4	0,5	1,1	0,4
		F	1,0	3,4	1,2	0,2	0,2	0,3	0,2	3,1	4,4	2,0	0,1	-	0,2	0,3	-	0,4
208	Polycytemia vera	M	1,6	1,7	1,0	2,1	1,1	3,4	0,4	1,7	0,8	2,2	0,5	0,8	0,5	3,4	3,9	3,2
		F	1,4	2,4	0,8	1,8	0,9	2,1	0,6	2,4	2,0	2,6	0,6	-	0,8	2,1	1,0	2,5
209	Myelofibros	M	1,5	2,5	1,1	1,0	1,9	1,9	1,6	2,6	1,4	3,3	2,4	3,6	2,1	1,8	2,1	1,8
		F	1,0	1,0	0,9	1,1	1,5	1,1	0,8	1,1	1,4	0,9	1,1	0,7	1,3	1,3	1,5	1,1

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 7 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter världsbefolkningen. Fördelning efter läge, kön och diagnosår 1993-2012

Table 7 : Rates per 100.000 age adjusted to the world standard population by site, sex and year of diagnosis

		Diagnosår																					
ICD-7	Läge	Kön	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
140 -	209 Samtliga lägen	M	266,3	270,6	273,0	265,4	267,3	270,7	277,0	289,6	287,9	291,7	297,5	310,3	325,3	321,6	319,6	308,2	311,8	333,3	323,1	325,0	306,7
		F	251,1	249,9	258,4	257,1	257,4	256,0	260,8	259,8	262,6	268,0	269,6	273,3	276,1	273,1	278,1	282,1	285,4	288,3	290,9	299,1	294,3
140	Läpp	M	1,7	1,4	1,3	1,3	1,5	1,4	1,3	1,1	1,1	0,9	1,0	0,9	0,9	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,8
		F	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3	0,1	0,4	0,5	0,4
141	Tunga	M	1,0	0,9	1,2	0,9	1,2	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,1	1,2	1,0	1,2	1,3	1,7	1,5	1,4	1,7	1,8
		F	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,6	0,6	0,7	0,6	0,4	0,5	0,9	0,7	0,7	0,7	0,9	0,8	0,9	1,3
142	Spottkörtel	M	0,4	0,4	0,5	0,7	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6
		F	0,5	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6	0,4
143	Munbotten	M	0,4	0,7	0,5	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3
		F	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	1,0	0,8	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,7	0,8	0,7	0,9	0,6	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8
		F	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	0,3	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5	0,8	0,7
145	Mellansvalget	M	0,7	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,4	1,2	1,2	1,5	1,6	1,7	1,3	1,6	1,7	2,1	1,9	2,3	2,1
		F	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,6	0,5	0,5	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
146	Näs-svalgrummet	M	0,1	-	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4	0,8	0,7	0,4	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,2	0,3
		F	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	3,0	3,0	2,9	3,0	3,2	2,9	3,4	3,6	3,2	3,4	3,1	3,6	3,5	3,9	3,3	2,9	3,2	3,7	3,1	3,6	3,1
		F	1,1	1,2	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1	1,1	1,2	1,0	0,9	0,7	0,8	0,8	1,1	0,9	1,0	0,7	0,9	0,9
151	Magsäck	M	10,0	9,3	9,1	8,2	8,4	8,1	7,4	7,9	6,7	6,9	6,8	6,7	6,6	6,3	5,8	5,8	4,8	5,5	5,2	5,0	4,2
		F	5,1	4,9	4,1	4,5	4,2	4,1	3,5	3,6	3,9	3,5	3,9	3,2	3,4	3,0	3,1	3,2	2,9	3,2	3,1	3,0	2,7
152	Tunntarm	M	1,4	1,5	1,5	1,1	1,4	1,4	1,2	1,5	1,3	1,2	1,6	1,7	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	1,5	1,6
		F	0,9	1,1	1,0	1,0	0,7	0,9	1,2	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	1,5	1,4	1,1	1,2	1,0
153	Tjocktarm	M	18,8	17,9	17,9	18,2	17,6	19,0	18,6	19,3	17,8	18,9	18,7	19,4	19,7	18,7	19,9	20,7	20,7	21,0	20,2	20,7	20,3
		F	16,1	15,8	16,1	16,0	15,0	15,2	16,0	17,3	15,8	16,3	16,6	16,6	16,6	17,7	17,4	19,4	18,1	17,8	17,6	18,1	17,3
154	Ändtarm och anus	M	12,7	12,8	13,1	12,2	12,5	12,3	12,2	12,3	12,7	12,6	13,2	13,1	13,3	12,7	14,0	12,8	12,9	13,4	12,7	12,6	12,8
		F	8,9	8,5	8,4	8,2	8,4	8,2	8,4	8,1	8,5	7,8	8,6	9,0	8,4	9,3	8,3	9,5	8,9	8,6	8,9	8,8	8,5
155	Lever och gallvägar	M	5,4	5,4	5,4	4,9	5,0	4,7	5,5	4,4	4,7	4,6	4,5	4,2	4,7	4,3	4,5	3,8	4,3	5,2	5,4	5,9	5,6
		F	5,5	5,2	5,2	4,0	4,3	4,1	4,6	3,9	3,6	4,0	3,4	3,6	3,8	3,4	3,2	3,1	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7
156	Levercancer, ospecificerat	M	1,0	1,0	1,0	0,7	0,8	0,7	0,6	0,8	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,3
		F	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3
157	Bukspottkörtel	M	6,3	6,6	6,7	6,1	6,4	5,4	5,3	5,0	4,9	5,5	5,1	5,1	5,3	5,1	5,2	5,2	4,5	5,1	5,7	5,9	5,3
		F	5,4	5,9	5,4	5,4	4,7	5,0	4,8	4,3	4,4	4,4	4,5	4,8	4,8	4,5	4,2	4,6	4,1	4,8	4,8	4,9	4,7
158	Bukhinna	M	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,7	0,5

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 7 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter världsbefolkningen. Fördelning efter läge, kön och diagnosår 1993-2012

Table 7 : Rates per 100.000 age adjusted to the world standard population by site, sex and year of diagnosis

		Diagnosår																					
ICD-7	Läge	Kön	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2
		F	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,2
161	Struphuvud och stämband	M	2,3	2,1	2,3	1,9	2,3	2,0	1,9	1,9	1,7	2,1	2,2	2,1	1,7	2,1	1,6	1,9	1,7	1,6	1,5	1,6	1,3
		F	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	24,6	23,8	24,9	22,9	22,3	22,7	22,7	22,2	21,9	22,6	22,6	21,9	23,4	22,8	21,9	20,8	20,9	20,6	21,3	20,9	18,7
		F	12,1	12,5	13,5	13,7	13,3	12,5	13,3	14,2	15,3	15,9	15,7	16,3	17,6	17,5	18,6	19,2	18,6	20,0	18,8	18,9	17,1
163	Lungcancer, ospecificerad	M	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-	0,1	-	-	-
		F	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	-	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
		F	72,1	70,9	78,6	77,4	78,0	78,3	83,2	83,2	84,0	86,1	87,0	90,3	90,2	88,4	90,7	89,7	92,9	90,8	96,6	100,6	99,6
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	8,4	8,0	7,8	7,5	7,0	8,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,1	7,2	6,8	6,6	7,2	7,5	7,3	6,7	6,8	6,6	7,7
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	13,9	13,8	13,6	13,6	14,4	14,5	15,5	14,1	14,8	14,0	15,0	14,1	14,0	14,5	13,7	14,0	14,0	14,7	13,7	13,6	13,3
173	Moderkaka (placenta)	F	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	1,4	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,2	1,0	1,3	1,2	1,0	1,1	0,9	0,9	1,0
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	12,7	13,2	13,2	12,7	12,1	11,9	11,5	11,0	11,8	10,7	10,9	11,3	10,2	9,4	9,5	9,2	9,5	9,2	9,0	7,7	8,1
176	Kvinnligt könsorgan	F	1,6	2,0	1,6	1,8	2,2	1,7	2,1	1,9	2,0	2,3	1,7	1,7	1,9	2,0	1,8	2,0	1,7	1,7	1,8	1,8	1,5
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	57,6	62,5	62,0	62,8	63,7	65,0	74,3	83,3	86,3	88,4	90,6	104,5	116,3	113,2	105,6	100,7	97,4	114,8	104,1	102,3	92,2
178	Testikel	M	4,8	4,1	5,2	4,6	4,4	5,9	4,7	5,6	5,4	6,0	5,8	5,2	7,0	6,2	7,3	6,5	6,9	7,0	7,3	7,2	7,2
179	Manligt könsorgan	M	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	1,2	0,8	0,9	1,0	1,1	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	1,2	0,8	1,0	0,9
180	Njure och njurbäcken	M	9,4	9,4	9,3	8,4	8,0	8,0	7,8	7,8	7,5	8,4	7,2	7,7	7,9	7,4	8,8	8,5	8,9	8,3	8,9	8,3	8,0
		F	5,8	6,1	5,5	5,2	4,6	5,0	4,9	5,0	4,3	4,9	4,4	4,5	5,5	4,5	5,3	4,8	4,7	4,9	4,8	5,2	4,8
181	Urinvägar utom njure	M	18,8	19,3	19,4	18,1	18,3	18,0	17,2	19,0	18,5	18,5	19,1	18,0	18,3	18,7	19,1	18,7	18,4	18,6	18,4	18,2	17,5
		F	5,2	5,2	4,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,6	5,6	5,5	5,5	5,7	5,4	5,0	5,1	6,0	5,6	5,5	5,8	5,5	5,2
190	Malignt melanom i huden	M	10,5	11,1	11,9	11,7	11,2	12,3	11,7	11,7	11,1	12,5	13,8	13,2	12,7	14,2	14,6	14,8	17,3	17,8	18,3	19,9	19,7
		F	10,5	10,9	12,2	11,8	11,5	12,6	11,5	11,6	11,5	13,3	13,5	13,3	14,3	14,2	14,9	15,9	17,3	18,7	18,0	21,3	20,9
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	14,6	13,6	14,6	14,4	15,4	15,4	15,6	16,6	17,4	16,5	17,1	18,6	18,3	19,2	21,6	20,6	22,7	22,9	24,0	26,6	25,4
		F	6,0	6,1	6,7	6,2	7,5	7,7	7,8	7,7	8,4	8,7	8,7	8,8	9,6	10,8	12,1	12,8	12,6	14,4	14,4	16,6	15,9
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	0,7	0,9	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	0,5	0,7	0,9	0,6	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	0,9	0,9	0,8	1,1
		F	0,5	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,8	0,5	0,7	1,0	0,5	0,8	1,2	0,7	0,8	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	11,5	11,6	10,8	11,5	10,2	11,8	11,7	10,5	10,5	10,2	11,0	10,3	10,5	11,2	10,7	10,0	9,7	10,3	10,4	10,7	9,5
		F	11,6	10,9	11,3	12,0	11,1	12,1	11,8	11,9	10,5	10,9	11,1	11,6	10,8	12,5	12,4	11,5	11,3	11,0	12,0	10,3	10,0
194	Sköldkörtel	M	1,5	1,0	1,4	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,2	0,9	1,4	0,9	1,7	1,1	1,2	1,4	1,7	1,5	1,6	2,0	2,0
		F	3,8	3,3	3,3	4,0	3,4	3,3	3,0	3,0	3,5	3,1	3,5	3,5	4,2	3,6	3,4	4,2	4,3	4,7	5,1	4,9	5,2
195	Endokrin körtel	M	3,8	4,0	3,8	4,3	3,9	3,6	3,5	3,5	3,8	2,9	3,0	3,6	3,3	3,5	3,1	2,8	3,6	3,7	3,7	3,6	4,2
		F	8,5	7,1	7,8	7,5	8,0	6,1	5,6	5,9	6,0	6,2	6,5	6,4	6,4	6,0	6,0	5,5	6,8	6,5	6,0	7,6	8,4

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 7 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter världsbefolkningen. Fördelning efter läge, kön och diagnosår 1993-2012

Table 7 : Rates per 100.000 age adjusted to the world standard population by site, sex and year of diagnosis

		Diagnosår																					
ICD-7	Läge	Kön	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
196	Skelettet	M	0,7	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,8	0,3	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,3	0,6	0,4	0,6	0,7	0,6	0,7	0,4
		F	0,5	0,5	0,3	0,2	0,5	0,1	0,5	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5	0,3	0,7	0,3	0,3	0,6
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	2,0	2,5	2,5	2,3	2,4	2,1	1,8	2,4	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,9	2,1	2,3	2,6	2,2	2,3	2,6	2,1
		F	2,2	2,0	2,1	1,8	1,9	1,6	1,8	1,7	1,6	1,9	1,4	2,2	2,2	1,7	1,9	1,9	1,7	1,7	1,3	1,4	1,8
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	8,1	9,1	8,6	8,5	9,0	9,5	8,5	9,6	8,8	8,6	8,8	7,9	7,2	7,3	6,8	6,0	6,0	6,4	5,2	5,7	5,5
		F	7,9	8,2	8,4	8,5	9,7	8,7	9,1	8,9	9,9	9,1	8,7	8,4	8,3	7,6	7,6	6,7	7,3	7,1	6,6	6,4	5,9
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	10,7	9,9	10,2	10,0	10,4	9,3	9,8	10,1	9,7	9,9	10,0	10,1	9,9	9,6	10,7	10,7	10,4	11,3	10,4	9,5	10,1
		F	6,7	6,7	7,1	6,9	6,4	7,1	6,7	6,8	6,3	7,4	7,3	6,8	7,2	6,8	7,4	7,0	8,2	6,8	7,3	7,0	7,0
201	Hodgkins sjukdom	M	2,1	1,6	2,2	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	2,0	1,7	1,8	1,6	1,8	1,7	1,9	1,7	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
		F	1,6	1,5	1,2	1,2	1,8	1,5	1,3	1,4	1,5	1,5	2,0	1,6	1,5	1,6	1,3	1,5	1,4	1,8	1,4	1,4	1,8
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	0,8	0,8	0,7	0,7	0,9	1,2	0,8	1,0	1,0	0,9	0,7	0,6	0,9	0,7	1,1	0,8	1,2	0,8	1,4	1,3	1,3
		F	-	0,1	0,1	0,4	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,6	0,3	0,3	0,4	0,7	0,4
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	4,0	3,8	3,7	3,7	3,4	3,4	3,9	3,5	3,7	3,3	3,6	3,4	3,4	3,6	3,8	3,7	4,0	3,5	4,2	3,8	3,5
		F	2,2	2,4	2,3	2,5	2,9	2,3	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,7	2,3
204	Lymfatisk leukemi	M	4,0	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,6	5,4	4,9	5,4	5,1	5,3	5,8	5,9	5,2	5,3	5,2	4,9	5,5	4,8	4,3
		F	2,4	2,7	2,9	3,6	3,6	3,2	3,0	3,4	3,5	4,0	3,2	3,2	3,7	3,8	3,5	3,1	3,3	3,4	3,2	3,1	2,7
204-209	204-209 Leukemi, Polycytemia vera	M	8,3	9,9	9,5	9,5	9,9	10,4	11,1	10,5	10,2	10,7	10,4	11,1	11,0	11,4	11,1	10,9	10,9	10,2	11,6	10,6	10,2
		F	6,2	6,4	6,6	7,7	7,9	7,6	7,6	7,1	7,9	8,3	8,2	8,1	8,4	8,3	8,5	7,6	8,0	8,4	8,1	7,7	7,4
205	Myeloisk leukemi	M	3,0	3,0	2,6	2,5	3,1	3,4	3,2	3,1	3,1	3,4	2,9	3,4	2,8	2,8	3,2	3,0	3,3	3,0	3,3	3,5	3,2
		F	2,5	2,2	2,3	2,5	2,6	2,5	2,8	2,3	2,4	2,6	2,9	2,8	2,6	2,4	2,5	2,6	2,4	2,3	2,7	2,3	2,3
206	Monocytleukem	M	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,2	-	0,2	0,5	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3
		F	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,6	0,1	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4
208	Polycytemia vera	M	0,3	0,8	0,6	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,5	0,7	0,7	0,8	0,5	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
		F	0,6	0,5	0,4	0,3	0,5	0,5	0,4	0,3	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,3	0,7	0,7
209	Myelofibros	M	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,9	0,4	0,5	0,8	0,9	1,0	0,6	1,0	1,0	0,9	0,5	0,8	0,8	0,5	0,7
		F	-	0,3	0,2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,3	0,7	0,5	0,5	0,4

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 8 : Andel fall (%) cytologiskt eller histologiskt verifierade efter läge kön och ålder vid diagnos

Table 8 : Percentage of cytologically or histologically verified by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
ICD-7	Läge	Kön	All ages	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
140 -	209 Samtliga lägen	M	98	93	89	100	97	99	97	98	99	99	99	98	98	98	99	98	98	97	96
		F	98	96	100	93	98	97	98	99	99	99	100	99	99	99	99	99	98	97	96
140	Läpp	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
141	Tunga	M	100	-	-	-	-	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
142	Spottkörtel	M	100	-	100	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
143	Munbotten	M	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	99	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96
145	Mellansvalget	M	99	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	88	-	100
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
146	Näs-svalgrummet	M	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		F	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	100	100	-	100	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	99	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94
151	Magsäck	M	99	-	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	97
		F	99	-	-	-	100	-	100	-	50	100	100	100	94	100	100	100	100	100	98
152	Tunntarm	M	99	-	-	-	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92
		F	97	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	95	95	96	100	100
153	Tjocktarm	M	99	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	99	100	99	99	94
		F	99	-	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	99	99	100	99	99	99	96
154	Ändtarm och anus	M	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99
		F	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	99	100	99	100	100
155	Lever och gallvägar	M	74	100	-	-	100	100	50	100	100	100	100	63	70	66	87	74	73	72	62
		F	81	100	-	-	-	-	-	100	100	67	92	81	64	82	89	90	84	74	48
156	Levercancer, ospecificerat	M	86	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	71	88	100	83	100	80	50
		F	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	75	100	100	100	100	100
157	Bukspottkörtel	M	85	-	-	-	-	100	100	100	-	88	100	89	83	91	84	85	94	78	52
		F	83	-	-	-	-	-	-	-	100	83	82	100	96	92	89	92	83	73	39
158	Bukhinna	M	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	100	100	100	100	-
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 8 : Andel fall (%) cytologiskt eller histologiskt verifierade efter läge kön och ålder vid diagnos

Table 8 : Percentage of cytologically or histologically verified by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
ICD-7	Läge	Kön	All ages	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	97	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83
161	Struphuvud och stämband	M	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	95	100	92
		F	97	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	-	-
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	95	-	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	96	98	98	97	93	91	78
		F	96	100	-	-	-	-	100	100	100	100	97	100	99	99	99	97	95	88	82
163	Lungcancer, ospecificerad	M	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100	-	100
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100	100	-	-	100	-
		F	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	100	-	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
173	Moderkaka (placenta)	F	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	100	-	-	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
176	Kvinnligt könsorgan	F	100	-	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	99	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	99	98	94
178	Testikel	M	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100
179	Manligt könsorgan	M	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
180	Njure och njurbäcken	M	98	100	100	-	100	-	-	100	100	100	100	100	100	99	100	100	96	89	69
		F	97	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100	96	100	100	100	96	97	96	86
181	Urinvägar utom njure	M	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	-	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
190	Malignt melanom i huden	M	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	100	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	34	50	25	-	-	-	-	-	-	67	75	33	29	11	27	20	71	20	100
		F	48	67	-	-	-	-	-	-	-	-	100	40	33	44	57	57	50	67	-
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	93	100	87	100	100	100	94	100	100	97	100	100	96	100	100	89	72	53	55
		F	93	100	100	100	89	100	100	100	100	100	100	100	95	100	98	92	73	62	60
194	Sköldkörtel	M	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
195	Endokrin körtel	M	88	100	100	100	83	50	75	73	90	95	88	91	94	90	88	86	81	83	100
		F	95	100	-	-	100	82	86	76	91	84	100	95	98	99	99	98	95	90	78

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 8 : Andel fall (%) cytologiskt eller histologiskt verifierade efter läge kön och ålder vid diagnos

Table 8 : Percentage of cytologically or histologically verified by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
ICD-7	Läge	Kön	All ages	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
196	Skelettet	M	100	-	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	99	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	100	96	98
		F	97	100	-	50	-	-	100	-	100	90	100	97	100	100	99	99	99	98	89
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	97	97	100	99	100	100	100	100	99
		F	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
201	Hodgkins sjukdom	M	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	99	100	-	100	-	100	100	-	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100
		F	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	96	-	-	-	-	-	-	-	100	100	92	87	100	98	97	98	98	96	91
		F	97	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	94	97	95	91
204	Lymfatisk leukemi	M	90	88	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	85	86	86	93	90	87	89
		F	90	93	100	100	100	100	100	100	-	100	100	88	100	89	91	93	88	81	85
205	Myeloisk leukemi	M	98	100	100	-	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	96	100	100
		F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100
206	Monocyt leukem	M	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	-	100	100	-	100	-
		F	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	95	100	-	-	-	-	100	-	100	67	100	100	100	100	100	100	75	100	100
		F	98	-	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83
208	Polycytomia vera	M	89	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	75	83	93	100	93	67	100	33
		F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	80	94	91	100	83	100	67
209	Myelofibros	M	100	-	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	92	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	88	73

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 9 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 9 : Percentage of cases found incidentally at autopsy by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
ICD-7	Läge	Kön	All ages	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
140 -	209 Samtliga lägen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
140	Läpp	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Tunga	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Spottkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Munbotten	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Mellansvalget	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Näs-svalgrummet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
151	Magsäck	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	2	2	3	5
152	Tunntarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	-
153	Tjocktarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
154	Ändtarm och anus	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
155	Lever och gallvägar	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	4	1	3	11	15
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	3	14
156	Levercancer, ospecificerat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bukspottkörtel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	4	3	16
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	2	6
158	Bukhinna	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 9 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 9 : Percentage of cases found incidentally at autopsy by site, sex and age at diagnosis

ICD-7	Läge	Kön	Ålder vid diagnos																		
			All ages	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Struphuvud och stämband	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5
		F	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-
163	Lungcancer, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
173	Moderkaka (placenta)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	3
176	Kvinnligt könsorgan	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
178	Testikel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Manligt könsorgan	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Njure och njurbäcken	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	2	1	5	6
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10
181	Urinvägar utom njure	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
190	Malignt melanom i huden	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	-	4	-	27
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	8	13
194	Sköldkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	7
195	Endokrin körtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11

(Continued)

Tabell 9 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön och ålder vid diagnos
Table 9 : Percentage of cases found incidentally at autopsy by site, sex and age at diagnosis

[illegible]

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 10 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 10 : Percentage of cases found incidentally at autopsy site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Län	05 Östergötland	10 Blekinge	1480 Göteborg city	21 Gävleborg
01 Stockholm	06 Jönköping	12 Skåne	17 Värmland	22 Västernorrland
0180 Stockholm	07 Kronoberg	1280 Malmö city	18 Örebro	23 Jämtland
03 Uppsala	08 Kalmar	13 Halland	19 Västmanland	24 Västerbotten
04 Södermanland	09 Gotland	14 Västra götaland	20 Dalarna	25 Norrbotten

		Län																										
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	0180	03	04	05	06	07	08	09	10	12	1280	13	14	1480	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
140 -	209 Samtliga lägen	M	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	
140	Läpp	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	Tunga	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
142	Spottkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
143	Munbotten	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
145	Mellansvalget	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
146	Näs-svalgrummet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
147	Svalget bakom struphuvudet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	Matstrupe	M	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	
151	Magsäck	M	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	3	-	-	8	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	6	-	9	-	-	-	-	-	-	-	
152	Tunntarm	M	1	-	-	13	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	20	-	-	-	-	-	
153	Tjocktarm	M	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	4	1	3	-	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
154	Ändtarm och anus	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	Lever och gallvägar	M	4	4	5	8	-	3	-	-	-	-	-	10	14	-	-	-	14	6	7	18	-	-	-	-	-	
		F	3	1	-	-	-	-	-	8	-	-	17	6	-	-	1	-	-	-	7	25	-	-	-	8	-	

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 10 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 10 : Percentage of cases found incidentally at autopsy site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Län	05 Östergötland	10 Blekinge	1480 Göteborg city	21 Gävleborg
01 Stockholm	06 Jönköping	12 Skåne	17 Värmland	22 Västernorrland
0180 Stockholm	07 Kronoberg	1280 Malmö city	18 Örebro	23 Jämtland
03 Uppsala	08 Kalmar	13 Halland	19 Västmanland	24 Västerbotten
04 Södermanland	09 Gotland	14 Västra götaland	20 Dalarna	25 Norrbotten

		Län																										
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	0180	03	04	05	06	07	08	09	10	12	1280	13	14	1480	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
156	Levercancer, ospecificerat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bukspottkörtel	M	3	2	4	-	5	-	-	-	-	-	-	3	8	14	2	-	-	8	13	9	8	-	-	-	-	-
		F	2	1	2	-	-	-	-	17	-	-	-	1	7	16	1	-	10	11	9	-	-	-	-	-	-	-
158	Bukhinna	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Struphuvud och stämband	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	2	2	2	1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	3	2	3	2	2	-	3	-	-	-	-	-	4
		F	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	1	3	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5
163	Lungcancer, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Moderkaka (placenta)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	5	-	6	-	-	-	-	-
176	Kvinnligt könsorgan	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
178	Testikel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Manligt könsorgan	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Njure och njurbäcken	M	2	3	2	-	4	-	-	10	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	4	-	-	-	-	6	-
		F	2	1	-	-	-	7	4	-	-	-	13	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Urinvägar utom njure	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 10 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 10 : Percentage of cases found incidentally at autopsy site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Län	05 Östergötland	10 Blekinge	1480 Göteborg city	21 Gävleborg
01 Stockholm	06 Jönköping	12 Skåne	17 Värmland	22 Västernorrland
0180 Stockholm	07 Kronoberg	1280 Malmö city	18 Örebro	23 Jämtland
03 Uppsala	08 Kalmar	13 Halland	19 Västmanland	24 Västerbotten
04 Södermanland	09 Gotland	14 Västra götaland	20 Dalarna	25 Norrbotten

		Län																														
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	0180	03	04	05	06	07	08	09	10	12	1280	13	14	1480	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
190	Malignt melanom i huden	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	2	-	-	5	-	-	-	27	-	-	-	1	-	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	6	-	-	-	-	
194	Sköldkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	
195	Endokrin körtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	Skelettet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	4	4	-	3	-	-	14	-	-	-	-	-	-	
		F	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	Hodgkins sjukdom	M	1	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	1	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	Lymfatisk leukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	Myeloisk leukemi	M	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	Monocyt leukem	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 10 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 10 : Percentage of cases found incidentally at autopsy site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Län	05 Östergötland	10 Blekinge	1480 Göteborg city	21 Gävleborg
01 Stockholm	06 Jönköping	12 Skåne	17 Värmland	22 Västernorrland
0180 Stockholm	07 Kronoberg	1280 Malmö city	18 Örebro	23 Jämtland
03 Uppsala	08 Kalmar	13 Halland	19 Västmanland	24 Västerbotten
04 Södermanland	09 Gotland	14 Västra götaland	20 Dalarna	25 Norrbotten

		Län																										
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	0180	03	04	05	06	07	08	09	10	12	1280	13	14	1480	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208	Polycytemia vera	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	Myelofibros	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 11 : Andelen (%) individer av antalet tumörer

Table 11 : Number of persons in relation to the number of tumors (%)

		Ålder vid diagnos																				
ICD-7	Läge	Kön	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
140 -	- 209 Samtliga lägen	M	99,4	99,5	99,1	99,3	99,2	99,2	99,2	99,2	99,1	99,2	99,2	99,1	98,6	97,8	98,1	97,8	97,8	98,2	98,1	98,0
		F	99,0	98,9	98,8	98,9	98,8	98,8	98,9	98,9	98,6	98,7	98,5	98,3	97,8	96,1	96,1	96,0	96,0	96,2	95,8	95,2
140	Läpp	M	99,2	99,2	100,0	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	97,8	100,0	97,7	100,0	98,8	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	97,5	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,3	98,5
141	Tunga	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0	100,0	99,3	98,7
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
142	Spottkörtel	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3	100,0	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	100,0	100,0	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
143	Munbotten	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
144	Munnen, annan eller ospecific	M	98,4	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5	100,0	100,0	98,8	100,0	100,0	98,9	100,0
		F	97,4	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1	95,1	100,0	100,0	98,8	98,7	100,0	100,0	98,9	100,0	98,7	98,9	100,0
145	Mellansvalget	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1	100,0	97,6	95,6	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,7	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2
146	Näs-svalgrummet	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
147	Svalget bakom struphuvudet	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
		F	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0
150	Matstrupe	M	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0	100,0	99,6	99,6	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0	100,0	99,7	100,0	100,0	99,7
		F	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
151	Magsäck	M	99,9	99,9	99,9	99,9	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	99,8	99,8	99,6	99,8	97,6	99,8	99,0	99,3
		F	100,0	100,0	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	98,9	99,2	100,0	99,7	100,0	100,0	99,7
152	Tunntarm	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,1	100,0	100,0	99,3	99,2	100,0	100,0	99,3	90,7	95,3	94,0	98,0	77,6
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0	96,2	99,1	97,5	86,6	99,2	99,2	96,9	96,4
153	Tjocktarm	M	98,2	98,4	97,4	97,6	97,7	97,6	97,9	97,7	97,7	97,3	96,8	97,4	97,9	96,6	96,3	95,5	96,9	96,9	97,1	97,4
		F	98,6	98,0	98,5	98,4	97,8	98,1	98,2	97,4	97,6	98,0	97,1	98,0	97,4	96,3	95,4	95,8	96,5	97,0	97,2	97,0
154	Ändtarm och anus	M	99,4	99,4	99,4	99,4	100,0	99,2	99,6	99,7	99,0	98,5	99,4	99,7	99,6	99,4	98,7	99,6	99,8	99,8	99,1	99,4
		F	99,4	99,8	100,0	99,8	99,5	99,9	99,1	99,8	99,8	99,7	99,3	99,7	99,4	98,8	97,3	99,6	99,6	99,7	99,2	99,6
155	Lever och gallvägar	M	99,8	100,0	100,0	99,5	99,5	100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0	97,3	100,0	99,6	100,0	99,8	99,8
		F	99,6	100,0	99,8	100,0	99,8	99,8	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	98,8	100,0	99,8	100,0	99,5
156	Levercancer, ospecificerat	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
157	Bukspottkörtel	M	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0	97,4	99,6	98,7	99,8
		F	100,0	100,0	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	99,6
158	Bukhinna	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 11 : Andelen (%) individer av antalet tumörer

Table 11 : Number of persons in relation to the number of tumors (%)

		Ålder vid diagnos																				
ICD-7	Läge	Kön	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
160	Mellanöra, näshåla och bihålo	M	100,0	100,0	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	94,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,6	100,0	100,0	100,0
161	Struphuvud och stämband	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	98,6	99,4	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0	100,0	100,0
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	99,3	99,7	99,6	99,4	99,5	99,2	99,6	99,2	99,0	99,4	99,5	99,8	99,6	97,8	99,2	98,9	98,6	99,6	99,2	99,4
		F	99,8	99,1	99,5	99,7	99,5	99,9	99,4	99,6	99,5	99,3	99,7	99,4	98,9	96,4	97,9	98,8	98,2	99,5	99,4	99,6
163	Lungcancer, ospecificerad	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
164	Bindvävsrum mellan lungorna (	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	-	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
170	Bröst	M	100,0	100,0	100,0	100,0	94,6	96,6	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	97,7	97,8	97,3	97,4	97,6	97,8	98,0	97,8	97,7	97,4	97,4	96,8	96,0	93,7	93,0	91,6	91,6	91,6	90,8	88,6
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	99,6	99,6	98,9	99,5	99,8	99,5	99,8	99,3	99,8	99,8	99,8	100,0	99,3	96,3	98,3	99,4	100,0	100,0	98,8	99,8
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	99,9	99,7	99,9	100,0	100,0	100,0	99,8	99,9	99,8	100,0	99,8	100,0	100,0	99,4	97,8	100,0	98,8	99,7	99,8	99,9
173	Moderkaka (placenta)	F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
174	Livmoder, ospecificerat ställ	F	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,5	100,0	99,1	100,0
175	Äggstock, äggledare och breda	F	98,8	97,8	98,8	99,6	99,7	99,9	99,5	99,8	99,6	99,6	98,6	98,6	99,5	97,2	99,2	99,5	99,7	99,7	99,8	99,4
176	Kvinnligt könsorgan	F	98,7	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,5	96,2	99,6	100,0	99,5
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	100,0	100,0	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	99,8	99,9	99,7	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	100,0
178	Testikel	M	99,0	100,0	100,0	99,0	99,6	97,7	97,7	98,8	99,3	99,2	99,2	95,9	96,2	99,1	98,4	94,4	97,1	94,0	97,2	98,8
179	Manligt könsorgan	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
180	Njure och njurbäcken	M	98,8	99,4	98,9	99,0	98,0	98,8	98,8	99,5	99,0	98,0	99,0	99,4	98,4	95,8	95,8	97,8	97,3	95,4	97,8	98,1
		F	99,4	99,8	99,4	99,3	99,3	98,6	99,1	100,0	98,6	98,7	98,5	99,1	97,9	96,0	98,7	97,7	96,3	97,5	94,9	97,1
181	Urinvägar utom njure	M	100,0	99,7	99,7	99,7	99,5	99,5	99,6	99,6	98,8	99,6	99,5	99,6	99,2	98,7	99,5	99,3	99,3	99,2	99,2	99,1
		F	99,3	99,8	99,6	99,8	99,2	98,7	99,5	99,7	99,5	100,0	98,2	99,2	98,5	98,5	97,7	98,9	99,2	99,6	99,0	99,5
190	Malignt melanom i huden	M	99,2	99,4	99,4	99,7	99,1	98,9	98,8	99,1	99,3	99,0	98,7	98,5	98,1	98,0	98,1	97,7	97,4	97,4	96,9	96,2
		F	99,7	99,3	99,2	99,4	99,5	99,3	99,0	99,5	98,2	99,7	99,1	98,7	99,2	98,6	98,6	98,9	96,6	98,6	98,3	98,5
191	Tumör i huden, ej malignt mel	M	95,6	96,4	94,7	95,6	94,7	95,4	94,7	94,6	94,4	95,6	94,7	94,3	92,1	88,2	91,3	89,2	87,6	90,4	89,5	89,2
		F	98,1	98,1	98,6	96,6	96,0	95,7	96,5	96,8	96,1	96,3	96,3	95,6	94,9	91,5	91,4	93,2	93,3	91,5	91,1	91,3
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	100,0	100,0	96,9	98,4	98,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	98,5	93,3	98,7	100,0	100,0
		F	100,0	92,9	97,1	98,3	100,0	98,2	97,9	100,0	95,4	100,0	100,0	98,6	100,0	98,3	100,0	98,4	98,6	100,0	100,0	100,0
193	Hjärna och övriga nervsysteme	M	100,0	100,0	98,9	99,1	99,4	100,0	100,0	100,0	99,8	99,8	99,7	99,8	99,8	98,4	98,7	98,5	98,4	98,4	99,9	99,5
		F	99,1	99,3	98,7	99,9	99,9	99,7	99,9	99,7	99,8	100,0	99,9	100,0	99,5	99,4	96,6	97,7	97,4	99,4	99,7	98,3
194	Sköldkörtel	M	100,0	100,0	98,8	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0	96,7	98,9	100,0	98,2	99,2	100,0	97,4
		F	100,0	98,6	99,2	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	99,6	100,0	98,8	97,0	97,7	95,7	100,0	98,3	95,7	100,0	98,0
195	Endokrin körtel	M	99,6	98,8	92,1	100,0	99,1	96,9	96,6	92,8	96,4	100,0	100,0	97,9	95,0	100,0	98,1	92,5	97,8	99,6	100,0	99,0
		F	99,8	99,8	98,2	99,7	99,8	100,0	98,4	99,6	98,5	99,8	98,5	99,4	100,0	98,2	98,1	97,3	99,8	99,1	100,0	100,0
196	Skelettet	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,4

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 11 : Andelen (%) individer av antalet tumörer

Table 11 : Number of persons in relation to the number of tumors (%)

		Ålder vid diagnos																				
ICD-7	Läge	Kön	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	99,4	100,0	99,3	99,4	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	93,9	100,0	99,1	100,0	100,0
199	Övriga och ospecificerade lok	M	99,9	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	99,9	99,9	99,7	100,0	98,3	99,7	100,0	98,9	99,3	100,0	99,5	100,0
		F	99,9	100,0	99,9	100,0	100,0	99,8	100,0	99,9	99,6	99,9	99,8	99,5	99,9	99,7	100,0	99,5	99,0	99,9	99,6	99,9
200	Lymfatisk och blodbildande vä	M	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	99,9	100,0	99,0	94,5	92,8	90,6	94,8	93,0	99,2	99,7	99,1
		F	100,0	99,8	100,0	99,8	100,0	98,6	100,0	100,0	99,9	100,0	99,8	98,8	97,7	92,2	98,4	93,9	98,1	96,4	99,6	100,0
201	Hodgkins sjukdom	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,9	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,7	100,0	100,0	100,0
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,7	98,8	100,0	95,1	94,6	94,7	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,6	100,0	100,0	100,0	95,5	100,0
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0	100,0	97,8	99,4	99,7	100,0	100,0	95,6	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
204	Lymfatisk leukemi	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,5	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	96,3	97,1	94,6	97,4	100,0	99,7	100,0	99,7
		F	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,1	100,0	100,0	100,0	100,0	90,4	96,2	97,6	96,3	92,9	100,0	100,0	100,0
205	Myeloisk leukemi	M	100,0	100,0	100,0	99,5	96,3	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	99,6	100,0	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	99,6	99,3	100,0
		F	100,0	100,0	99,5	100,0	99,5	99,5	100,0	99,5	99,0	99,5	100,0	100,0	100,0	97,4	97,8	100,0	97,6	100,0	100,0	100,0
206	Monocyt leukem	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
207	Annan leukemi och ospecificer	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	100,0	100,0	76,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
208	Polycythemia vera	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
209	Myelofibros	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,2	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5	100,0

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2012

Tabell 12 : Number of tumors in situ

Table 12 : Number of tumors in situ

		Ålder vid diagnos																				
ICD-7	Läge	Kön	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
140 -	- 209 Samtliga lägen	M	1 640	1 764	1 945	2 064	2 244	2 371	2 425	2 641	2 731	2 813	3 044	3 581	4 016	4 029	4 098	4 510	4 991	4 852	5 737	5 841
		F	5 433	5 877	6 132	6 343	6 617	6 949	7 033	7 167	7 470	7 566	7 704	8 446	9 015	9 472	10 032	10 706	10 845	10 853	12 492	12 957
153	Tjocktarm	M	116	182	232	274	263	289	263	288	355	386	401	544	618	605	607	644	751	606	619	600
		F	106	157	239	232	244	229	265	242	309	347	365	427	518	505	446	493	492	443	477	496
154	Ändtarm och anus	M	131	156	182	211	223	200	211	210	196	243	259	327	353	300	352	378	370	381	373	366
		F	123	155	206	221	211	236	261	213	260	281	268	325	351	312	302	337	355	331	374	311
170	Bröst	F	574	604	642	557	544	626	579	630	644	658	688	815	894	878	896	1 204	1 246	1 192	1 330	1 443
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	2 663	2 872	2 862	2 948	3 102	3 187	3 095	3 207	3 236	3 299	3 082	3 140	3 264	3 650	4 027	3 991	3 729	3 699	4 191	4 534
175	Äggstock, äggledare och breda	F	263	267	237	219	267	274	271	243	198	242	254	269	229	237	286	265	262	310	270	299
176	Kvinnligt könsorgan	F	143	130	148	165	187	174	168	195	170	160	189	214	201	188	196	178	226	215	228	264
190	Malignt melanom i huden	M	169	194	236	199	272	220	247	262	279	279	344	380	459	510	558	630	729	837	1 156	1 296
		F	246	263	298	280	304	292	277	319	373	381	416	515	512	593	658	672	809	942	1 251	1 324
191	Tumör i huden, ej malignt mel	M	1 224	1 232	1 295	1 380	1 486	1 662	1 704	1 881	1 901	1 905	2 040	2 330	2 586	2 614	2 581	2 858	3 141	3 028	3 589	3 579
		F	1 315	1 429	1 500	1 721	1 758	1 931	2 117	2 118	2 280	2 198	2 442	2 741	3 046	3 109	3 221	3 566	3 726	3 721	4 371	4 286

Referenser

1. Mattsson B. Cancer Registration in Sweden. Academic thesis. Stockholm: Karolinska Institute, 1984.
2. Barlow L, Westergren K, Holmberg L, Talbäck M. The completeness of the Swedish Cancer Register – a sample survey for year 1998. *Acta Oncologica* 2009;48(1):27–33.
3. Boniol M and Heanue M. Age-standardisation and denominators. In: Curado MP, Edwards B, Shin HR, Storm H, Ferlay J, Heanue M and Boyle P, editors. *Cancer Incidence in Five Continents, Volume IX*. IARC Scientific Publications No. 160. International Agency for Research on Cancer, Lyon 2007. Chapter 7, p. 99–101.
4. Statistics Sweden. (<http://www.scb.se>)
5. Dödsorsaksregistret [databas]. Stockholm: Socialstyrelsen. Sökning gjord 2010-12-03.
6. Cancerregistret [databas]. Stockholm: Socialstyrelsen. (<http://www.socialstyrelsen.se/uppfoljning/statistik/statistikdatabas>)
7. Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Bray F, Gjerstorff M L, Klint Å, Køtlum J E, Ólafsdóttir E, Pukkala E and Storm H H (2009). *NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Prediction in the Nordic Countries, Version 3.5*. Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society (<http://www.ancr.nu>).
8. Jernbeck J et al: Basalcellscancer. Klinisk utvärdering av histologisk gradering av aggressivitet. *Läkartidningen*, volym 85, nr 42, sid 3467 – 70, 1988.

Appendix 1

The major exceptions from the codes in the 7th WHO revision

(WHO/HS/Canc/24.1. Code for anatomical location).

- Läge 158 (peritoneum) omfattar endast maligna mesoteliom i peritoneum, medan metastatic lesions kodas på läge 199.3.
- Läge 159 (matsmältningsorgan, ospecificerat) har inte används. Fallen kodas istället på läge 199.
- Läge 162.2 (lungsäck) omfattar endast maligna mesoteliom.
- Läge 164 (mediastinum). Thymomas kodas på läge 195.2.
- Läge 172 (livmoderkropp) omfattar endast maligna epiteliala tumörer i slemhinnorna.
- Läge 173 omfattar endast maligna chorionic lesions (invasive mole and choriocarcinoma).
- Läge 174 (livmoder,ospecificerat ställe) omfattar endast carcinom i både livmoderkropp och livmoderhals (eller carcinom uteri NOS), och uterine sarcomas.
- Läge 180.1 och 181 omfattar papillom i urinvägarna.
- Läge 191. Basaliom är exkluderade.
- Läge 193.0 och .1 inkluderar histologist benigna tumörer i det centrala nervsystemet och hjärnhinnorna.
- Läge 193.3 innehåller maligna tumörer i perifera nerver och det sympatiska nervsystemet, oberoende av eventuell organanslutning.
- Läge 195 (övriga endokrina körtlar) inkluderas alla godartade och elakartade tumörer. Förutom adrenokortikala adenom som inkluderats endast om de har endokrinologiska symptom.
- Läge 197 omfattar mjukdelssarcom utan anslutning till organ och retroperitoneal tumurer (197.4).
- Läge 198 (lymph nodes) har inte används. Metastaser har kodats på läge 199.

Appendix 2

Ålder	Den svenska populationen år 2000	Världspopulationen *
	%	%
0-4	5.3	12.0
5-9	6.9	10.0
10-14	6.4	9.0
15-19	5.7	9.0
20-24	5.9	8.0
25-29	6.7	8.0
30-34	7.2	6.0
35-39	6.9	6.0
40-44	6.6	6.0
45-49	6.6	6.0
50-54	7.6	5.0
55-59	6.3	4.0
60-64	4.9	4.0
65-69	4.3	3.0
70-74	4.1	2.0
75-79	3.9	1.0
80-84	2.6	0.5
85+	2.3	0.5

* Cancer Incidence in Five Continents, Volume IX, IARC, Lyon 2007

Exempel på åldersstandardisering

Den åldersstandardiserade incidensen beräknas formellt:

$$\text{Åldersstandardiserad incidens} = \sum_i \left(\frac{d_i w_i}{y_i} \right)$$

Där i representerar varje åldersgrupp d är antalet fall i varje åldersgrupp, y är befolkningsstorleken den i : te åldersgruppen och w är

I tabellerna nedan följer ett exempel på hur den åldersstandardiserade incidensen för prostatacancer beräknas för Stockholms och Södermanlands län. Antalet tumörer i cancerregistret per 5-årsgrupp redovisas i kolumnen *Antal tumörer*. Medelbefolkningen per 5-årsgrupp enligt SCB (referens) redovisas i kolumnen *Medelbefolkning*. Incidensen redovisas i kolumn *inc per 100 000*.

1. Beräkning av incidensen per 5-årsgrupp. Exempel på beräkningen för åldersgruppen 45-49 år i Stockholms län $19/76\,304 = 0,000249$. Den incidens som erhålls är antalet tumörer per individ. Av pedagogiska skäl brukar *incidensen* multipliceras med 100 000 , $0,000249 \times 100\,000 = 24,9$, och uttryckas som 24,9 tumörer per 100 000 individer.
2. I kolumnen Befolkningen år 2000 redovisas andelen individer (*vikterna*) av den totala befolkningen per 5-årsgrupp. T.ex. år 2000 var antalet individer i 5-årsgruppen 45-49 år, 586 002 st och befolkningen (källa) i Sverige var 8 872 109 individer. Vikten för 5-årsgruppen 45-49 år blir då

$586\,002 / 8\,872\,109 = 0,066$. För gruppen 45-49 år *viktas* därför kvoten 24,9 genom att multipliceras med vikten för åldersgruppen.

3. $24,9 \times 0,066 = 1,64$.
4. De viktade incidenserna läggs sen ihop till en total genom att alla värden i kolumnen *viktade inc* summeras till **209,51** som är den ålderstandardiserade incidensen för prostatacancer i Stockholms län.

Den vanliga incidensen per 100 000 räknas ut längs ner i varje tabell med hjälp av totala antalet tumörer och den totala medelbefolkningen för respektive län.

Observera att Södermanlands län har en högre oviktad incidens, 197,6 per 100 000 jämfört med Stockholm som har en incidens på 174,1. Den ålderstandardiserade incidensen är högre för Stockholm än för Södermanland. 209,5 jämfört med 176,1. Ålderstandardiserade trender görs för att kunna jämföra olika grupper med varandra och för att kunna skatta trender oberoende av befolkningens åldersammansättning.

Beräkning av tumörincidensen och den ålderstandardiserade tumörincidensen för prostatacancer i Stockholms län år 2011

Åldersgrupp	Antal tumörer	Medelbefolkning	Inc per 100 000	Befolkningen år 2000	Viktade inc
0-4	0	73 421	0	0,053	0,00
5-9	0	64 461	0	0,069	0,00
10-14	0	55 019	0	0,064	0,00
15-19	0	64 333	0	0,057	0,00
20-24	0	66 291	0	0,059	0,00
25-29	0	73 853	0	0,067	0,00
30-34	0	78 910	0	0,072	0,00
35-39	1	82 482	1,2	0,069	0,08
40-44	1	77 920	1,3	0,066	0,08
45-49	19	76 304	24,9	0,066	1,64
50-54	82	63 802	128,5	0,074	9,51
55-59	179	57 103	313,5	0,063	19,75
60-64	311	55 865	556,7	0,049	27,28
65-69	436	52 068	837,4	0,043	36,01
70-74	317	32 707	969,2	0,041	39,74
75-79	200	22 041	907,4	0,039	35,39
80-84	143	15 466	924,6	0,026	24,04
85+	98	14 100	695,1	0,023	15,99
Summa	1 787	1 026 142		1,000	209,51
$\frac{1\,787}{1\,026\,142} \cdot 100\,000 = 174,1$					

Beräkning av tumörincidensen och den ålderstandardiserade tumörincidensen för prostatacancer i Södermanlands län år 2011

Åldersgrupp	Antal tumörer	Medelbefolkning	Inc per 100 000	Befolkningen år 2000	Viktade
0-4	0	7 886	0	0,053	0,00
5-9	0	7 867	0	0,069	0,00
10-14	0	7 422	0	0,064	0,00
15-19	0	9 305	0	0,057	0,00
20-24	0	8 643	0	0,059	0,00
25-29	0	7 096	0	0,067	0,00
30-34	0	7 326	0	0,072	0,00
35-39	0	8 284	0	0,069	0,00
40-44	0	9 221	0	0,066	0,00
45-49	2	9 554	20,9	0,066	1,38
50-54	6	8 651	69,4	0,074	5,13
55-59	13	8 544	152,2	0,063	9,59
60-64	49	9 603	510,3	0,049	25
65-69	61	9 244	659,9	0,043	28,38
70-74	49	6 371	769,2	0,041	31,54
75-79	45	4 447	1 012,0	0,039	39,47
80-84	29	3 098	936,2	0,026	24,34
85+	13	2 539	512	0,023	11,78
Summa	267	135 096		1,000	176,61
$\frac{267}{135\,096} \cdot 100\,000 = 197,6$					

Appendix 3

Rapportering till Cancerregistret

Enligt Socialstyrelsens föreskrift, (SOSFS 2006:15), framgår att var och en som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården är skyldig att lämna uppgifter om nyupptäckta, maligna och vissa benigna tumörer till cancerregistret. Patologer och cytologer rapporterar varje tumör som diagnosticerats från kirurgiskt avlägsnade vävnader, biopsier, cytologiska prover, benmärgsaspirat och obduktioner. Endast personer som är folkbokförda i Sverige ingår i cancerregistret. Registreringen av nya cancerfall görs av Regionalt Cancercentrum (RCC) inom respektive sjukvårdsregion (Stockholm - Gotland, Uppsala - Örebro, Linköping, Lund - Malmö, Göteborg och Umeå). Den regionala organisationen bidrar till en nära kontakt till den rapporterande läkaren vilket underlättar korrigeringar och kontroller. Senast den 31 oktober varje år skickar RCC in data till det nationella cancerregistret. Denna publikation omfattar statistik om fall av cancer diagnosen under 2012. Det sjukhus eller den klinik som ställer diagnosen anmäler tumören till Regionalt Cancercentrum, RCC. Oftast fastställs den histopatologiska diagnosen av patolog/cytolog som också skickar in en anmälan till RCC. I det fall det kommer in endast en anmälan så görs efterforskning på den anmälan som saknas. Anmälningarna sammanställs av RCC. Om den saknade anmälan inte kommer in kan uppgifterna hämtas från sjukhusjournalen. Om journaluppgifterna inte heller är tillgängliga görs en sammanställning på de uppgifter som finns. Andelen fall med ett ofullständigt underlag är mindre än två procent. Ett mindre antal av tumörerna rapporteras för sent för att hinna sammanställas och registreras i cancerregistret. Dessa fall är få, några hundra rapporteras till nästa år. En uppskattning av underrapportering av cancer kan göras genom att jämföra Cancerregistret och Dödsorsaksregistret.

Innehåll i Cancerregistret

- Personnummer. år månad dag
- Kön
- Församlingskod (län, kommun, Församling)
- Sjukhus där diagnosens fastställdes
- Klinik där diagnosens fastställdes
- Patologienhet/cytologienhet
- Preparatnummer inklusive det år preparatet fick numret
- Tumörens läge enligt ICD:
 - ICD-7 1958–1986 (WHO/HS/CANC/24.1)
 - ICD-9 1987–1992 (WHO 9th revision 1976)
 - ICD-O/2 1993–2004 (2nd Edition. WHO Geneva 1990)
 - ICD-O/3 2005-w (3rd Edition. WHO Geneva 2000) kodversionerna är översatta till icd7 för att möjliggöra längre tidsserier

Morfologisk diagnos (WHO/HS/CAN/C24.1 Histology Code). From 1993 according to ICD-O/2 (2nd Edition. WHO Geneva 1990) and from 2005 according to ICD-O/3 (3rd Edition. WHO Geneva 2000) kodversionerna är översatta till C24.1 för att möjliggöra längre tidsserier

- Serienummer för tumören
- Malignitet(yes/no)

- Stadium enligt
 - FIGO (<http://www.figo.org>) tumörutbredning för gynekologiska tumörer TNM (TNM Classification of Malignant Tumors, 7th Edition, 2002, Leslie H. Sobin and Ch. Wittekind)
 - tumörutbredning för övriga tumörer (förutom hjärna och centrala nervsystemet, lymfom, leukemier och metastaser där primärtumör inte är känd)
- Grund för TNM (kliniskt eller patologiskt):
 - 1 klinisk undersökning
 - 2 röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR, CT eller motsvarande undersökning
 - 3 provexcision eller operation med histopatologisk undersökning
 - 4 obduktion med histopatologisk undersökning
 - 5 cytologisk undersökning
 - 6 operation utan histopatologisk undersökning
 - 7 obduktion utan histopatologisk undersökning
 - 8 annan laboratorieundersökning
- diagnosdatum (År, månad, dag)
- Obduktionsfynd
 - 1 tumören är ett oväntat obduktionsfynd och inte känd före dödsfallet
 - 2 tumören känd sedan tidigare
- Data från dödsorsaksregistret
- Dödsdatum (År, månad, dag)
- Underliggande dödsorsak enligt:
 - ICD-7 1958–1968
 - ICD-8 1969–1986
 - ICD-9 1987–1996
 - ICD-10 1997–w