

Kunskapsstyrning
Lena Hansson
lena.hansson@socialstyrelsen.se

Rättelseblad

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 - Stöd för styrning och ledning (artikelnr 2014-4-2)

På sid 7, Vård vid bröstcancer, efter *Det är sedan tidigare standard att förbehandla kvinnor med bröstcancer i stadium III och IV... infogas (de med isolerade hudmetastaser i anslutning till bröstet).*

Sid 8, första meningen, texten *dels för att minska risken för återfall, dels i palliativt syfte* ersätts med *eftersom dessa behandlingar minskar risken för återfall och dödlighet samt förlänger överlevnaden.*

Sid 8, tredje stycket, efter *Det innebär att man ger behandling vid färre tillfällen men med högre stråldos* infogas *per dag.*

På sid 51, Motivering till rekommendationerna, första meningen ersätts med: *Enligt Socialstyrelsens rekommendation kan hälso- och sjukvården erbjuda docetaxel som palliativ behandling till personer med skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Enligt Socialstyrelsens rekommendation kan hälso- och sjukvården erbjuda enzalutamid efter cytostatikabehandling som palliativ behandling till personer med skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer.*

Rekommendationsrutan på sid 52 ersätts med nedanstående rekommendationsruta. Första punkten har ändrats från; *erbjuda docetaxel eller enzalutamid som palliativ behandling... till; erbjuda docetaxel som palliativ behandling.* Andra punkten har ändrats från; *erbjuda abirateron som palliativ behandling... till; erbjuda abirateron eller enzalutamid som palliativ behandling...*

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården kan

- erbjuda docetaxel som palliativ behandling till personer med skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer (*prioritet 6*)
- erbjuda abirateron eller enzalutamid som palliativ behandling till personer med symtomgivande skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer och som efter cytostatikabehandling inte längre svarar på docetaxel (*prioritet 6*)
- erbjuda abirateron som tillägg till prednison som palliativ behandling till personer med symtomgivande skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer före cytostatikabehandling (*prioritet 7*)
- erbjuda radium-223 som palliativ behandling till personer med symtomgivande skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer (*prioritet 7*).

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall

- erbjuda cabazitaxel som andra linjens palliativa behandling till personer med symtomgivande skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer som inte längre svarar på behandling med docetaxel (*prioritet 8*).

På sid 146, bilaga 1, tillstånds- och åtgärdslistan för prostatacancer. För raderna P041a och P041 b ska hänvisningen till raderna P051a och P051b i sista kolumnen strykas eftersom dessa har utgått.