

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Översyn 2017



Uppdaterade rekommendationer

Socialstyrelsen har 2017 genomfört en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL. Syftet är att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Översynen har lett till ett fåtal uppdaterade rekommendationer om läkemedelsbehandling respektive träning vid KOL. I samband med översynen har även några förtydliganden av tillstånd och åtgärder gjorts.

Stärkt evidens för träning i anslutning till akut exacerbation vid KOL

Hälso- och sjukvården bör

- erbjuda ledarstyrd träning i anslutning till akut exacerbation till personer med KOL och FEV1 < 80 procent (prioritet 3).

Stärkt evidens för viss läkemedelsbehandling vid KOL

Hälso- och sjukvården bör

- erbjuda personer med KOL och otillräcklig effekt av långverkande antikolinergika tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24-timmars duration (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

- erbjuda personer med KOL och otillräcklig effekt av långverkande antikolinergika tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 12-timmars duration (prioritet 6).

Nytt arbetssätt för att hålla riktlinjerna aktuella

För att se till att riktlinjerna för vård vid astma och KOL är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap genomför Socialstyrelsen regelbundna översyner. Dessa baseras på ett nytt arbetssätt för att hålla nationella riktlinjer aktuella. Arbetssättet utgår från en förvaltningsplan där vi specificerar de rekommendationer där kunskapsläget förväntas ändras och där en uppdaterad litteratursökning behövs. Vid behov uppdateras därefter aktuell rekommendation och tillhörande underlag.

Besök vår webbplats för mer information

De nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL finns på socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se.