

Abortstatistik 2014

Statistics on induced abortions 2014

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till alternativaformat@socialstyrelsen.se.

Artikelnummer 2015-9-4
Publicerad www.socialstyrelsen.se, september 2015

Förord

I denna publikation presenteras statistik över inducerade aborter i Sverige utförda under 2014 samt vissa uppgifter om aborter utförda 1983–2014. Syftet med rapporten är att tillhandahålla statistik för allmän samhällsinformation. Uppgiftslämnare är sjukhus, öppenvårdsenheter och kliniker som har tillstånd att utföra abort. Rapporten är sammanställd av Maria Öman, Ellen Lundqvist och Karin Gottvall, Socialstyrelsen.

Jesper Brohede
Enhetschef
Statistik 2
Avdelningen för statistik och jämförelser

Innehåll

Förord	3
Innehåll	5
Sammanfattning	7
Bakgrund	8
Lagstiftning.....	8
Att ange graviditetslängd	8
Insamlingsstopp och revidering av statistikinsamlingen	8
Tidigare publicerad statistik.....	9
Metod	10
Datainsamling	10
Tillförlitlighet.....	10
Resultat	12
Aborter och kvinnans ålder	12
Upprepade aborter	13
Aborter och graviditetslängd	13
Abortmetoder	15
Aborter i relation till födda barn	16
Definitioner och ordförklaringar.....	17
Bilaga 1, Tabeller 1–10	18
Bilaga 2, Blankett, Rapport över inducerade aborter	27

Sammanfattning

En ny rutin för datainsamling till abortstatistiken infördes den 1 januari 2014. Samtidigt förändrades statistikens innehåll. Uppgifter om tidigare förlossningar togs bort och övriga variabler kategoriserades.

Under 2014 rapporterades drygt 36 600 aborter till Socialstyrelsen, vilket motsvarar 20,2 per 1 000 kvinnor i åldersgruppen 15–44 år. År 2012 var aborttalet 20,7 per 1 000 kvinnor.

Aborter är vanligast förekommande bland kvinnor i åldersgruppen 20–24 år (29,6 per 1 000). Aborttalet bland tonåringar har minskat under de senaste åren, från 25,4 per 1 000 under år 2006 till 18,8 per 1 000 under år 2012 och år 2014 rapporterades 15,1 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–19 år. Aborter utförs allt tidigare under graviditeten. Under 2014 utfördes 93 procent av alla aborter före vecka 12, 82 procent före vecka 9 och 50 procent före vecka 7. Den vanligaste metoden för abort är läkemedelsbehandling (medicinsk metod), som användes vid 88 procent av aborterna år 2014.

Vi kan inte säkert avgöra om de lägre aborttalen år 2014 visar en verklig minskning eller om förändringen beror på den nya datainsamlingsmetoden.

Bakgrund

Lagstiftning

Sverige fick sin första lag som tillät abort på begränsad medicinsk indikation år 1938 efter prövning av Medicinalstyrelsen. Från 1946 kunde abort även beviljas av socialmedicinska skäl. Den nuvarande svenska abortlagen (1974:595) som trädde i kraft 1975 tillåter kvinnan att själv besluta om abort till och med den 18:e graviditetsveckan. Efter den 18:e veckan får abort endast ske efter prövning av Socialstyrelsens rättsliga råd. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om hur abortlagen ska tillämpas (SOSFS 2009:15). Sedan den 1 januari 2008 får också utländska kvinnor göra abort i Sverige även om de inte är bosatta, folkbokförda eller asylsökande i landet eller är svenska medborgare (SFS 2007:998). Uppgifter om utländska kvinnor som genomgått abort i Sverige efter år 2009 ingår i den ordinarie rapporteringen av abortstatistik.

Att ange graviditetslängd

Inför en abort beräknas graviditetslängden med en ultraljudsundersökning. En annan metod som också används som komplement är att graviditetslängden uppskattas efter sista menstruationens första dag till dag för abort.

Graviditetslängd kan benämnas på olika sätt och som exempel så anges en graviditetslängd på 11 fullgångna graviditetsveckor plus 6 dagar som 11+6. Med uttrycket utgången av artonde graviditetsveckan avses 18 fullgångna veckor plus 0 dagar (18+0). I tabell A beskrivs intervallen för graviditetslängd i abortstatistiken.

Tabell A. Intervaller för graviditetslängd

Fullgångna veckor + dagar	Beskrivning
≤ 7+0	Före eller vid utgången av 7:e veckan (7+0)
7+1–9+0	Efter utgången av 7:e veckan (7+1) och till och med utgången av 9:e veckan (9+0)
9+1–12+0	Efter utgången 9:e veckan (9+1) och till och med utgången av 12:e veckan (12+0)
12+1–18+0	Efter utgången 12:e veckan (12+1) och till och med utgången av 18:e veckan (18+0)
≥ 18+1	Efter utgången av 18:e veckan

Insamlingsstopp och revidering av statistikinsamlingen

Under 2013 stoppades insamlingen av abortstatistik tillfälligt. En reducerad statistik om aborter under år 2013 samlades i efterhand. Efter en utredning av vilka uppgifter som fortsättningsvis skulle ingå i abortstatistiken återupptogs datainsamlingen i januari 2014 med reviderat innehåll och förändrad insamlingsrutin (se avsnitt om Datainsamling).

Tidigare publicerad statistik

Statistik om aborter har publicerats av Socialstyrelsen sedan 1995. Till och med statistikår 2011 var den en del av Sveriges officiella statistik, inom serien Statistik – Hälsa- och sjukvård. Därefter bedöms abortstatistiken inte uppfylla kvalitetskraven för officiell statistik och publiceras som så kallad annan statistik. För mer information och publicerad statistik se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter.

Metod

Datainsamling

Rapporteringen av abortstatistik sker på pappersblankett som kvartalsvis skickas till Socialstyrelsen från de kliniker och öppenvårdsenheter där aborter utförs (se bilaga 2, blankett, Rapport över inducerade aborter). Uppgifterna gäller specifika aborter men är avidentifierade. Vilken klinik uppgifterna gäller anges inte på blanketten. Däremot meddelar kliniken per e-post att de rapporterat och vilket kvartal rapporten gäller. Syftet är att separera den medicinska informationen från uppgift om klinik för att säkerställa att ingen person kan komma att identifieras. Informationen från klinikernas e-post används enbart för att kontrollera om kliniker rapporterat och för påminnelser. Data från blanketterna registreras manuellt.

Datainsamling av abortstatistik som gäller från och med 2014 innehåller följande uppgifter och förändringar från tidigare år (se även bilaga 2, blankett):

- Ålder. Födelseår och födelsemånad har ersatts med åldersgrupp i 5-årsklasser.
- Hemort. Län och kommun samlas in men inte församling.
- Antal tidigare inducerade aborter. Antal har ersatts med tre kategorier, ingen abort; en abort; två eller fler aborter.
- Antal kompletta graviditetsveckor vid aborten har ersatts med graviditetsveckor + dagar i fem kategorier.
- Abortmetod anges i tre kategorier, enbart kirurgisk metod (vacuum aspiration); medicinsk metod som avslutas på sjukhus/klinik; medicinsk metod som avslutas i hemmet/annan plats. Den senare är en nytillkommen uppgift som inte samlats in tidigare.
- Kompletterande kirurgisk metod efter medicinsk abort, en nytillkommen uppgift som inte samlats in tidigare.
- Antal tidigare förlossningar samlas inte längre in.
- År och månad för abortens utförande samlas inte längre in.
- Uppgift om klinik för abortens utförande samlas inte längre in på blanketten.

Tillförlitlighet

Socialstyrelsen har gjort bedömningen att statistiken för 2014 är tillräckligt tillförlitlig för att presenteras på riksnivå. Jämförelser mot tidigare år ska dock göras med försiktighet eftersom insamlingsmetoden förändrats. Fel och brister i statistiken får större genomslag ju mer den bryts ned. Regionala jämförelser kan därför inte presenteras.

Mätfel

Mätfel innebär att fel uppgift rapporterats. Omfattningen av mätfelen i abortstatistiken är inte känd, men bedöms vara större för 2014 än tidigare år eftersom rapporterade uppgifter inte längre kan kopplas till klinik. Det innebär

att möjligheterna att granska uppgifter är begränsade och att det inte är möjligt att rätta fel som ändå upptäcks.

De inrapporterade uppgifterna kontrolleras maskinellt mot giltiga värden. Exempelvis kontrolleras att uppgiften om antal tidigare aborter har värde 0 (ingen abort), 1 (en abort) eller 2 (två eller fler aborter). Det betyder att bara mätfel som ger ogiltiga värden kan upptäckas. Ogiltiga värden tas bort. Dubbelrapportering av aborter kan inte upptäckas med nuvarande insamlingsmetod.

Bortfall

Samtliga kliniker som tidigare år har rapporterat uppgifter har även levererat abortstatistik för 2014 till Socialstyrelsen, enligt de e-postmeddelanden som klinikerna skickat efter leveransen. För sista kvartalet saknas dock rapporter från ett fåtal kliniker som tidigare år rapporterat noll eller någon enstaka abort. Det bortfallet anses försumbart. Hur stort bortfallet är av aborter är inte känt. Bortfallet av specifika uppgifter om aborterna är något större för 2014 än tidigare år (se bilaga 1, tabell 1).


Resultat

Här redovisas resultat av rapporterad abortstatistik på riksnivå. Inga regionala jämförelser kan presenteras på grund av brister i statistikens tillförlitlighet (se avsnitt om Tillförlitlighet).

Under 2014 rapporterades drygt 36 600 aborter till Socialstyrelsen vilket motsvarar ett aborttal på 20,2 per 1 000 kvinnor i åldersgruppen 15–44 år.

Figur 1 visar abortfrekvensen under de senaste 30 åren. I början av 1980-talet utfördes runt 31 000 aborter per år, aborttalet var då mindre än 18,0 aborter per 1 000 kvinnor. Under slutet av 1980-talet ökade antalet och 1989 utfördes närmare 38 000 aborter (21,5 per 1 000 kvinnor). Antalet sjönk därefter igen och var som lägst år 1999 med knappt 31 000 aborter (18,1 per 1 000 kvinnor). Under 2000-talet ökade antalet fram till år 2009. De senaste åren har antalet aborter legat runt 37 000 per år. Aborttalet var under perioden 2009–2012 mellan 20,7 och 20,9 per 1 000 kvinnor. Vid den begränsade datainsamlingen av abortstatistik för år 2013 uppskattades aborttalet till 20,3. Skattningen bygger på abortstatistik som samlats in i efterhand. Det är för tidigt att avgöra om det visar en verklig minskning av aborttalen eller om förändringen beror på de nya datainsamlingsrutinerna för 2013 och 2014 (se figur 1 och bilaga 1 tabell 2 och 3).

Figur 1. Antal aborter, 1983–2014




Aborter och kvinnans ålder

Allra flest aborter relaterat till befolkningen görs bland kvinnor i åldersgruppen 20–24 år (aborttal 29,6 per 1 000 i åldersgruppen), därefter följer åldersgruppen 25–29 år (27,3 per 1 000). Tonårsaborterna har minskat sedan 2006 då aborttalet var 25,4 per 1 000 kvinnor i åldern 15–19 år. År 2012 var aborttalet för tonåringar 18,8 och år 2014 rapporterades 15,1 aborter per

1 000 kvinnor. Om minskningen speglar verkligheten eller beror på att insamlingsmetoden för abortstatistiken förändrats är inte möjligt att avgöra. Bland kvinnor i åldern 35 år och äldre har nivån varit relativt konstant, runt 12 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 35–44 år (se figur 2 samt tabell 2 och 3 i bilagan).

Figur 2. Antal aborter per 1 000 kvinnor efter ålder, 1983–2014




Upprepade aborter

Enligt statistiken så var andelen kvinnor som genomgått en eller flera aborter innan den senast rapporterade aborten drygt 42 procent. Andelen upprepade aborter var högst bland kvinnor som var 25 år eller äldre, se bilaga 1, tabell 6 och 7.

Aborter och graviditetslängd

Aborter görs allt tidigare i graviditeten. Andelen aborter före vecka 7+1 har ökat betydligt sedan början av 1990-talet och det är främst aborter som utförs vid en graviditetslängd på 9+1 till 12+0 veckor som minskat. Andelen aborter efter vecka 12+0 har legat relativt konstant. Enligt rapporterade uppgifter för 2014 utfördes 93 procent av alla aborter före vecka 12+1, 82 procent före vecka 9+1 och 50 % före vecka 7+1 (se figur 3 och bilaga 1 tabell 4). En förklaring till att aborter görs allt tidigare under graviditeten är införandet av nya metoder för medicinsk abort och mer utvecklad ultraljudsteknik.

Figur 3. Aborter efter graviditetslängd (veckor+dagar), 1983–2014



Aborter efter 18 veckor

Efter 18:e graviditetsveckan ($\geq 18+1$) får abort endast utföras med tillstånd av Socialstyrelsen och beviljas endast om så kallade synnerliga skäl föreligger. Tillstånd till abort får inte lämnas om fostret kan antas vara livsdugligt utanför livmodern.

Socialstyrelsens Rättsliga råd är den instans som prövar om synnerliga skäl föreligger. Denna prövning sker individuellt och grundar sig på en läkarbedömning och kuratorsutredning.

I tabell B redovisas antal ansökningar, grupperade efter huvudindikation, samt resultatet av Rättsliga rådets prövning. Även om abort beviljats efter 18 veckor har en del kvinnor ändå valt att fortsätta graviditeten.

Tabell B. Ansökningar om tillstånd till abort efter 18:e veckan, 2014

Aborter fördelade efter huvudindikation

Indikation i ansökan	Ansökningar		Beviljade tillstånd	
	Antal	Procent ¹⁾	Antal	Procent ²⁾
Sociala problem	226	39,1	196	86,7
Psykisk sjukdom	13	2,2	13	100,0
Kroppslig sjukdom	3	0,5	3	100,0
Fosterskada/kromosomavvikelse	336	58,1	336	100,0
Totalt antal ansökningar	578	100,0	548	94,8
Antal utförda aborter 2014 ³⁾			447	

1) Procent av totalt antal ansökningar

2) Procent beviljade ansökningar

3) Uppgifter hämtade från Socialstyrelsens abortstatistik

Källa: Ärendestatistik Socialstyrelsens Rättsliga råd och Socialstyrelsens abortstatistik

Abortmetoder

Medicinsk abortmetod började användas allt mer under 1990-talet. Vid tidig medicinsk abort ska den inledande läkemedelsbehandling ges på ett allmänt sjukhus eller någon annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen för vård och omsorg har godkänt (tidigare Socialstyrelsen). Den efterföljande behandlingen kan ske i hemmet. Aborten bör avslutas med graviditetstest och efterkontroll som syftar till att fastställa att aborten är helt genomförd. Medicinsk abort som utförs efter graviditetsvecka 9 (>9+0) utförs som ovan men hela behandlingen sker på sjukhus. Vid ofullständig medicinsk abort kan behandlingen kompletteras med kirurgisk metod.

Vid kirurgisk abort avbryts graviditeten genom instrumentell utrymning av livmodern. En förbehandling för att mjuka upp livmoderhalsen rekommenderas. Det kirurgiska ingreppet sker med vakuumaspiration och utförs på en operationsavdelning eller dagvårdsavdelning under narkos eller lokalbedövning.

Abortmetod och graviditetslängd

Medicinsk metod, användes vid totalt 88 procent av de rapporterade aborterna år 2014. Andelen medicinska aborter före vecka 9+1 som avslutas utanför sjukhuset/kliniken, så kallade hemaborter, var 68 procent. Kirurgisk metod användes vid 42 procent av aborterna som utfördes vid en graviditetslängd på 9+1 till 12+0 veckor, men var ovanlig både vid tidigare och senare aborter. Tabell C och Bilaga 1, tabell 5 visar aborter fördelade efter metod och graviditetslängd.

Tabell C. Abortmetod och graviditetslängd, 2014

Aborter fördelade efter metod för olika graviditetslängd


Graviditetsveckor ¹⁾	Enbart kirurgisk abort, %	Medicinsk abort avslutad på sjukhus, %	Medicinsk abort avslutad i hemmet, %
≤ 7+0	3	27	69
7+1–9+0	16	33	51
9+1–12+0	42	54	3
≥ 12+1	6	93	1
Totalt	12	36	52

1) Fullgångna graviditetsveckor + dagar.

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

Figur 4 visar utvecklingen över tid för medicinsk respektive kirurgisk abortmetod. Från år 2000 utförs fler medicinska än kirurgiska aborter före vecka 9+1.

Figur 4. Andel aborter vid graviditetslängd $\leq 9+0$ veckor+dagar utförd med medicinsk eller kirurgisk metod, 1993–2014



* Statistiksamlingen stoppad under 2013


** Ny metod för statistiksamling från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

Aborter i relation till födda barn

Antalet aborter och antalet födda barn tenderar att följa varandra. När barnafödandet ökar så ökar också aborterna. Under 1989–1991 var födelsetalet högt liksom aborttalet medan både aborterna och barnafödandet minskade under första delen av 1990-talet. Likaså sammanfaller 2000-talets ökande aborttal med en ökning av barnafödandet. Ungefär en fjärdedel av alla graviditeter i åldersgruppen 15–44 år slutade med abort 2014 (figur 5). Denna andel har i stort sett varit densamma sedan 1975.

Figur 5. Antal födda barn och antal aborter per 1 000 kvinnor, 1983–2014



* Insamling av abortstatistik stoppad under 2013

** Ny metod för insamling av abortstatistik från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik, Statistiska centralbyråns statistik över födda

Definitioner och ordförklaringar

Vissa begrepp har bearbetats terminologiskt och därmed fått en definition. De är markerade med en asterisk(*). I Socialstyrelsen termbank finns mer information.

Abort* Induced abortion	Avbrytande av graviditet Termination of pregnancy
Medicinsk abort Medical abortion	Graviditeten avbryts genom läkemedelsbehandling. Medicinsk abort kan även benämnas farmakologisk abort. Abortifacient pharmaceutical drugs are used to terminate the pregnancy
Kirurgisk abort Surgical abortion	Graviditeten avbryts genom instrumentell utrymning av livmodern, vakuumaspiration (VA). The pregnancy is terminated through instrumental evacuation of the uterus, vacuum aspiration
Graviditetsvecka Week of gestation	Antal kompletta/fullgångna veckor bestäms med ultraljudsundersökning eller med tiden mellan sista menstruationens första dag och tidpunkten för aborten. The number of completed weeks assessed with Ultrasound examination or from the first day of the last menstrual period to the day of the abortion
Antal per 1 000 kvinnor Number per 1,000 women	Antal per 1 000 kvinnor beräknas på den kvinnliga medelbefolkningen för respektive år The number per 1,000 women is based on the female mean population for each year

Bilaga 1, Tabeller 1–10

Tabellöversikt

- Tabell 1 Bortfall av uppgifter bland rapporterade aborter, 1983–2014**
Missing data in received reports 1983–2014
- Tabell 2 Antal aborter efter ålder, 1983–2014**
Number of induced abortions by age 1983–2014
- Tabell 3 Antal aborter per 1 000 kvinnor efter ålder, 1983–2014**
Number of induced abortions per 1,000 women by age 1983–2014
- Tabell 4 Antal och andel aborter efter graviditetslängd, 1983–2014**
Number and proportion of induced abortions by duration of gestation 1983–2014
- Tabell 5 Antal och andel aborter efter metod och graviditetslängd, 2014**
Number and proportion of induced abortions by method and duration of gestation 2014
- Tabell 6 Antal och andel aborter efter tidigare abort och ålder, 2014**
Number and proportion of induced abortions by repeated abortion and age 2014
- Tabell 7 Antal och andel upprepade aborter efter ålder, 1983–2014**
Number and proportion of induced abortions by repeated abortion and age 1983–2014
- Tabell 8 Antal och andel aborter efter ålder och graviditetslängd, 2014**
Number and proportion of induced abortions by age and duration of gestation 2014
- Tabell 9 Antal och andel aborter vid graviditetslängd $\leq 9+0$ veckor + dagar efter metod och ålder 2014**
Number and proportion of induced abortions at $\leq 9+0$ weeks of gestation by method and age 2014
- Tabell 10 Antal och andel aborter vid graviditetslängd $\leq 12+0$ veckor + dagar efter metod och ålder 2014**
Number and proportion of induced abortions at $\leq 12+0$ weeks of gestation by method and age 2014

Tabell 1. Bortfall av uppgifter bland rapporterade aborter, 1983–2014

Missing data in received reports 1983–2014

År	Total	Åldersgrupp		Graviditetsvecka		Abortmetod		Tidigare abort	
	antal	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%
1983	31 014	0	0,0	0	0,0	—	—	1 801	5,8
1984	30 755	0	0,0	0	0,0	—	—	1 803	5,9
1985	30 838	4	0,0	28	0,1	—	—	1 817	5,9
1986	33 124	0	0,0	0	0,0	—	—	2 265	6,8
1987	34 707	0	0,0	0	0,0	—	—	2 602	7,5
1988	37 585	8	0,0	0	0,0	—	—	2 603	6,9
1989	37 920	0	0,0	0	0,0	—	—	3 314	8,7
1990	37 489	0	0,0	0	0,0	—	—	3 679	9,8
1991	35 788	0	0,0	0	0,0	—	—	4 007	11,2
1992	34 849	0	0,0	76	0,2	—	—	459	1,3
1993	34 169	0	0,0	141	0,4	3	0,0	559	1,6
1994	32 293	0	0,0	99	0,3	5	0,0	572	1,8
1995	31 441	0	0,0	118	0,4	1	0,0	413	1,3
1996	32 117	0	0,0	130	0,4	39	0,1	370	1,2
1997	31 433	0	0,0	168	0,5	59	0,2	376	1,2
1998	31 008	0	0,0	71	0,2	24	0,1	52	0,2
1999	30 712	0	0,0	61	0,2	67	0,2	428	1,4
2000	30 980	1	0,0	107	0,3	52	0,2	625	2,0
2001	31 777	15	0,0	139	0,4	58	0,2	606	1,9
2002	33 365	5	0,0	115	0,3	34	0,1	890	2,7
2003	34 473	10	0,0	118	0,3	29	0,1	934	2,7
2004	34 454	22	0,1	126	0,4	43	0,1	866	2,5
2005	34 978	19	0,1	163	0,5	43	0,1	543	1,6
2006	36 045	20	0,1	149	0,4	62	0,2	658	1,8
2007	37 205	15	0,0	132	0,4	67	0,2	618	1,7
2008	38 053	38	0,1	93	0,2	63	0,2	693	1,8
2009	37 524	80	0,2	139	0,4	49	0,1	785	2,1
2010	37 693	2	0,0	121	0,3	66	0,2	1 002	2,7
2011	37 750	0	0,0	116	0,3	75	0,2	845	2,2
2012	37 366	9	0,0	145	0,4	97	0,3	1 054	2,8
2013 ¹⁾									
2014 ²⁾	36 629	392	1,1	368	1,0	224	0,6	817	2,2

1) Statistikinsamlingen stoppad under 2013

2) Ny metod för statistikinsamling från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

Tabell 2. Antal aborter efter ålder, 1983–2014

Number of induced abortions by age 1983–2014

År	-19 år	20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40+ år	Uppgift saknas	Totalt
1983	5 311	7 037	5 781	5 445	5 021	2 419	0	31 014
1984	5 188	7 321	5 638	5 185	4 939	2 484	0	30 755
1985	5 142	7 731	5 755	4 885	4 767	2 554	4	30 838
1986	5 481	8 751	6 499	5 147	4 672	2 574	0	33 124
1987	5 925	9 324	6 694	5 361	4 782	2 621	0	34 707
1988	6 659	10 248	7 424	5 794	4 701	2 751	8	37 585
1989	6 851	10 512	7 524	5 778	4 497	2 758	0	37 920
1990	6 791	9 822	8 066	5 733	4 461	2 616	0	37 489
1991	6 152	9 250	7 971	5 869	4 136	2 410	0	35 788
1992	5 338	8 768	8 089	5 988	4 283	2 383	0	34 849
1993	4 839	8 533	8 167	6 227	4 195	2 208	0	34 169
1994	4 477	8 030	7 602	5 974	4 143	2 067	0	32 293
1995	4 195	7 547	7 407	6 164	4 157	1 971	0	31 441
1996	4 362	7 720	7 421	6 496	4 246	1 872	0	32 117
1997	4 374	7 256	7 007	6 568	4 341	1 887	0	31 433
1998	4 533	6 911	6 765	6 463	4 416	1 920	0	31 008
1999	4 673	6 788	6 573	6 393	4 438	1 847	0	30 712
2000	5 218	6 849	6 559	5 928	4 543	1 882	1	30 980
2001	5 664	7 110	6 587	5 942	4 627	1 832	15	31 777
2002	6 503	7 614	6 416	5 895	4 973	1 959	5	33 365
2003	6 590	7 930	6 543	6 156	5 105	2 139	10	34 473
2004	6 681	7 823	6 519	6 045	5 115	2 249	22	34 454
2005	6 941	8 067	6 514	5 965	5 052	2 420	19	34 978
2006	7 532	8 638	6 740	5 851	4 904	2 360	20	36 045
2007	7 584	9 160	7 102	6 003	4 937	2 404	15	37 205
2008	7 561	9 636	7 274	5 902	5 091	2 551	38	38 053
2009	7 007	9 664	7 282	6 019	4 999	2 473	80	37 524
2010	6 389	10 068	7 495	6 124	5 073	2 542	2	37 693
2011	5 828	10 383	7 577	6 176	5 146	2 640	0	37 750
2012	5 287	10 484	7 987	6 255	4 820	2 524	9	37 366
2013 ¹⁾								
2014 ²⁾	3 900	9 700	8 581	6 570	4 964	2 522	392	36 629

1) Statistikinsamlingen stoppad under 2013

2) Ny metod för statistikinsamling från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

Tabell 3. Antal aborter per 1 000 kvinnor efter ålder, 1983–2014

Number of induced abortions per 1,000 women by age 1983–2014

År	-19 år ¹⁾	20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40+ år ²⁾	Totalt ³⁾
1983	17,9	26,2	20,7	18,2	15,3	9,4	17,9
1984	17,7	26,7	20,4	17,9	15,0	9,1	17,7
1985	18,0	27,3	20,9	17,2	14,7	8,8	17,7
1986	19,6	30,0	23,8	18,2	14,8	8,4	18,9
1987	21,5	31,2	24,6	19,0	15,6	8,2	19,8
1988	24,3	33,8	27,0	20,6	15,7	8,4	21,4
1989	24,9	34,9	26,7	20,5	15,4	8,4	21,5
1990	24,6	33,2	27,5	20,4	15,5	8,1	21,3
1991	22,6	31,8	26,3	20,9	14,4	7,6	20,4
1992	20,1	30,5	26,0	21,3	14,9	7,7	20,0
1993	18,8	30,0	25,9	21,9	14,6	7,3	19,8
1994	17,8	28,1	24,3	20,4	14,4	7,0	18,7
1995	16,9	26,4	24,1	20,4	14,5	6,8	18,3
1996	17,7	27,5	24,7	20,9	14,8	6,5	18,7
1997	17,8	26,6	23,7	20,7	15,2	6,5	18,4
1998	18,5	26,1	23,1	20,2	15,4	6,7	18,3
1999	19,0	26,3	22,5	20,2	15,1	6,4	18,1
2000	21,2	26,9	22,5	19,1	15,0	6,5	18,3
2001	22,7	28,1	22,9	19,5	14,8	6,4	18,7
2002	25,5	30,0	22,7	19,5	15,5	6,8	19,6
2003	25,0	31,2	23,7	20,5	15,7	7,4	20,2
2004	24,4	30,6	24,1	20,1	15,9	7,6	20,0
2005	24,3	31,4	24,3	19,8	16,0	7,9	20,2
2006	25,4	33,1	25,2	19,7	15,7	7,5	20,6
2007	24,8	34,2	26,3	20,5	16,0	7,4	21,0
2008	24,4	34,7	26,7	20,4	16,5	7,7	21,3
2009	22,5	33,4	26,3	21,1	16,1	7,5	20,8
2010	20,9	33,3	26,7	21,5	16,3	7,9	20,9
2011	19,8	33,1	26,5	21,6	16,6	8,3	20,9
2012	18,8	32,6	27,2	21,7	15,8	8,0	20,7
2013 ⁴⁾							
2014 ⁵⁾	15,1	29,6	27,3	22,3	16,7	7,9	20,2

1) Antal per 1 000 kvinnor 15-19 år

2) Antal per 1 000 kvinnor 40-44 år

3) Antal per 1 000 kvinnor 15-44 år

4) Statistikinsamlingen stoppad under 2013

5) Ny metod för statistikinsamling från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

Tabell 4. Antal och andel aborter efter graviditetslängd, 1983–2014

Number and proportion of induced abortions by duration of gestation 1983–2014

År	≤ 7+0		7+1–9+0		9+1–12+0		12+1–18+0		≥ 18+1		Uppgift saknas	Totalt antal
	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%		
1983	918	3,0	13 306	42,9	14 220	45,9	2 304	7,4	266	0,9	0	31 014
1984	922	3,0	12 673	41,2	14 506	47,2	2 385	7,8	269	0,9	0	30 755
1985	987	3,2	12 238	39,7	14 928	48,5	2 420	7,9	237	0,8	28	30 838
1986	1 089	3,3	12 187	36,8	16 784	50,7	2 810	8,5	254	0,8	0	33 124
1987	1 159	3,3	13 122	37,8	17 462	50,3	2 740	7,9	224	0,6	0	34 707
1988	1 229	3,3	13 833	36,8	19 305	51,4	2 939	7,8	279	0,7	0	37 585
1989	1 454	3,8	14 317	37,8	18 979	50,1	2 938	7,7	232	0,6	0	37 920
1990	1 459	3,9	13 957	37,2	18 983	50,6	2 864	7,6	226	0,6	0	37 489
1991	1 609	4,5	14 325	40,0	17 143	47,9	2 545	7,1	166	0,5	0	35 788
1992	1 917	5,5	14 557	41,9	15 751	45,3	2 325	6,7	223	0,6	76	34 849
1993	2 755	8,1	14 793	43,5	14 234	41,8	2 072	6,1	174	0,5	141	34 169
1994	3 288	10,2	14 322	44,5	12 476	38,8	1 961	6,1	147	0,5	99	32 293
1995	3 205	10,2	13 739	43,9	12 195	38,9	2 019	6,4	165	0,5	118	31 441
1996	4 011	12,5	13 678	42,8	12 068	37,7	2 075	6,5	155	0,5	130	32 117
1997	4 692	15,0	13 908	44,5	10 641	34,0	1 866	6,0	158	0,5	168	31 433
1998	5 698	18,4	13 875	44,8	9 399	30,4	1 794	5,8	171	0,6	71	31 008
1999	5 983	19,5	14 054	45,9	8 683	28,3	1 749	5,7	182	0,6	61	30 712
2000	6 294	20,4	14 187	46,0	8 312	26,9	1 884	6,1	196	0,6	107	30 980
2001	6 735	21,3	14 458	45,7	8 374	26,5	1 863	5,9	208	0,7	139	31 777
2002	6 733	20,2	15 518	46,7	8 784	26,4	1 983	6,0	232	0,7	115	33 365
2003	7 735	22,5	15 991	46,5	8 366	24,4	2 000	5,8	263	0,8	118	34 473
2004	8 428	24,6	16 013	46,6	7 667	22,3	1 946	5,7	274	0,8	126	34 454
2005	9 089	26,1	16 149	46,4	7 309	21,0	1 975	5,7	293	0,8	163	34 978
2006	9 609	26,8	16 552	46,1	7 421	20,7	1 999	5,6	315	0,9	149	36 045
2007	11 113	30,0	16 504	44,5	7 013	18,9	2 083	5,6	360	1,0	132	37 205
2008	12 194	32,1	16 626	43,8	6 616	17,4	2 191	5,8	333	0,9	93	38 053
2009	13 506	36,1	15 665	41,9	5 838	15,6	2 021	5,4	355	0,9	139	37 524
2010	14 393	38,3	15 128	40,3	5 632	15,0	2 009	5,3	410	1,1	121	37 693
2011	15 202	40,4	14 544	38,6	5 426	14,4	2 055	5,5	407	1,1	116	37 750
2012	15 285	41,1	14 219	38,2	5 166	13,9	2 146	5,8	405	1,1	145	37 366
2013 ¹⁾												
2014 ²⁾	18 213	50,2	11 585	31,9	4 038	11,1	1 978	5,5	447	1,2	368	36 629

1) Statistikinsamlingen stoppad under 2013

2) Ny metod för statistikinsamling från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

Tabell 5. Antal och andel aborter efter metod och graviditetslängd, 2014¹⁾

Number and proportion of induced abortions by method and duration of gestation 2014

Graviditetsveckor+da gar	Enbart kirurgisk abort		Medicinsk abort avslutad på sjukhus		Medicinsk abort avslutad i hemmet		Uppgift saknas antal	Totalt antal
	antal	%	antal	%	antal	%		
≤ 7+0	592	3,3	4 965	27,3	12 639	69,5	17	18 213
7+1-9+0	1 898	16,4	3 799	32,8	5 876	50,8	12	11 585
9+1-12+0	1 688	42,4	2 160	54,3	131	3,3	59	4 038
≥ 12+1	133	5,6	2 227	93,3	26	1,1	39	2 425
Uppgift saknas	4		22		245		97	368
Total	4 315	11,9	13 173	36,2	18 917	52,0	224	36 629

1) Ny metod för statistikinsamling från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

Tabell 6. Antal och andel aborter efter tidigare abort och ålder, 2014¹⁾

Number and proportion of induced abortions by repeated abortion and age 2014

Ålder	Ingen tidigare abort		En eller fler tidigare aborter		Uppgift saknas antal	Totalt antal
	antal	%	antal	%		
-19 år	3 219	83,5	635	16,5	46	3 900
20-24 år	5 929	61,8	3 667	38,2	104	9 700
25-29 år	4 338	51,2	4 142	48,8	101	8 581
30-34 år	3 240	49,9	3 259	50,1	71	6 570
35-39 år	2 467	50,3	2 436	49,7	61	4 964
40+ år	1 268	51,2	1 207	48,8	47	2 522
Uppgift saknas	3		2		387	392
Totalt	20 464	57,1	15 348	42,9	817	36 629

1) Ny metod för statistikinsamling från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

Tabell 7. Antal och andel upprepade aborter efter ålder, 1983–2014

Number and proportion of induced abortions by repeated abortion and age 1983-2014

År	-19 år		20–24 år		25–29 år		30–34 år		35–39 år		40+ år		Totalt	
	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%
1983	568	11,4	1 992	30,3	2 314	42,5	2 168	42,0	1 734	36,3	734	32,5	9 510	32,6
1984	539	11,1	2 061	30,3	2 385	44,8	2 079	42,5	1 821	38,7	817	34,7	9 702	33,5
1985	520	10,7	2 245	31,3	2 427	44,8	2 111	45,7	1 844	40,8	842	34,5	9 990	34,4
1986	578	11,3	2 414	30,1	2 750	45,7	2 231	45,8	1 856	42,0	872	36,2	10 701	34,7
1987	616	11,2	2 539	29,9	2 758	44,7	2 361	47,4	1 971	43,9	899	36,4	11 144	34,7
1988	718	11,5	2 775	29,5	3 053	44,3	2 653	48,8	1 995	45,0	1 020	39,3	12 218	34,9
1989	700	11,3	3 022	31,9	3 063	45,0	2 666	49,9	1 943	46,2	1 017	39,7	12 411	35,9
1990	749	12,3	2 824	32,5	3 368	46,6	2 615	49,4	1 934	47,2	1 057	43,8	12 547	37,1
1991	764	14,2	2 758	34,1	3 270	46,2	2 735	51,4	1 864	49,7	938	43,0	12 329	38,8
1992	717	13,6	2 705	31,2	3 469	43,4	2 792	47,4	1 940	46,1	987	42,2	12 610	36,7
1993	598	12,5	2 717	32,3	3 387	42,2	2 895	47,3	1 963	47,9	886	40,9	12 446	37,0
1994	606	13,7	2 482	31,3	3 198	43,0	2 713	46,4	1 978	48,9	883	43,8	11 860	37,4
1995	480	11,5	2 268	30,3	3 119	42,8	2 879	47,4	1 904	46,6	834	43,1	11 484	37,0
1996	540	12,5	2 419	31,6	3 184	43,4	3 044	47,5	1 998	47,8	799	43,5	11 984	37,7
1997	580	13,4	2 243	31,1	3 042	43,9	3 060	47,2	2 088	49,0	789	42,5	11 802	38,0
1998	609	13,5	2 148	31,1	2 980	44,1	3 055	47,4	2 180	49,5	899	46,9	11 871	38,3
1999	612	13,2	2 145	32,0	2 833	43,6	3 007	47,9	2 169	49,6	844	46,7	11 610	38,3
2000	688	13,4	2 089	31,1	2 835	44,1	2 804	48,3	2 241	50,5	910	49,4	11 568	38,1
2001	788	14,1	2 163	31,0	2 821	43,6	2 865	49,3	2 240	49,4	852	47,9	11 733	37,6
2002	923	14,6	2 411	32,3	2 710	43,3	2 695	47,1	2 420	50,4	941	49,6	12 100	37,3
2003	970	15,2	2 517	32,5	2 817	44,1	2 919	48,7	2 468	49,8	1 058	51,5	12 753	38,0
2004	983	15,1	2 658	34,6	2 737	42,9	2 865	48,7	2 448	49,5	1 073	49,4	12 771	38,0
2005	1 061	15,5	2 706	34,0	2 758	42,9	2 745	46,9	2 410	48,7	1 155	48,8	12 838	37,3
2006	1 066	14,4	2 924	34,3	2 871	43,4	2 614	45,5	2 348	49,1	1 168	50,6	12 998	36,7
2007	1 118	14,9	3 196	35,4	2 944	42,0	2 784	47,4	2 308	47,9	1 164	49,6	13 524	37,0
2008	1 190	16,0	3 412	36,0	3 195	44,7	2 728	47,1	2 408	48,5	1 202	48,4	14 146	37,9
2009	1 167	17,0	3 564	37,6	3 301	46,2	2 799	47,4	2 370	48,8	1 211	50,2	14 437	39,3
2010	1 045	16,7	3 703	37,7	3 434	46,9	2 950	49,6	2 451	50,0	1 230	50,0	14 814	40,4
2011	943	16,5	3 996	39,2	3 562	47,9	3 017	50,2	2 524	50,7	1 253	48,9	15 295	41,4
2012	859	16,7	3 947	38,6	3 798	49,0	3 071	50,5	2 335	50,2	1 216	49,9	15 230	41,9
2013 ¹⁾														
2014 ²⁾	635	16,5	3 667	38,2	4 142	48,8	3 259	50,1	2 436	49,7	1 207	48,8	15 348	42,9

1) Statistikinsamlingen stoppad under 2013

2) Ny metod för statistikinsamling från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

Tabell 8. Antal och andel aborter efter ålder och graviditetslängd, 2014¹⁾

Number and proportion of induced abortions by age and duration of gestation 2014

Graviditets-veckor+dagar		-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40+ år	Uppgift saknas	Totalt
≤ 7+0	antal	1 729	4 882	4 465	3 305	2 484	1 346	2	18 213
7+1-9+0	antal	1 328	3 153	2 686	2 123	1 562	730	3	11 585
9+1-12+0	antal	548	1 085	909	670	527	244	55	4 038
12+1-18+0	antal	243	488	400	343	305	166	33	1 978
≥ 18+1	antal	44	76	101	117	75	29	5	447
Uppgift saknas	antal	8	16	20	12	11	7	294	368
Totalt	antal	3 900	9 700	8 581	6 570	4 964	2 522	392	36 629
≤ 7+0	%	44,4	50,4	52,2	50,4	50,2	53,5		50,2
7+1-9+0	%	34,1	32,6	31,4	32,4	31,5	29,0		31,9
9+1-12+0	%	14,1	11,2	10,6	10,2	10,6	9,7		11,1
12+1-18+0	%	6,2	5,0	4,7	5,2	6,2	6,6		5,5
≥ 18+1	%	1,1	0,8	1,2	1,8	1,5	1,2		1,2

1) Ny metod för statistikinsamling från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

Tabell 9. Antal och andel aborter vid graviditetslängd ≤ 9+0 veckor + dagar efter metod och ålder, 2014¹⁾

Number and proportion of induced abortions at ≤ 9+0 weeks of gestation by method and age 2014

Ålder	Enbart kirurgisk		Medicinsk, avslutad på sjukhus		Medicinsk, avslutad i hemmet		Uppgift saknas antal	Totalt antal
	antal	%	antal	%	antal	%		
-19 år	234	7,7	1 819	59,6	1 001	32,8	3	3 057
20-24 år	597	7,4	2 722	33,9	4 707	58,6	9	8 035
25-29 år	569	8,0	1 814	25,4	4 759	66,6	9	7 151
30-34 år	509	9,4	1 142	21,1	3 773	69,6	4	5 428
35-39 år	414	10,2	838	20,7	2 791	69,0	3	4 046
40+ år	167	8,0	424	20,4	1 484	71,5	1	2 076
Uppgift saknas	0		5		0		0	5
Totalt	2 490	8,4	8 764	29,4	18 515	62,2	29	29 798

1) Ny metod för statistikinsamling från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

Tabell 10. Antal och andel aborter vid graviditetslängd $\leq 12+0$ veckor + dagar efter metod och ålder, 2014¹⁾

Number and proportion of induced abortions at $\leq 12+0$ weeks of gestation by method and age 2014

Ålder	Enbart kirurgisk		Medicinsk, avslutad på sjukhus		Medicinsk, avslutad i hemmet		Uppgift saknas antal	Totalt antal
	antal	%	antal	%	antal	%		
-19 år	466	12,9	2 125	59,0	1 010	28,0	4	3 605
20-24 år	1 001	11,0	3 372	37,0	4 737	52,0	10	9 120
25-29 år	956	11,9	2 309	28,7	4 784	59,4	11	8 060
30-34 år	808	13,3	1 480	24,3	3 805	62,4	5	6 098
35-39 år	661	14,5	1 094	23,9	2 815	61,6	3	4 573
40+ år	286	12,3	538	23,2	1 495	64,5	1	2 320
Uppgift saknas	0		6		0		54	60
Totalt	4 178	12,4	10 924	32,4	18 646	55,3	88	33 836

1) Ny metod för statistikinsamling från 2014

Källa: Socialstyrelsens abortstatistik

RAPPORT över inducerade aborter

Uppgifter för rapportering av inducerade aborter skickas per post (ej per mejl) kvartalsvis till:
Socialstyrelsen, Abortstatistik, 106 30 STOCKHOLM

Vid inrapporteringen skickas även ett e-postmeddelande till: inrapportering@socialstyrelsen.se med uppgifterna klinik/sjukhusnamn, enhetsnummer, aktuellt kvartal och årtal.

En inducerad abort rapporteras enbart en gång för den aktuella graviditeten även om den medicinska behandlingen upp-
 repar. Om en medicinsk abort kompletteras med kirurgisk metod anges detta i sista kolumnen nedan.

Anvisningar och information om exemplet nedan, se sidan 2

	Åldersgrupp	Hemort		Antal tidigare inducerade aborter	Antal kompletta graviditetsveckor + dagar vid aborten	Abortmetod	Kompletterande kirurgisk metod efter medicinsk abort
	Ange värde 1-6	Ange kod		Ange värde 0-2	Ange värde 1-5	Ange värde 1-3	Sätt kryss om utfört
	1 19 år eller yngre 2 20-24 år 3 25-29 år 4 30-34 år 5 35-39 år 6 40 år eller äldre	Län	Kommun	0 Ingen abort 1 En abort 2 Två eller fler aborter	1 ≤ 7+0 2 7+1-9+0 3 9+1-12+0 4 12+1-18+0 5 ≥ 18+1	1 Enbart kirurgisk metod 2 Medicinsk metod avslutad på sjukhus/klinik 3 Medicinsk metod avslutad i hemmet/ annan plats	
Ex.	5	12	80	2	4	3	X
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

ANVISNINGAR till rapport över inducerade aborter

Rapporten insänds till Socialstyrelsen per post fyra veckor efter avslutat kvartal, så att den är oss tillhanda senast:

- 30 april (för aborter utförda under januari-mars)
- 31 juli (april-juni)
- 31 oktober (juli-september)
- 31 januari (oktober-december)

Då uppgift om rapporterande klinik/sjukhus inte finns på blanketten så uppmanas samtliga kliniker att skicka ett e-postmeddelande till inrapportering@socialstyrelsen.se med information om rapporterande klinik/sjukhus, enhetsnummer, kvartal och år som kliniken har rapporterat för. E-postmeddelandet skickas i samband med inrapporteringen.

Om ingen abort utförts det aktuella kvartalet uppmanas klinikerna att ändå skicka ett e-postmeddelande som anger att inga (noll) inducerade aborter utförts på den aktuella kliniken under kvartalet.

BESKRIVNING AV UPPGIFTER SOM INGÅR I RAPPORTEN

Åldersgrupp:

Kvinnans ålder grupperad (värde 1-6). Värde 1 om kvinnan är 19 år eller yngre, värde 2 om kvinnan är 20-24 år, värde 3 om 25-29 år, värde 4 om 30-34 år, värde 5 om 35-39 år eller värde 6 om kvinnan är 40 år eller äldre.

Hemort:

Uppgiften fylls i med hjälp av förteckningen "Rikets indelningar" utgiven av Statistiska Centralbyrån. Koderna för län och kommun avser kvinnans folkbokföringsadress vid vårdtillfället. För kvinnor ej folkbokförda i Sverige, anges länskod 90 och utrymmet för kommunkod lämnas blankt.

Antal tidigare inducerade aborter:

Värde 0 anges om kvinnan inte gjort abort tidigare, värde 1 om kvinnan gjort en tidigare abort och värde 2 anges om två eller fler aborter gjorts tidigare. Okänd uppgift markeras med streck (-).

Antal kompletta graviditetsveckor + dagar vid aborten:

Graviditetslängd beräknas som tiden från och med sista menstruationens första dag fram till dagen för abort eller med ledning av fostrets utveckling enligt ultraljud.

Exempel: Menstruationens första dag är den 25 november och aborten sker den 27 januari. Antal kompletta veckor blir då 9+0, vilket ska anges som värde 2 på blanketten, se tabell nedan.

Ange värde 1-5 på blanketten	Kompletta graviditetsveckor
1	≤7+0
2	7+1-9+0
3	9+1-12+0
4	12+1-18+0
5	≥18+1

Abortmetoder vid inducerad abort:

Värde 1 anges vid kirurgisk metod och vilket avser vakumaspiration (VA). Medicinsk abort påbörjas alltid på klinik/sjukhus och avslutas antingen på klinik/sjukhus (ange värde 2) eller i hemmet eller på annan plats (ange värde 3).

Kompletterande kirurgisk metod efter medicinsk abort:

I de fall en medicinsk abort behöver kompletteras med kirurgisk metod (vakumaspiration) kryssmarkeras rutan om detta är utfört.

Det är viktigt att en abort rapporteras enbart en gång för den aktuella graviditeten.

Information om exemplet på blanketten, sid 1:

I det fingerade exemplet är kvinnan 38 år och bor i Malmö kommun. Hon har gjort tre tidigare aborter och vid den aktuella aborten är hon i graviditetsvecka 14. Aborten utförs med medicinsk metod som avslutas i hemmet. Efter två veckor kompletteras aborten med vakumaspiration.