

Statistik om aborter 2015

Under 2015 rapporterades cirka 38 000 aborter till Socialstyrelsen, vilket motsvarar 20,9 per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. Aborter utförs allt tidigare under graviditeten, under 2015 utfördes cirka 50 procent av alla aborter före vecka 7 och drygt 90 procent före vecka 12. Cirka 90 procent utfördes med medicinsk metod.


Antalet på samma nivå som tidigare år

År 2015 rapporterades cirka 38 000 inducerade aborter, vilket motsvarar 20,9 per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. Det är fler än året innan, då 20,2 aborter per 1 000 kvinnor rapporterades, men ligger på samma nivå som under perioden 2009–2012. Det lägre antalet 2014 kan bero på att det var första året som nya rutiner för datainsamling tillämpades, vilket kan ha påverkat resultatet och är särskilt viktigt att tänka på vid jämförelser med tidigare år.

Abort görs tidigare under graviditeten

Andelen aborter före graviditetsvecka 7 har ökat betydligt sedan början av 1990-talet och det är främst aborter som utförs vid en graviditetslängd på 9–11 veckor som minskat. Enligt rapporterade uppgifter för 2015 utfördes 51 procent av alla aborter före vecka 7 och 93 procent före vecka 12. En förklaring till att aborter görs allt tidigare under graviditeten är införandet av nya metoder för medicinsk abort och mer utvecklad ultraljudsteknik.

Figur 1. Aborter efter graviditetslängd, 1983–2015



* Data saknas för 2013 p.g.a. uppehåll i datainsamlingen. ** Ny metod för datainsamling från 2014.

Källa: statistik om aborter, Socialstyrelsen

Graviditetslängd


Beräknas med ultraljudsundersökning eller uppskattas efter sista menstruationens första dag till dag för abort. Anges som fullgångna graviditetsveckor + dagar. Exempelvis anges 7 fullgångna veckor + 1 dag som 7+1.

Hemaborter vanliga

Medicinsk metod har blivit allt vanligare sedan metoden infördes i början av 1990-talet och trenden fortsätter. År 2015 var 91 procent av de rapporterade aborterna utförda med medicinsk metod.

Sedan år 2004, när det blev tillåtet med hemabort, har det blivit allt vanligare att tidiga medicinska aborter avslutas i hemmet/annan plats. Under 2015 var 68 procent av aborterna som utfördes före vecka 9 hemaborter.

Figur 2. Aborter efter metod och graviditetslängd 2015



Källa: statistik om aborter, Socialstyrelsen.

Medicinsk abortmetod

Behandlingen inleds alltid på sjukhus/klinik och fullföljs antingen på sjukhus/klinik eller i hemmet/annan plats, s.k. hemabort. Graviditeten avbryts genom läkemedelsbehandling i två omgångar. De första hormontabletterna påbörjar aborten och avslutar graviditeten. Efter en till tre dagar tas andra hormontabletter som framkallar livmodersammandragningar och ledet till att graviditeten stöts ut. Medicinsk metod kan användas vid alla graviditetslängder.

Kirurgisk abortmetod


Graviditeten avbryts på sjukhus/klinik genom instrumentell utrymning av livmodern, så kallad vakuumaspiration. Kirurgisk abort kan göras till graviditetsvecka 12 eller 13, men helst inte före vecka 7.

Tonårsaborterna har minskat

Tonårsaborterna har minskat stadigt under de senaste tio åren och 2015 rapporterades 14,4 aborter per 1 000 flickor i åldern 15–19 år, jämfört med 25,4 per 1 000 flickor under 2006. Minskningen antas bero på mer utvecklade preventivmetoder och subventioneringar av preventivmedel.

Aborter har länge varit vanligast i åldersgruppen 20–25 år, följt av åldersgruppen 25–29 år. År 2015 ökade aborterna i åldern 25–29 år och det gjordes ungefär 30 aborter per 1 000 kvinnor i båda åldersgrupperna.

Figur 3. Antal aborter per 1 000 kvinnor efter ålder, 1983–2015



Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen:
www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-5-20

Kontakt:

Maria Öman, statistikfrågor

Telefon: 075-247 30 00

E-post: maria.oman@socialstyrelsen.se

Karin Gottvall, sakkunnig

Telefon: 075-247 30 00

E-post: karin.gottvall@socialstyrelsen.se