

Statistik om sjukdomar behandlade i slutenvård 2017

Under 2017 ägde ungefär 1 440 000 inskrivningar rum på svenska sjukhus, en minskning på runt 56 000 sedan 2016. Detta motsvarande cirka 860 000 patienter som skrevs in. Den vanligaste anledningen till inskrivning på sjukhus var hjärt- och kärlsjukdomar, för både män och kvinnor.

Vad är slutenvård?

Med slutenvård avses hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård eller hem-sjukvård. Detta innebär att patienten skrivs in på sjukhus och att en vårdplats ställs till patients förfogande. Detta kallas för att vårdtillfälle i slutenvård. I denna statistik räknas de vårdtillfällen som avslutats under året och där patienten skrivits ut.


Likartat diagnosmönster men olika förekomst mellan könen

De diagnoser som patienter slutenvårdats för kan grovt delas in i tre grupper: *sjukdomar* (cirka 1 157 000 vårdtillfällen), *skador och förgiftningar* (cirka 143 000 vårdtillfällen) och *graviditet och förlossningar* (motsvarar cirka 139 000). I gruppen sjukdomar stod männen för 51 procent av vårdtillfällena och kvinnorna för 49 procent. Statistiken i detta faktablad behandlar bara vårdtillfällen där patienten vårdats för en *sjukdom*.


Hjärt-och kärlsjukdomar vanligaste diagnoserna

De vanligaste diagnoserna, för båda könen, under 2017 var hjärt-och kärlsjukdomar, även om ett betydligt fler män än kvinnor skrevs in med dessa diagnoser. Antalet kvinnor som slutenvårdades för detta under 2017 var ungefär 56 700 medan motsvarande siffra för män var knappt 75 100.

För kvinnor dominerade annars inskrivningar till följd av olika symptom, exempelvis bröst- och buksmärtor, som 56 400 kvinnor vårdades för under 2017. Under 2016 var detta den vanligaste diagnosgruppen bland kvinnor. Andra stora diagnosgrupper var matsmältningsorganens sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, andningsorganens sjukdomar och tumörer med ungefär 40 000 till 50 000 kvinnliga patienter i varje grupp. Dessa grupper var också de vanligaste 2016.



Utöver hjärt-och kärlsjukdomar var även symptom den vanligaste diagnosgruppen bland inlagda män under 2017, ungefär 54 000 slutenvårdades för detta under året. Efter det var matsmältningsorganens sjukdomar, andningsorganens sjukdomar, tumörer, psykiska sjukdomar och rörelseorganens sjukdomar de vanligaste med mellan 30 000 och 45 000 patienter i varje diagnosgrupp.



Fler kvinnor vårdades för sjukdomar i rörelseorganen

De vanligaste grupperna är således relativt lika mellan män och kvinnor även om antalet patienter i de olika grupperna kan skilja betydligt. Exempelvis vårdades ungefär 10 000 fler kvinnor för rörelseorganens sjukdomar, som exempelvis ryggvärk, under 2017. Bland männen hade också ungefär lika många patienter

psykiska sjukdomar (30 000) som sjukdomar i rörelseorganen. Över lag slutenvårdades fler män än kvinnor för psykiatriska diagnoser, ungefär 9 % fler.

Kvinnor vårdas främst för förmaksflimmer och män för akut hjärtinfarkt

De vanligaste diagnoskategorierna, med avseende på antal patienter 2017, bland hjärt- och kärlsjukdomar var hjärtsvikt, tätt följt av förmaksflimmer, ett ombytt förhållande jämfört med 2016. Vanligaste diagnosen inom denna kategori skiljer dock mellan könen, kvinnor hade främst förmaksflimmer medan män främst vårdades för akut hjärtinfarkt. Dock var det ändå fler män som vårdades för förmaksflimmer, ungefär 11 000 jämfört med 10 000 bland kvinnor.

Kvinnor som vårdades för symptom vårdades främst för smärtor från buk och bäcken medan männen främst hade smärtor i luftstrupe och bröstorg, detta är samma mönster som syntes under 2016. Bland patienter inskrivna för sjukdomar i matsmältningsorganen var gallstenssjukdom vanligast för kvinnor och akut blindtarmsinflammation för män, även det samma som året innan. Inom andningsorganens sjukdomar var lunginflammation den främsta anledningen till inskrivning i slutenvård, medan det inom rörelseorganens sjukdomar var vanligast med höftledsartros följt av knäartros. Inom artroskategorierna fanns 35 procent fler kvinnliga än manliga patienter. Bland patienter inskrivna för tumörsjukdomar var bröstcancer den vanligaste diagnosen bland kvinnor och prostatacancer bland män.


För psykiska sjukdomar var psykiska störningar orsakade av alkohol den största diagnoskategorin med drygt 8 700 manliga patienter och knappt 4 000 kvinnliga patienter. Bland kvinnor var dock ångestsyndrom vanligast med något fler patienter.

Äldre samt de allra yngsta vårdas oftast

Slutenvård förekommer i olika utsträckning beroende på ålder. När slutenvård vid förlossning exkluderas så är det framförallt de äldsta åldersgrupperna som vårdas och därefter den allra yngsta åldersgruppen. Efter åldersintervallet 0–4 år minskar antalet vårdtillfällen per invånare. Patienterna i åldersgrupperna 5–9 år och 10–14 år hade ungefär lika många vårdtillfällen per invånare 2017, därefter ökade antalet konstant med ökad ålder. För åldersgrupperna 0–4 och 5–9 år var det fler vårdtillfällen hos pojkar än flickor. För åldersintervallen 15–19 till och med 45–49 år var det istället fler vårdtillfällen per invånare hos kvinnor än män. Från och med åldersintervallet 50–54 år och äldre var det återigen fler relativa vårdtillfällen hos män i varje åldersintervall.

Figur 3. Åldersfördelning antal sjukdomsvårdstillfällen* per 1 000 invånare i befolkningen 2017

Antal per 1 000 bef.



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

*Kapitel 1-14 samt 16-18 i ICD10-SE.

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen:

<http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-9-10>

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:

<http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserislutenvard>

Kontakt

Clara Larsson

Telefon: 075-247 30 00

E-post: patientregistret@socialstyrelsen.se