


Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2017

Rökning bland mödrar till spädbarn fortsätter att minska under 2017. Under de senaste 15 åren har andelen barn med rökande mödrar mer än halverats. Vid barnets första veckor är andelen rökande mödrar omkring 3 procent och vid 8 månaders ålder 4 procent. Även rökning bland spädbarnens fäder har minskat, men inte lika mycket.

Färre mödrar röker

För knappt 11 procent av barnen som föddes år 2017 var någon i hemmiljö rökare under spädbarnstiden, vilket är en liten minskning jämfört med år 2016. Det är även en minskning jämfört med 1999 då cirka 18 procent av de yngsta spädbarnen bodde med någon som rökte och drygt 19 procent vid 8 månaders ålder (se diagram 1.1).

Diagram 1.1. Andel barn med rökande föräldrar samt som sammanbor med rökare under spädbarnstiden, barn födda 1999–2017



*Skattat riksvärde för 2013–2017

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Speciellt mödrarnas rökning har minskat sedan 1999 då 9 procent av spädbarnen i åldern 0–4 veckor hade mödrar som rökte dagligen och omkring 11 procent vid 8 månaders ålder. För barn födda 2017 har andelen med rökande mödrar minskat till omkring 3 procent vid 0–4 veckor ålder och 4 procent vid 8 månaders ålder. Fäders rökning under spädbarnstiden har också minskat under perioden från knappt 14 procent år 1999 till runt 10 procent de senaste åren. En något lägre andel av barnen födda 2017 hade rökande fäder under de första veckorna jämfört

med år 2016. Andelen barn vars fäder rökte dagligen var omkring 10 procent vid 0–4 veckors ålder och omkring 9 procent vid 8 månaders ålder.


Med *rökare* menas person som röker minst en gång dagligen, dvs. drar i sig rök från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus.

Med *sammanbor med rökare* avses att barnet stadigvarande bor tillsammans med någon person som röker enligt definitionen. Det kan vara vårdnadshavare, vårdnadshavares sambo, äldre syskon, far- eller morföräldrar eller någon annan person. Med stadigvarande avses att personen bor på samma adress som barnet minst 14 dagar per månad.

Regionala skillnader i rökvanor

Spädbarnsföräldrars rökvanor varierar mellan länen. För barn födda 2017 var andelen med rökande föräldrar lägst i Västerbottens län. Där var andelen barn med rökande mödrar mindre än 2 procent, både vid 0–4 veckors ålder och vid 8 månaders ålder.

Diagram 1.2. Andel barn med mödrar som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2017




*Uppgifter saknas för Uppsala och Jämtland år 2017. Riksvärdet är skattat med senaste tillgängliga data för dessa län.

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Knappt 5 procent av barnen i Västerbottens län hade fäder som rökte dagligen under barnets första veckor.

Diagram 1.3. Andel barn med fäder som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2017



*Uppgifter saknas för Uppsala och Jämtland år 2017. Riksvärdet är skattat med senaste tillgängliga data för dessa län.

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

För barn födda 2017 var andelen med rökande mödrar högst i Blekinge län vid 0–4 veckors ålder, där var det omkring 5 procent av mödrarna som rökte dagligen. Andelen vars mödrar som rökte när barnet var 8 månader gammalt var som högst i Södermanlands län, omkring 6 procent av mödrarna rökte dagligen. Rökning bland fäder var vanligast i Blekinge län, andelen vars fäder rökte dagligen var cirka 15 procent vid 0–4 veckors ålder och omkring 14 procent vid 8 månaders ålder.

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här (välj visa bilagor):

<https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikammen/rokvanor/>

Kontakt:

Henny Rydberg, statistikfrågor

Telefon: 075-247 30 00

E-post: henny.rydberg@socialstyrelsen.se

Carl-Erik Flodmark, sakfrågor

Telefon: 075-247 30 00

E-post: carl-erik.flodmark@socialstyrelsen.se