

## Statistik om aborter 2021

Under 2021 rapporterades cirka 33 700 aborter till Socialstyrelsen, vilket motsvarar knappt 18 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. De flesta, 61 procent, utfördes före vecka 7 i graviditeten. Medicinsk metod användes vid 96 procent av de rapporterade aborterna under 2021 och allt fler medicinska aborter avslutas i hemmet.


### Antalet aborter relativt konstant över tid

År 2021 rapporterades cirka 33 700 inducerade aborter till denna datainsamling, vilket motsvarar knappt 18 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder i befolkningen (15–44 år). Det är ungefär 900 färre aborter jämfört med antalet rapporterade för 2020. Både det totala antalet aborter och antal aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder har varit relativt konstant sedan mitten av 1990-talet, med en liten nedgång senaste åren. Antalet inrapporterade aborter 2021 är det lägsta sedan 2002. Utvecklingen har dock varierat i olika åldersgrupper med en särskilt kraftig minskning bland tonåringar under senare år. En allt större andel av aborterna sker tidigt i graviditeten och det har gradvis blivit mindre vanligt att graviditeter avbryts med kirurgisk metod.

### Aborter bland yngre fortsätter att minska

Den minskning av aborter bland yngre kvinnor vi sett under många år fortsätter. År 2021 rapporterades drygt 8 aborter per 1 000 flickor i åldersgruppen 15–19 år, att jämföra med drygt 25 per 1 000 under 2006.

**Figur 1. Antal aborter per 1 000 kvinnor efter ålder, 1996–2021**



Även i åldersgruppen 20–24 år har antal aborter minskat, från närmare 35 per 1 000 kvinnor år 2008 till 22 per 1 000 år 2021. Sedan år 2016 är abort vanligast bland kvinnor i åldern 25–29 år.

En bidragande faktor till minskningen av aborter bland yngre kvinnor kan vara en ökad användning av långtidsverkande preventivmedel. Förskrivningen ökade mellan år 2011 och 2019, då det blev vanligare att erbjuda spiral till kvinnor som inte fött barn<sup>1</sup>. Att preventivmedel från den 1 januari 2017 enligt lag<sup>2</sup> är kostnadsfria för kvinnor under 21 år kan också ha bidragit till att aborterna minskat. Vissa regioner erbjuder subventioner upp till 25 år och vissa erbjöd subventioner redan innan lagändringen.

## Aborter sker allt tidigare i graviditeten


Andelen aborter som utförs före graviditetsvecka 7 har ökat stadigt sedan början av 1990-talet och var 61 procent år 2021. Till en början var det aborter utförda från vecka 9 och fram till vecka 12 som stod för minskningen, men sedan år 2004 har andelen aborter från vecka 7 fram till vecka 12 minskat för varje år. Andelen aborter från vecka 12 och senare har legat på ungefär samma nivå under perioden.

### Graviditetslängd

Beräknas med ultraljudsundersökning eller efter sista menstruationens första dag till dag för abort. Anges som fullgångna graviditetsveckor + dagar. Exempelvis anges 7 fullgångna veckor + 1 dag som 7+1 veckor.

**Figur 2. Aborter efter graviditetslängd, 1996–2021**

Procent



<sup>1</sup>Officiell statistik om läkemedel 2019 - Art.nr: 2020-4-6707 Socialstyrelsen.

<sup>2</sup> 18 § lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

## Allt fler hemaborter över tid

Medicinsk abortmetod blev snabbt allt vanligare sedan metoden infördes i början av 1990-talet. Av samtliga rapporterade aborter under 2021 utfördes 96 procent med medicinsk metod och av aborter utförda före vecka 9 var andelen 97 procent.

### Medicinsk abortmetod


Graviditeten avbryts genom läkemedelsbehandling i två steg. Den första dosen läkemedel motverkar effekten av progesteron, som är det graviditetsbevarande hormonet, och gör livmodern mer mottaglig för den fortsatta läkemedelsbehandlingen. Efter en till tre dagar ges en andra dos läkemedel som framkallar livmodersammandragningar och leder till att graviditeten stöts ut. Metoden kan användas vid alla graviditetslängder då abort är tillåten. Den första dosen ges alltid på sjukhus/klinik medan behandlingen med värkstimulerande läkemedel kan ske antingen på sjukhus/klinik eller i hemmet/annan plats, så kallad hemabort.

### Kirurgisk abortmetod

Graviditeten avbryts på sjukhus/klinik genom instrumentell utrymning av livmodern, oftast så kallad vakuumaspiration. Farmakologisk förbehandling sker innan ingreppet för att förenkla vidgning av livmoderhalsen. Kirurgisk abort kan göras till graviditetsvecka 12 eller 13. Före graviditetsvecka 7 ökar risken för ofullständig abort med denna metod.

Så kallad hemabort (se faktaruta ovan) har blivit allt vanligare sedan metoden infördes 2004. Under 2021 var ungefär 75 procent av samtliga aborter hemaborter.

Figur 3. Abortmetod efter graviditetslängd, 2021



Källa: Statistik om aborter, Socialstyrelsen.

Av de aborter som utfördes före graviditetsvecka 7 var närmare 90 procent medicinska aborter som fullföljdes i hemmet. Vid aborter senare i graviditeten är det vanligare att de fullföljs på sjukhus. Av aborterna under 2021 som utfördes från vecka 9 och senare var andelen hemaborter cirka 9 procent.

### **Mer information**

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här: [www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikammen/aborter/](http://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikammen/aborter/)

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:  
[https://sdb.socialstyrelsen.se/if\\_abo/val.aspx](https://sdb.socialstyrelsen.se/if_abo/val.aspx)

I syfte att försvåra identifiering av enskilda förändrades insamlingsrutinerna 2014. Som en följd av detta försvårades dock möjligheterna till granskning och bortfallskontroll. Mer information finns i Excelfilens flik ”Om statistiken”.

### **Kontakt:**

Inga-Maj Andersson, sakfrågor  
Telefon: 075-247 30 00  
E-post: [Inga-Maj.Andersson@socialstyrelsen.se](mailto:Inga-Maj.Andersson@socialstyrelsen.se)

Maria Öman, statistikfrågor  
Telefon: 075-247 30 00  
E-post: [Maria.Oman@socialstyrelsen.se](mailto:Maria.Oman@socialstyrelsen.se)

---