

## Statistik om aborter 2023

Under 2023 rapporterades cirka 35 550 aborter till Socialstyrelsen, vilket motsvarar drygt 18 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. De flesta, 63 procent, utfördes före vecka 7 i graviditeten. Medicinsk metod användes i över 97 procent av de rapporterade aborterna under 2023 och allt fler medicinska aborter avslutas i hemmet.


### Antalet aborter relativt konstant över tid

År 2023 rapporterades cirka 35 550 inducerade aborter till denna datainsamling, vilket motsvarar drygt 18 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder i befolkningen (15–44 år). Det är ungefär 100 flera aborter jämfört med antalet rapporterade för 2022. Både det totala antalet aborter och antal aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder har varit relativt konstant sedan mitten av 1980-talet. Utvecklingen har dock varierat i olika åldersgrupper med en förskjutning från kvinnor under 25 års ålder till kvinnor runt 30 års ålder. Över 60 procent av aborterna gjordes innan graviditetsvecka 7 förra året och det har gradvis blivit mindre vanligt att graviditeter avbryts med kirurgisk metod.

### Vanligast med abort i åldern 25 till 34 år

**Figur 1. Antal aborter per 1 000 kvinnor efter ålder, 1998–2023**

Antal per 1000 kvinnor



Källa: Statistik om aborter, Socialstyrelsen. Uppehåll i insamlingen 2013. Ny metod för insamling från 2014. Stort bortfall på ålder år 2020 gör att åldersklasserna är underskattade.

Den minskning av aborter bland tonåringar vi sett under många år avslutades i år. År 2023 ökade de rapporterade aborterna bland tonåringar från 8,1 till 8,5 aborter per 1 000 flickor i åldersgruppen 15–19 år, att jämföra med drygt 25 per 1 000 under 2006. Från och med år 2016 är abort vanligast bland kvinnor i åldern 25–29 år, och sedan 2019 följt av kvinnor i åldern 30–34 år.

## Flest aborter sker tidigt i graviditeten


Andelen aborter som utförs före graviditetsvecka 7 har ökat sedan början av 1990-talet. Under 2023 nådde den andelen en historisk högsta nivå på 63 procent, att jämföra med 61,5 procent från 2021. Aborter från vecka 9 och fram till vecka 12 når istället en lägsta nivå på 7,3 under 2023. Totalt sker nästan 94 procent av aborter 2023 innan vecka 12. Andelen aborter från vecka 12 och senare har legat på ungefär samma nivå de senaste 20 åren.

### Graviditetslängd

Beräknas med ultraljudsundersökning eller efter sista menstruationens första dag till dag för abort. Anges som fullgångna graviditetsveckor + dagar. Exempelvis anges 7 fullgångna veckor + 1 dag som 7+1 veckor.

**Figur 2. Aborter efter graviditetslängd, 2004–2023**

Procent



Källa: Statistik om aborter, Socialstyrelsen. Data saknas för 2013 p.g.a. uppehåll i datainsamlingen. Uppgift om graviditetslängd saknas för 2,8 % av aborterna 2020.

## Allt fler hemaborter över tid

Medicinsk abortmetod blev snabbt allt vanligare sedan metoden infördes i början av 1990-talet. Av samtliga rapporterade aborter under 2023 utfördes 96,5 procent med medicinsk metod och av aborter utförda före vecka 9 var andelen över 97 procent.

### **Medicinsk abortmetod**

Graviditeten avbryts genom läkemedelsbehandling i två steg. Den första dosen läkemedel motverkar effekten av progesteron, som är det graviditetsbevarande hormonet, och gör livmodern mer mottaglig för den fortsatta läkemedelsbehandlingen. Efter en till tre dagar ges en andra dos läkemedel som framkallar livmoderssammandragningar och leder till att graviditeten stöts ut. Metoden kan användas vid alla graviditetslängder då abort är tillåten. Den första dosen ges alltid på sjukhus/klinik medan behandlingen med värkstimulerande läkemedel kan ske antingen på sjukhus/klinik eller i hemmet/annan plats, så kallad hemabort.


### **Kirurgisk abortmetod**

Graviditeten avbryts på sjukhus/klinik genom instrumentell utrymning av livmodern, oftast så kallad vakuumaspiration. Farmakologisk förbehandling sker innan ingreppet för att förenkla vidgning av livmoderhalsen. Kirurgisk abort kan göras till graviditetsvecka 12 eller 13. Före graviditetsvecka 7 ökar risken för ofullständig abort med denna metod.

Så kallad hemabort (se faktaruta ovan) har blivit allt vanligare sedan metoden infördes 2004. Under 2023 var drygt 76 procent av samtliga aborter hemaborter.

**Figur 3. Abortmetod efter graviditetslängd, 2023**

Procent



Källa: Statistik om aborter, Socialstyrelsen.

Av de aborter som utfördes före graviditetsvecka 7 var drygt 90 procent medicinska aborter som fullföljdes i hemmet. Vid aborter senare i graviditeten är det vanligare att de fullföljs på sjukhus. Av aborterna under 2023 som utfördes från vecka 9 och senare var andelen hemaborter drygt 13 procent.

### Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här:

[www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikammen/aborter/](http://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikammen/aborter/)

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:

[https://sdb.socialstyrelsen.se/if\\_abo/val.aspx](https://sdb.socialstyrelsen.se/if_abo/val.aspx)

I syfte att försvåra identifiering av enskilda förändrades insamlingsrutinerna 2014. Som en följd av detta försvårades dock möjligheterna till granskning och bortfallskontroll. Mer information finns i Excelfilens flik "Om statistiken".

## Kontakt:

Mikael Ohlin (statistikfrågor)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: [mikael.ohlin@socialstyrelsen.se](mailto:mikael.ohlin@socialstyrelsen.se)

Susanne Åhlund (sakfrågor)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: [susanne.ahlund@socialstyrelsen.se](mailto:susanne.ahlund@socialstyrelsen.se)