

Statistik om aborter 2024

För 2024 rapporterades cirka 35 400 aborter till Socialstyrelsen, vilket motsvarar drygt 18 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. De flesta, knappt 65 procent, utfördes före vecka 7 i graviditeten. Medicinsk metod användes i nästan 97 procent av de rapporterade aborterna under 2024 och allt fler medicinska aborter avslutas i hemmet.


Antalet aborter relativt konstant över tid

För år 2024 rapporterades cirka 35 400 inducerade aborter till denna datainsamling, eller drygt 18 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder i befolkningen (15–44 år). Både det totala antalet aborter och antal aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder har varit relativt konstant sedan mitten av 1980-talet, men förskjutits från kvinnor under 25 års ålder till kvinnor runt 30 års ålder. Över 60 procent av aborterna gjordes innan graviditetsvecka 7 under 2024 och det blir mindre vanligt att graviditeter avbryts med kirurgisk metod.

Vanligast med abort i åldern 25 till 34 år

Figur 1. Antal aborter per 1 000 kvinnor efter ålder, 1998–2023

Antal per 1000 kvinnor



Källa: Statistik om aborter, Socialstyrelsen. Uppehåll i insamlingen 2013. Ny metod för insamling från 2014. Stort bortfall på ålder år 2020 gör att åldersklasserna är underskattade.

Andelen rapporterade aborter minskar något och endast i åldersgruppen 30–34 år kan man se en tydlig ökning. Men även i den gruppen är ökningen relativt liten från 24,8 till 25,2 per 1 000 kvinnor. Trenden att abort blir vanligare bland kvinnor över 30 år, men ovanligare bland kvinnor under 30 år, håller i sig, även om den avstannar bland kvinnor 35 år och äldre.


Flest aborter sker tidigt i graviditeten

Andelen aborter som utförs före graviditetsvecka 7 har ökat sedan början av 1990-talet. Under 2024 nådde den andelen en historisk högsta nivå på 64,7 procent, att jämföra med toppnoteringen från året innan 63,1 procent. Alla andra grupper minskar eller blir oförändrade, undantaget aborter efter 18 graviditetsveckor som ökar marginellt. Totalt skedde nästan 94 procent av aborterna under 2024 innan vecka 12. Andelen aborter från vecka 12 och senare har legat på ungefär samma nivå de senaste 20 åren.

Graviditetslängd

Beräknas med ultraljudsundersökning eller efter sista menstruationens första dag till dag för abort. Anges som fullgångna graviditetsveckor + dagar. Exempelvis anges 7 fullgångna veckor + 1 dag som 7+1 veckor.

Figur 2. Aborter efter graviditetslängd i veckor, 2005–2024



Källa: Statistik om aborter, Socialstyrelsen. * Data saknas för 2013 p.g.a. uppehåll i datainsamlingen. Uppgift om graviditetslängd saknas för 2,8 % av aborterna 2020.

Allt fler hemaborter över tid

Medicinsk abortmetod blev snabbt allt vanligare sedan metoden infördes i början av 1990-talet. Av samtliga rapporterade aborter under 2024 utfördes 96,7 procent med medicinsk metod och av aborter utförda före vecka 9 var andelen över 97 procent.

Medicinsk abortmetod


Graviditeten avbryts genom läkemedelsbehandling i två steg. Den första dosen läkemedel motverkar effekten av progesteron, som är det graviditetsbevarande hormonet, och gör livmodern mer mottaglig för den fortsatta läkemedelsbehandlingen. Efter en till tre dagar ges en andra dos läkemedel som framkallar livmodersammandragningar och leder till att graviditeten stöts ut. Metoden kan användas vid alla graviditetslängder då abort är tillåten. Den första dosen ges alltid på sjukhus/klinik medan behandlingen med värkstimulerande läkemedel kan ske antingen på sjukhus/klinik eller i hemmet/annan plats, så kallad hemabort.

Kirurgisk abortmetod

Graviditeten avbryts på sjukhus/klinik genom instrumentell utrymning av livmodern, oftast så kallad vakuumaspiration. Farmakologisk förbehandling sker innan ingreppet för att förenkla vidgning av livmoderhalsen. Kirurgisk abort kan göras till graviditetsvecka 12 eller 13. Före graviditetsvecka 7 ökar risken för ofullständig abort med denna metod.

Figur 3. Abortmetod efter graviditetslängd i veckor, 2024

Procent



Källa: Statistik om aborter, Socialstyrelsen.

Så kallad hemabort (se faktaruta ovan) har blivit allt vanligare sedan metoden infördes 2004. Under 2024 var drygt 76 procent av samtliga aborter hemaborter.

Av de aborter som utfördes före graviditetsvecka 7 var knappt 90 procent medicinska aborter som fullföljdes i hemmet. Vid aborter senare i graviditeten är det vanligare att de fullföljs på sjukhus. Av aborterna under 2024 som utfördes från vecka 9 och senare var andelen hemaborter nästan 13 procent.

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här:
www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/aborter/

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_abo/val.aspx

I syfte att försvåra identifiering av enskilda förändrades insamlingsrutinerna 2014. Som en följd av detta försvårades dock möjligheterna till granskning och bortfallskontroll. Mer information finns i Excelfilens flik "Om statistiken".

Kontakt:

Mikael Ohlin (statistikfrågor)
Telefon: 075-247 30 00
E-post: mikael.ohlin@socialstyrelsen.se

Susanne Åhlund (sakfrågor)
Telefon: 075-247 30 00
E-post: susanne.ahlund@socialstyrelsen.se