

Olämpliga läkemedel för äldre

Denna lista omfattar läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska vidare finnas en välgrundad och aktuell orsak (indikation) för att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör också följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller. Kontakta förskrivande läkare för mer information.

Listan speglar indikatorn ”Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger” som ingår i rapporten Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen 2017-6-7). Följande läkemedel ingår (augusti 2018)

Långverkande bensodiazepiner

Är lugnande och sömngivande läkemedel

Apodorm
Diazepam
Flunitrazepam
Mogadon
Nitrazepam
Stesolid

Tramadol

Mot smärta
Dolatramyl
Gemadol
Nobligan
Tiparol
Tradolan
Tramadol

Propiomazin

Används vid sömnbesvär
Propavan

Kodein

Mot smärta
Altermol
Citodon
Kodein
Panocod
Paracetamol/Kodein
Treo

Glibenklamid

Ett diabetesmedel
Daonil
Glibenklamid

Läkemedel med antikolinerga effekter

Används t.ex. vid urininkontinens, som lugnande medel och i vissa preparat mot smärta

Akineton
Alimemazin
Amitriptylin
Anafranil
Atarax
Atropin
Buscopan
Calma
Clozapine
Detrusitol
Ditropan
Durbis
Egazil
Emselex
Glykopyrroniumbromid
Hydroxizin
Hydroxyzine
Kentera
Ketogan
Klomipramin

Läkemedel med antikolinerga effekter (forts.)

Leponex
Lergigan
Levomepromazine
Ludiomil
Metylskopolamin
Morfin-Skopolamin
Norflex
Norgesic
Nozinan
Oxikodon-hyoscin
Oxybutynin
Pargitan
Postafen
Proklorperazin
Prometazin
Robinul
Saroten
Scopoderm
Sensaval
Sialanar
Spasmofen
Tavegyl
Theralen
Tolterodin
Tolterodine
TOVIAZ
Truxal
Vesicare