

Rekommendation från Sveriges transplantationsenheter avseende screening av organdonatorer för SARS CoV-2

Med anledning av det rådande läget med pandemisk situation av Corona -19 rekommenderar transplantationsenheterna i Sverige att **alla** organdonatorer skall genomgå test för SARS-CoV-2 före donationsingreppet. Detta bör tas i ett så tidigt skede som möjligt i processen för att svar på testet skall vara klart före donationen. I de fall testet inte hinner svaras ut före donationsingreppet kan detta ändå genomföras under förutsättning att det inte finns några kliniska misstankar på att donatorn bär på smitta. Organ kan då erbjudas till mottagarenheter i Sverige som måste värdera erbjudandet ur ett risk/nytta perspektiv.

Om testet retrospektivt utfaller positivt efter genomförd transplantation bör adekvata åtgärder för att skydda personal och medpatienter vidtagas.

Tillägg 2020-05-05: För att minimera risk för falskt negativt PCR-test rekommenderas att CT-thorax utförs på alla donatorer före donatorsingreppet.

Observera att denna rekommendation kan komma att ändras i närtid beroende på den fortsatta utvecklingen och smittans prevalens i befolkningen.

2020-03-16

Amir Sedigh, Sektionschef, Transplantationsenheten, Uppsala

Gunnar Söderdahl, Verksamhetschef, ME Transplantation, Stockholm

Per Lindner, Verksamhetschef, Transplantationscentrum, Göteborg

Ali-Reza Biglarnia, Sektionsansvarig, Njur- och Pankreastransplantation, Malmö

Lars Algotsson, Verksamhetschef, Thoraxtransplantation, Lund

Rekommendationerna utgör en praktisk tillämpningsprincip utifrån "Scandi-transplants guidelines for prevention of transmission of infectious diseases from organ donors to recipients", 2020-03-13.